平成 23 年度陸奥湾漁場保全対策基礎調査

－水質・底質・底生生物から見た陸奥湾の漁場環境－

清藤真樹・高坂祐樹

目 的

陸奥湾は、ホタテガイ養殖業を中心とした漁場利用が高度にすすんでいるとともに、閉鎖性が強く海水交換が行われにくい海域であるために、漁場環境保全をはかり、またホタテガイの成育環境を維持するためにも、長期的に監視することが必要とされている。本調査は陸奥湾の漁場環境保全の基礎データを収集することを目的に 1979 年(昭和 54 年)から 4 年毎に実施しているものであり、今回の 2011 年(平成 23 年)調査は 9 回目になる。

本報告書では、9 回目調査結果からみた陸奥湾の漁場環境の現況と、調査開始からの傾向について、湾全体並びに調査地点毎に検討した結果をとりまとめた。

I 水質調査

1. 調査期間

2011 年 9 月 13、15、16 日

2. 調査地点

図 I-1 に示した 20 地点

3. 調査項目及び方法

採水は、表層(0m)では表面採水器を、10m 以深ではバンドン採水器を使用した。

- ・水色 : フォーレル水色計
- ・透明度 : 30cm セッキ板
- ・水温 : 表面は棒状水銀水温計

その他は鶴見精機・シーメイト C/STD

- ・塩分 : サリノメーター(YE0-KA/L 製 601MkIV)
- ・DO(溶存酸素量) : ウィンクラー・アジ化ナトリウム変法
- ・COD(化学的酸素要求量) : アルカリ性過マンガン酸カリウム-ヨウ素滴定法
- ・栄養塩 : 栄養塩自動分析装置 (BLTEC・QuAAtro2-HR)

4. 調査結果

全調査結果を付表 1 に、DO、COD、栄養塩の観測層別経年変化を図 I-2～I-9 に、調査地点別の底層の経年変化を図 I-9 に示した。

(1) 水色

5～7 の範囲であった。

図 I-1 水質調査地点

(2) 透明度

16~22m の範囲で、最高は St. 5、20 の 22m、最低は St. 2、4、8、14、15、16 の 16m であった。

(3) 水温、塩分

0m 層では 22.3~24.7°C、20m 層では 22.43~23.25°C、底層では 14.97~22.83°C の範囲、塩分は、0m 層では 31.58~33.21、20m 層では 32.62~33.50、底層では 33.10~34.11 の範囲であった。

(4) DO(溶存酸素量)

20m 層では 6.21~7.03mg/L(飽和度 87.0~98.4%)の範囲、底層では 4.46~6.89mg/L(飽和度 55.8~94.1%)であり、全調査地点で水産用水基準(内湾漁場の夏季底層において最低限維持しなければならない溶存酸素量 4.3mg/L)を満たしていた(2003 年以降で基準値を満たしていない調査地点は 2007 年の 1 地点のみ)。

(5) COD(化学的酸素要求量)

湾全体で 0.01~0.56mg/L の範囲で、東湾南部 St. 18 の 0m 層で最大値となった。層別に見ると 0m 層では 0.01~0.56mg/L の範囲で、東湾側南部 St. 18 で最大値となった。20m 層では 0.13~0.35mg/L の範囲で、東湾側南部 St. 18 で最大値となった。底層では 0.01~0.29mg/L の範囲で、東湾の St. 12、14 で最大値となった。

全調査地点の全観測層で水産用水基準(一般海域では 1.0mg/L 以下)を満たしていた(2003 年以降はすべての地点で基準を満たしている)。

(6) NO₃-N(硝酸態窒素)

0.05~5.64 μmol/L の範囲で、湾央 St. 5 の底層で最大値となった。

層別に見ると 0m 層では 0.11~0.54 μmol/L の範囲で、西湾南部の St. 5 で最大値となった。20m 層では 0.05~0.23 μmol/L の範囲で、湾央の St. 5、St. 18 で最大値となった。底層では 0.07~5.64 μmol/L の範囲で、西湾南部の St. 5 で最大値となった。

(7) NO₂-N(亜硝酸態窒素)

0.00~1.90 μmol/L の範囲で、東湾中央の St. 16 の底層で最大値となった。

層別に見ると 0m 層では 0.00~0.04 μmol/L の範囲で、西湾南部の St. 6 と東湾南部の St. 20 で最大値となった。20m 層では 0.00~0.07 μmol/L の範囲で、東湾南部の St. 6 で最大値となった。底層では 0.05~1.90 μmol/L の範囲で、東湾南部の St. 6 で最大値となった。

(8) NH₄-N(アンモニア態窒素)

0.03~3.58 μmol/L の範囲で、東湾北部の St. 13 の底層で最大値となった。

層別に見ると 0m 層では 0.14~1.18 μmol/L の範囲で、東湾南部の St. 20 で最大値となった。20m 層では 0.03~0.70 μmol/L の範囲で、東湾北部の St. 10 で最大値となった。底層では 0.08~3.58 μmol/L の範囲で、東湾北部の St. 10 で最大値となった。

(9) DIN(溶存態無機窒素、NO₃-N+NO₂-N+NH₄-N)

0.23~6.70 μmol/L の範囲で、西湾中央の St. 5 の底層で最大値となった。

層別に見ると 0m 層では 0.31~1.51 μmol/L の範囲で、東湾南部の St. 20 で最大値となった。20m 層では 0.23~0.83 μmol/L の範囲で、東湾北部の St. 10 と東湾南部の St. 20 で最大値となった。底層では 0.52~6.70 μmol/L の範囲で、西湾中央の St. 5 の底層で最大値となった。

(10) $\text{PO}_4\text{-P}$ (リン酸態リン)

0.00~0.52 $\mu\text{mol/L}$ の範囲で、西湾中央の St. 5 の底層で最大値となった。

層別に見ると 0m 層では 0.00~0.05 $\mu\text{mol/L}$ の範囲で、東湾北部の St. 13 で最大値となった。
20m 層では 0.00~0.02 $\mu\text{mol/L}$ の範囲で、St. 1、3、5、6、13、20 で最大値となった。底層では
0.01~0.52 $\mu\text{mol/L}$ の範囲で、西湾中央の St. 5 の底層で最大値となった。

(11) SiO_2 (ケイ酸)

0.52~32.90 $\mu\text{mol/L}$ の範囲で、東湾北部の St. 13 の底層で最大値となった。

層別に見ると 0m 層では 0.52~11.43 $\mu\text{mol/L}$ の範囲で、西湾北部の St. 2 で最大値となった。
20m 層では 0.58~3.27 $\mu\text{mol/L}$ の範囲で、湾口部の St. 1 で最大値となった。底層では 2.50~
32.90 $\mu\text{mol/L}$ の範囲で、東湾北部の St. 13 の底層で最大値となった。

図 I -2 DO の経年変化

図 I -3 COD の経年変化

図 I -4 NO₃-N の経年変化

図 I -5 NO₂-N の経年変化

図 I-6 NH₄-N の経年変化

図 I-7 DIN の経年変化

図 I-8 PO₄-P の経年変化

図 I-9 SiO₂ の経年変化

図 I-10 a 調査地点別の底層の水質の経年変化
(COD、DO、NO₃-N、NO₂-N、NH₄-N、DIN、PO₄-P)

図 I-10 b 調査地点別の底層の水質の経年変化
(COD、DO、NO₃-N、NO₂-N、NH₄-N、DIN、PO₄-P)

II 底質調査

1. 調査期間

2011年9月9、13、15、16、20、28日

2. 調査地点

図 II-1 に示した 42 地点

3. 試料の採取方法及び分析項目、分析法

採泥方法：スミス・マッキンタイヤー採泥器 (0.1 m²) で採泥後、0~2cm 深さの泥を採取し、氷冷して持ち帰り、分析に供した。

・MC (含泥率) : 湿式篩分法

3.09~21.12 $\mu\text{g/g}$ の範囲で、東湾中央と西湾中央で高かった。最大値は St. 40 の 21.21 $\mu\text{g/g}$ 、最小値は St. 1 の 3.09 $\mu\text{g/g}$ 、平均値は 9.7 $\mu\text{g/g}$ と前回調査時 (18.5 $\mu\text{g/g}$) より低かった。

(5) TS(全硫化物)

0.00~0.57mg/g の範囲で、湾央の St. 25、東湾の St. 11、14、西湾の St. 34 の計 4 地点で水産用水基準値の 0.2mg/g を越えていた (基準を超えていたのは 2003 年 11 地点、1999 年 7 地点、1995 年 12 地点、1999 年 4 地点)。最大値は St. 25 の 0.57mg/g、最小値は St. 2、4、37、41、42 の 0.00mg/g、平均値は 0.09mg/g で、前回調査結果 (0.08mg/g) より若干上昇した。

図 II-2 MC の経年変化

図 II-3 IL の経年変化

図 II-4 COD の経年変化

図 II-5 フェオフィチンの経年変化

図 II-6 TS の経年変化

図 II-7a 調査地点別の底質 (MC、IL、COD、フェオフィチン、TS) の経年変化

図 II-7b 調査地点別の底質 (MC、IL、COD、フェオフィチン、TS) の経年変化

図 II-7c 調査地点別の底質 (MC、IL、COD、フェオフィチン、TS) の経年変化

図 II-7 d 調査地点別の底質 (MC、IL、COD、フェオフィチン、TS) の経年変化

III 底生生物(マクロベントス)調査

1. 調査期間

2011年9月9、13、15、16、20、28日

2. 調査地点

図 II-1 に示した 42 地点

3. 採取方法

スミスマッキンタイヤー採泥器 (0.1 m²) により 1 地点で 1 回採泥し、これを海水に浸しながら 1 mm 目の篩により篩い分けし、残った試料をホルマリン固定して持ち帰り、分析(分類・同定: 株式会社日本海洋生物研究所に委託)に供した。

4. 分類内容

多毛類、甲殻類、軟体類、棘皮類、触手動物、その他

5. 調査結果

動物群別の採集結果を表 III-1 に、分類結果を付表 3 に、優先種の個体数と構成比を表 III-2 に、調査地点別動物群別個体数の経年変化を図 III-3 に示した。

(1) 全個体数の分布

0.1m² 当たり採集個体数の最大値は 316 個体、最小値は 0 個体であった。100 個体/0.1 m² 以上

の調査地点は St. 1、2、4、5、7、10、12、17、19、23、28、37、38 の 13 地点で、むつ市脇野沢から浜奥内及び外ヶ浜町蟹田の沿岸に多く、また、10 個/0.1 m²以下の調査地点は St. 13、14、15、16、21、24、26、40 の 8 地点で東湾中央部に多かった。全湾の平均個体数は 76.4 個体/0.1m²であった。

(2) 多様度指数(H')の分布

多様度指数(H')は、シャノン・ベイナーの多様度指数によりベントスの個体数と種類数から算出され、数値が高いほど多様な動物群が生息し、漁場環境が良好であることを示す。全個体数と同様、むつ市脇野沢から浜奥内及び外ヶ浜町蟹田の沿岸 (St. 1、4、5、7) で高く、また、東湾中央部のほか、青森湾中央部においても低かった。

※シャノン・ベイナーの多様度指数

$$H' = - \sum_{i=1}^S P_i \log_2 P_i \quad (S=\text{種の数}, P_i=\text{種 } i \text{ の個体数が、群集の全個体数に占める割合})$$

(3) 優占種

全生物の優占 10 種中、最も生物量が多かったのはカタマガリギボシイソメ (多毛類) の 416 個体/0.1m²、ついでトノサマゴカイ (多毛類) で 345 個体/0.1m²であり、多毛類が 7 種を占めていた。

(5) 底質の汚染指標種

底質の汚染指標種とされるのは、ヨツバネスピオ A 型、B 型 (Paraprionospio sp. typeA, B)、チヨノハナガイ、シズクガイの 4 種である。

これまでの調査と同様、ヨツバネスピオ A 型、B 型ともに出現せず、シズクガイも出現しなかった (2003 年には 6 地点、1~6 個体/0.1m²、2009 年には 3 地点、各 1 個体/0.1m²)。チヨノハナガイは St. 10 で 5 個体/0.1m²、St. 34 で 2 個体/0.1m²出現した。なお、St. 10 では COD、St. 34 では COD 及び TS が水産用水基準を越えていた (汚染指標種の出現は、2003 年は 2 地点、各 2 個体/0.1m²、2009 年は 5 地点、各 1 個体/0.1m²)。

出現地点及び出現数が減少していることから、底質の汚染の進行は認められなかった。

表Ⅲ-1 a 調査地点別採集結果

		St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	St. 9	St. 10	St. 11	St. 12
種類数	多毛類	29	18	8	19	27	4	24	22	4	17	4	15
	甲殻類	14	0	1	7	3	0	4	4	2	0	0	6
	棘皮類	5	2	0	4	3	0	3	1	0	1	0	5
	軟体類	8	3	2	8	6	0	6	1	1	2	0	5
	その他	5	4	3	5	3	1	2	4	0	2	0	4
	合計	61	27	14	43	42	5	39	32	7	22	4	35
個体数	多毛類	87	135	37	55	78	29	56	67	7	128	24	53
	甲殻類	52	0	1	17	5	0	8	10	8	0	0	19
	棘皮類	118	4	0	28	22	0	13	1	0	2	0	34
	軟体類	24	16	4	19	19	0	40	3	1	9	0	15
	その他	35	15	3	6	16	1	10	4	0	9	0	6
	合計	316	170	45	125	140	30	127	85	16	148	24	127
編組比率 (%)	多毛類	27.5	79.4	82.2	44.0	55.7	96.7	44.1	78.8	43.8	86.5	100.0	41.7
	甲殻類	16.5	0.0	2.2	13.6	3.6	0.0	6.3	11.8	50.0	0.0	0.0	15.0
	棘皮類	37.3	2.4	0.0	22.4	15.7	0.0	10.2	1.2	0.0	1.4	0.0	26.8
	軟体類	7.6	9.4	8.9	15.2	13.6	0.0	31.5	3.5	6.3	6.1	0.0	11.8
	その他	11.1	8.8	6.7	4.8	11.4	3.3	7.9	4.7	0.0	6.1	0.0	4.7
	合計	26.29	10.54	4.00	5.02	22.53	0.30	12.38	3.13	23.68	2.62	0.48	33.15
湿重量 (g)	多毛類	4.13	3.09	0.57	2.23	1.83	0.3	3.58	2.92	0.14	1.64	0.48	2.37
	甲殻類	0.12	0	0.01	0.12	0.02	0	0.03	0.02	0.01	0	0	0.03
	棘皮類	9.26	0.06	0	2.47	19.93	0	4.023	0.01	0	0.66	0	15.89
	軟体類	1.53	7.28	3.29	0.16	0.72	0	0.52	0.12	23.53	0.28	0	14.7
	その他	11.25	0.11	0.13	0.04	0.03	0	4.23	0.06	0	0.04	0	0.16
	合計	26.29	10.54	4.00	5.02	22.53	0.30	12.38	3.13	23.68	2.62	0.48	33.15
多様度H' (bit)		6.41	3.58	3.08	4.62	4.67	1.32	4.40	4.36	2.27	3.07	1.29	4.28

		St. 13	St. 14	St. 15	St. 16	St. 17	St. 18	St. 19	St. 20	St. 21	St. 22	St. 23	St. 24
種類数	多毛類	4	5	0	3	10	6	19	9	1	14	9	4
	甲殻類	0	0	0	0	10	0	6	0	0	0	1	0
	棘皮類	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0
	軟体類	0	0	0	0	3	1	6	0	0	0	0	0
	その他	1	0	0	0	3	2	4	1	0	1	1	1
	合計	5	5	0	3	29	9	37	10	1	15	11	5
個体数	多毛類	6	7	0	3	34	33	72	56	2	35	115	6
	甲殻類	0	0	0	0	138	0	10	0	0	0	1	0
	棘皮類	0	0	0	0	12	0	6	0	0	0	0	0
	軟体類	0	0	0	0	6	1	9	0	0	0	0	0
	その他	1	0	0	0	8	2	12	2	0	4	3	2
	合計	7	7	0	3	198	36	109	58	2	39	119	8
編組比率 (%)	多毛類	85.7	100.0	-	100.0	17.2	91.7	66.1	96.6	100.0	89.7	96.6	75.0
	甲殻類	0.0	0.0	-	0.0	69.7	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
	棘皮類	0.0	0.0	-	0.0	6.1	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	軟体類	0.0	0.0	-	0.0	3.0	2.8	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	その他	14.3	0.0	-	0.0	4.0	5.6	11.0	3.4	0.0	10.3	2.5	25.0
	合計	4.99	0.49	0.00	0.27	11.60	22.07	18.65	0.89	0.02	1.45	4.49	0.11
湿重量 (g)	多毛類	0.16	0.49	0	0.27	2.04	0.82	10.79	0.88	0.02	1.43	4.48	0.06
	甲殻類	0	0	0	0	0.5	0	0.03	0	0	0	0	0
	棘皮類	0	0	0	0	8.44	0	3.09	0	0	0	0	0
	軟体類	0	0	0	0	0.3	0.01	0.58	0	0	0	0	0
	その他	4.83	0	0	0	0.32	21.24	4.16	0.01	0	0.02	0.01	0.05
	合計	4.99	0.49	0.00	0.27	11.60	22.07	18.65	0.89	0.02	1.45	4.49	0.11
多様度H' (bit)		2.13	2.24	0.00	1.58	2.94	1.64	3.86	2.37	0.00	3.45	1.39	2.25

表Ⅲ-1 b 調査地点別採集結果

		St. 25	St. 26	St. 27	St. 28	St. 29	St. 30	St. 31	St. 32	St. 33	St. 34	St. 35	St. 36
種類数	多毛類	6	2	6	26	9	14	18	11	4	7	10	38
	甲殻類	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	11
	棘皮類	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	4
	軟体類	0	0	0	1	1	1	2	0	0	2	0	5
	その他	1	0	1	3	0	5	2	0	0	0	0	5
	合計	7	2	8	31	10	23	23	11	4	11	10	63
個体数	多毛類	19	2	13	110	26	65	76	23	17	63	45	207
	甲殻類	0	0	0	0	0	3	4	0	0	1	0	40
	棘皮類	0	0	1	2	0	2	0	0	0	1	0	12
	軟体類	0	0	0	2	1	1	2	0	0	4	0	14
	その他	1	0	1	9	0	7	9	0	0	0	0	33
	合計	20	2	15	123	27	78	91	23	17	69	45	306
編組比率 (%)	多毛類	95.0	100.0	86.7	89.4	96.3	83.3	83.5	100.0	100.0	91.3	100.0	67.6
	甲殻類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.4	0.0	0.0	1.4	0.0	13.1
	棘皮類	0.0	0.0	6.7	1.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.9
	軟体類	0.0	0.0	0.0	1.6	3.7	1.3	2.2	0.0	0.0	5.8	0.0	4.6
	その他	5.0	0.0	6.7	7.3	0.0	9.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8
	合計	8.08	0.11	0.82	2.29	0.85	3.48	1.33	0.61	12.81	1.78	0.84	8.16
湿重量 (g)	多毛類	0.71	0.11	0.8	1.82	0.83	2.04	1.27	0.61	12.81	1.13	0.84	2.59
	甲殻類	0	0	0	0	0	0.18	0	0	0	0.62	0	0.13
	棘皮類	0	0	0.01	0.03	0	0.68	0	0	0	0	0	0.22
	軟体類	0	0	0	0.24	0.02	0.03	0.02	0	0	0.03	0	3.45
	その他	7.37	0	0.01	0.2	0	0.55	0.04	0	0	0	0	1.77
	合計	8.08	0.11	0.82	2.29	0.85	3.48	1.33	0.61	12.81	1.78	0.84	8.16
多様度H' (bit)		2.30	1.00	2.46	3.90	2.53	3.38	3.87	3.05	0.95	1.88	1.80	4.79

		St. 37	St. 38	St. 39	St. 40	St. 41	St. 42	合計	平均
種類数	多毛類	20	20	13	3	14	20	516	12.3
	甲殻類	8	3	0	0	8	8	100	2.4
	棘皮類	0	1	0	0	0	2	40	1.0
	軟体類	0	3	0	0	1	1	69	1.6
	その他	3	3	1	0	2	3	76	1.8
	合計	31	30	14	3	25	34	801	19.1
個体数	多毛類	86	136	64	4	40	39	2,160	51.4
	甲殻類	11	4	0	0	12	22	366	8.7
	棘皮類	0	1	0	0	0	2	261	6.2
	軟体類	0	5	0	0	3	1	199	4.7
	その他	5	12	1	0	2	3	222	5.3
	合計	102	158	65	4	57	67	3,208	76.4
編組比率 (%)	多毛類	84.3	86.1	98.5	100.0	70.2	58.2	-	67.33
	甲殻類	10.8	2.5	0.0	0.0	21.1	32.8	-	11.41
	棘皮類	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	3.0	-	8.14
	軟体類	0.0	3.2	0.0	0.0	5.3	1.5	-	6.20
	その他	4.9	7.6	1.5	0.0	3.5	4.5	-	6.92
	合計	66.52	5.17	0.71	0.04	5.82	23.09	351.66	8.4
湿重量 (g)	多毛類	1.86	2.54	0.7	0.04	0.96	1.04	-	77.42
	甲殻類	0.07	0.05	0	0	0.27	0.3	2.51	0.1
	棘皮類	64.35	1.12	0	0	0	21.22	151.46	3.6
	軟体類	0	0.04	0	0	2.77	0.52	60.14	1.4
	その他	0.24	1.42	0.01	0	1.82	0.01	60.13	1.4
	合計	66.52	5.17	0.71	0.04	5.82	23.09	351.66	8.4
多様度H' (bit)		4.31	3.05	2.56	1.50	4.11	4.52	-	2.84

表Ⅲ-2 優先種の個体数と構成比

順位	出現種			個体数 m ²	比率 %
	多毛類	学名	和名		
1	多毛類	<i>Scoletoma longifolia</i>	カタマガリギボシイソメ	416	12.9
2	多毛類	<i>Scalibregma inflatum</i>	トノサマゴカイ	345	10.7
3	棘皮類	<i>Amphioplus japonicus</i>	カキクモヒトデ	213	6.6
4	多毛類	<i>Glycinde</i> sp.		133	4.1
5	その他	NEMERTINEA	ひも形動物門	119	3.7
6	甲殻類	<i>Ampelisca brevicornis</i>	クビナガスガメ	117	3.6
7	多毛類	<i>Maldane pigmentata</i>	ヒョウモンタケフジゴカイ	99	3.1
8	多毛類	<i>Polydora</i> sp.		84	2.6
9	多毛類	<i>Notomastus</i> sp.		78	2.4
10	多毛類	<i>Nicolea</i> sp.		60	1.9

図Ⅲ-3 a 調査地点別動物群別個体数の経年変化

図Ⅲ-3b 調査地点別動物群別個体数の経年変化

図Ⅲ-3c 調査地点別動物群別個体数の経年変化

図Ⅲ-3d 調査地点別動物群別個体数の経年変化

IV. 考察

1. 水質

水質については、悪化の進行は認められなかった。

2. 底質環境（底質及び底生生物）

合成指標の2003年との比較を表IV-1に（2007年には底生生物調査地点が31地点で少なかったため比較できず、2003年と比較した）、全調査地点の多様度指数H'及び合成指標が正の値を示す地点数の経年変化を図IV-1に、調査地点別の多様度指数H'と合成指標値の経年変化を図IV-2に示した。

合成指標は、地点ごとの経年的な環境変化を測るために、底質、ベントスデータを用いて算出するもので、その計算式は、

①合成指標A：COD、TS、MC（含泥率）から求める

$$\begin{aligned} &= 0.582(\text{COD}-20.9)/15.4 \\ &+ 0.568(\text{TS}-0.51)/0.60 \\ &+ 0.580(\text{MC}-64.9)/30.5 \end{aligned}$$

②合成指標B：COD、TS、MC（含泥率）、H'（多様度指数）から求める

$$\begin{aligned} &= 0.504(\text{COD}-20.9)/15.4 \\ &+ 0.513(\text{TS}-0.51)/0.60 \\ &+ 0.506(\text{MC}-64.9)/30.5 \\ &- 0.474(\text{H}' -2.69)/1.30 \end{aligned}$$

※ COD：mg/g、TS：mg/g、MC：%、H'をそれぞれ代入

となり、負の値を「正常」な底質、正の値を「汚染」された底質と判断する。

全地点を通じて2003年と比較し、合成指標が負→負を良好、正→負を改善、負→正を悪化、正→正を不良とすると、底質のみの状態を示す合成指標Aでは、2003年に汚染と判断された全6地点（St. 9、11、24、33、34、40）が改善した一方、良好だった1地点（St. 25）が悪化し、「汚染」と判断された。

また、多様度指数H'を加えて生物環境を含む底質の状況を示す合成指標Bでは、改善した地点が2地点、悪化した地点が3地点で、不良の7地点と合わせて汚染と判断されたのは10地点（St. 9、11、15、16、21、25、26、33、34、40）となり、2003年の9地点（St. 9、11、21、24、25、33、34、39、40）に比べて増加した。

これについて、さらに過去の結果と比較すると、汚染と判断された地点数は合成指標Aでは減少しているが、合成指標Bでは増加している。

合成指標Bと多様度指数H'の関係では、多様度指数H'が小さくなるほど合成指標Bはが正に近づくが、多様度指数H'は過去から大きく変化していない。通常、外海域などでは底質が改善されれば合成指標Aが正の値に変化し、それに合わせて生物層が多様化し合成指標Bも正の値に変化するが、陸奥湾のような閉鎖系海域では生物相は多様化せず一定の範囲内に留まるため、見かけ上、合成指標Bは悪化したと考えられた。

以上のことから、陸奥湾の底質環境は改善され、陸奥湾における生物の多様性は維持されているものと考えられた。

表IV-1 合成指標の2003年との比較総括表

	合成指標A				合成指標B					合成指標A				合成指標B			
	良好	改善	悪化	不良	良好	改善	悪化	不良		良好	改善	悪化	不良	良好	改善	悪化	不良
2003年 ↓ 2011年	負 ↓ 負	正 ↓ 負	負 ↓ 正	正 ↓ 正	負 ↓ 負	正 ↓ 負	負 ↓ 正	正 ↓ 正	2003年 ↓ 2011年	負 ↓ 負	正 ↓ 負	負 ↓ 正	正 ↓ 正	負 ↓ 負	正 ↓ 負	負 ↓ 正	正 ↓ 正
St. 1	○				○				St. 25			○					○
St. 2	○				○				St. 26	○						○	
St. 3	○				○				St. 27	○				○			
St. 4	○				○				St. 28	○				○			
St. 5	○				○				St. 29	○				○			
St. 6	○				○				St. 30	○				○			
St. 7	○				○				St. 31	○				○			
St. 8	○				○				St. 32	○				○			
St. 9		○						○	St. 33		○						○
St. 10	○				○				St. 34		○						○
St. 11		○						○	St. 35	○				○			
St. 12	○				○				St. 36	○				○			
St. 13	○				○				St. 37	○				○			
St. 14	○				○				St. 38	○				○			
St. 15	○						○		St. 39	○					○		
St. 16	○						○		St. 40		○						○
St. 17	○				○				St. 41	○				○			
St. 18	○				○				St. 42	○				○			
St. 19	○				○				小計	35	6	1	0	30	2	3	7
St. 20	○				○				合計	正常		汚染		正常		汚染	
St. 21	○						○			41	1		32		10		
St. 22	○				○				2003年	正常		汚染		正常		汚染	
St. 23	○				○					32	6		33		9		
St. 24		○				○

図IV-1 多様度指数 H' 及び合成指標が正の地点数の経年変化

図IV-2a 調査地点別の多様度指数 H' と合成指標値の経年変化

図IV-2b 調査地点別の多様度指数 H' と合成指標値の経年変化

図IV-2c 調査地点別の多様度指数 H' と合成指標値の経年変化

図IV-2 d 調査地点別の多様度指数 H' と合成指標値の経年変化

付表 1 a 水質調査結果

調査点	水深 m	月日 時刻	水色	透明度 m	調査 水深	水温 ℃	塩分	溶存酸素 mg/L %	COD mg/L	NO ₃ -N μmol/L	NO ₂ -N μmol/L	NH ₄ -N μmol/L	DIN μmol/L	PO ₄ -P μmol/L	SiO ₂ μmol/L					
St. 1	57	9.16 8:39 ~ 8:49	5	18	0m	23.8	33.21			0.08	0.22	0.00	0.15	0.37	0.01	3.43				
					10m	23.28	33.37													
					20m	22.89	33.44	6.69	94.6	0.21	0.16	0.04	0.15	0.35	0.02				3.27	
					30m	21.90	33.55													
					40m	19.39	33.74													
					50m	18.25	33.83													
St. 2	58	9.16 10:12 ~ 10:22	7	16	0m	23.7	32.72			0.16	0.11	0.01	0.20	0.32	0.01	11.43				
					10m	23.33	33.37													
					20m	23.19	33.49	6.51	92.5	0.13	0.09	0.04	0.28	0.41	0.01				2.71	
					30m	22.51	33.55													
					40m	20.82	33.63													
					50m	18.69	33.88													
St. 3	53	9.16 13:50 ~ 13:57	6	18	0m	23.9	32.75			0.50	0.28	0.01	0.32	0.61	0.03	3.35				
					10m	23.02	33.24													
					20m	23.25	33.50	6.75	96.1	0.30	0.19	0.03	0.20	0.42	0.02				2.65	
					30m	22.01	33.40													
					40m	20.63	33.23													
					50m	17.73	33.58													
St. 4	53	9.16 10:46 ~ 10:56	6	16	0m	23.9	32.75			0.50	0.28	0.01	0.32	0.61	0.03	3.35				
					10m	23.02	33.24													
					20m	23.25	33.50	6.75	96.1	0.30	0.19	0.03	0.20	0.42	0.02				2.65	
					30m	22.01	33.40													
					40m	20.63	33.23													
					50m	17.73	33.58													
St. 5	52	9.16 7:50 ~ 7:58	5	22	0m	23.1	33.02			0.21	0.23	0.00	0.16	0.39	0.02	2.27				
					10m	22.89	33.26													
					20m	22.78	33.48	6.81	96.1	0.24	0.23	0.02	0.21	0.46	0.02				2.63	
					30m	22.12	33.56													
					40m	19.83	33.44													
					50m	16.16	34.02													
St. 6	31	9.16 11:34 ~ 11:39	6	17	0m	24.0	32.79			0.08	0.07	0.01	0.48	0.56	0.01	6.41				
					10m	23.29	33.28													
					20m	23.21	33.50	6.49	92.4	0.14	0.09	0.03	0.36	0.48	0.00				2.77	
					30m	21.81	33.44													
					40m	20.17	33.66													
					50m	16.79	33.95													
St. 7	46	9.16 12:40 ~ 12:51	6	17	0m	24.0	32.79			0.08	0.07	0.01	0.48	0.56	0.01	6.41				
					10m	23.29	33.28													
					20m	23.21	33.50	6.49	92.4	0.14	0.09	0.03	0.36	0.48	0.00				2.77	
					30m	21.81	33.44													
					40m	20.17	33.66													
					50m	16.79	33.95													
St. 8	31	9.16 11:55 ~ 12:05	6	16	0m	23.1	33.02			0.21	0.23	0.00	0.16	0.39	0.02	2.27				
					10m	22.89	33.26													
					20m	22.78	33.48	6.81	96.1	0.24	0.23	0.02	0.21	0.46	0.02				2.63	
					30m	22.12	33.56													
					40m	19.83	33.44													
					51m	16.16	34.01	4.46	55.8	0.10	5.64	0.90	0.16	6.70	0.52				28.64	
St. 9	34	9.16 12:16 ~ 12:25	6	17	0m	24.2	31.84			0.13	0.54	0.04	0.32	0.90	0.02	9.89				
					10m	23.21	33.24													
					20m	23.02	33.49	6.71	95.1	0.14	0.10	0.07	0.25	0.42	0.02				2.97	
					30m	20.42	33.70	6.31	85.4	0.08	1.14	0.53	0.86	2.54	0.17				10.39	
					40m	19.87	33.64													
					45m	18.55	33.75	6.18	80.8	0.26	2.12	1.14	0.47	3.73	0.26				15.95	
St. 10	34	9.13 11:16 ~ 11:23	5	20	0m	24.7	32.44			0.27	0.26	0.02	0.36	0.64	0.02	5.06				
					10m	23.34	33.27													
					20m	23.22	33.48	6.74	95.9	0.13	0.05	0.01	0.17	0.23	0.00				2.05	
					30m	22.17	33.45													
					40m	19.87	33.64													
					45m	18.55	33.75	6.18	80.8	0.26	2.12	1.14	0.47	3.73	0.26				15.95	
St. 11	46	9.13 8:42 ~ 8:50	6	17	0m	24.3	32.23			0.14	0.20	0.03	0.42	0.65	0.02	6.14				
					10m	23.30	32.85													
					20m	22.98	33.37	6.52	92.4	0.21	0.07	0.01	0.33	0.41	0.00				1.59	
					30m	22.83	33.55	6.66	94.1	0.26	0.07	0.05	0.40	0.52	0.01				2.50	
					40m	24.6	32.78													
					33m	21.99	33.53	6.49	90.4	0.10	0.45	0.19	1.70	2.34	0.15				11.36	
St. 12	42	9.13 9:06 ~ 9:16	6	17	0m	22.4	32.49			0.22	0.12	0.01	0.30	0.44	0.02	1.44				
					10m	23.14	32.91													
					20m	22.96	32.98	6.68	94.3	0.25	0.11	0.01	0.70	0.83	0.01				0.58	
					30m	21.55	33.02													
					33m	19.75	33.10	6.24	83.1	0.16	0.41	0.12	2.87	3.41	0.17				16.08	
					40m	17.74	33.76	6.13	79.0	0.19	2.84	0.44	0.18	3.46	0.23				14.42	
St. 13	41	9.13 10:05 ~ 10:15	6	17	0m	22.5	32.55			0.10	0.19	0.01	0.51	0.71	0.03	1.28				
					10m	22.87	32.65													
					20m	22.53	32.73	7.03	98.4	0.21	0.18	0.00	0.07	0.25	0.01				0.68	
					30m	21.62	32.95													
					40m	17.83	33.28													
					41m	17.71	33.36	6.28	80.7	0.29	1.76	1.18	0.08	3.02	0.14				18.58	
St. 14	39	9.13 11:40 ~ 11:48	5	16	0m	22.5	32.06			0.27	0.19	0.01	1.00	1.20	0.05	1.81				
					10m	22.80	32.58													
					20m	22.93	32.79	6.96	98.2	0.22	0.14	0.01	0.13	0.28	0.01				1.00	
					30m	21.87	33.19													
					40m	17.84	33.24	5.91	76.0	0.26	0.82	1.10	3.58	5.51	0.29				32.90	
					38m	18.67	33.18	5.53	72.2	0.29	0.56	0.73	2.85	4.14	0.20				26.05	

付表 1 b 水質調査結果

調査点	水深 m	月日 時刻	水色	透明度 m	調査 水深	水温 ℃	塩分	溶存酸素 mg/L %	COD mg/L	NO ₃ -N μmol/L	NO ₂ -N μmol/L	NH ₄ -N μmol/L	DIN μmol/L	PO ₄ -P μmol/L	SiO ₂ μmol/L	
St. 15	52	9.13 8:07 ~ 8:25	6	16	0m	22.7	32.65		0.19	0.15	0.01	0.45	0.61	0.01	0.97	
					10m	23.12	32.82							mizu		
					20m	23.16	33.00	6.77	95.9	0.26	0.12	0.01	0.54	0.68	0.01	1.50
					30m	22.92	33.31									
					40m	21.33	33.47									
					50m	17.57	33.82									
					51m	16.01	33.96	5.40	67.3	0.14	4.91	0.21	0.25	5.37	0.35	26.94
St. 16	46	9.13 13:40 ~ 13:49	5	16	0m	22.5	32.33		0.35	0.19	0.02	0.64	0.86	0.03	0.65	
					10m	22.98	32.69									
					20m	23.00	32.76	6.71	94.7	0.24	0.19	0.01	0.26	0.46	0.02	0.98
					30m	22.93	32.83									
					40m	18.55	33.12									
					45m	17.57	33.44	5.74	73.5	0.17	2.30	1.90	0.48	4.68	0.22	27.46
					45m	17.57	33.44	5.74	73.5	0.17	2.30	1.90	0.48	4.68	0.22	27.46
St. 17	39	9.13 12:19 ~ 12:30	5	20	0m	22.3	32.14		0.19	0.22	0.01	0.39	0.62	0.03	1.18	
					10m	22.84	32.59									
					20m	22.76	32.98	6.79	95.6	0.22	0.11	0.01	0.21	0.34	0.01	1.50
					30m	21.42	33.08									
					38m	17.67	33.33	5.72	73.4	0.24	0.64	0.97	1.40	3.01	0.13	18.91
St. 18	43	9.15 11:55 ~ 12:03	6	21	0m	23.7	32.20		0.56	0.22	0.01	0.24	0.47	0.01	3.19	
					10m	22.93	32.51									
					20m	22.53	32.80	6.94	97.2	0.35	0.23	0.00	0.03	0.26	0.01	0.87
					30m	22.66	33.57									
					40m	21.81	33.48									
					42m	21.64	33.46	6.56	90.7	0.17	0.41	0.28	0.84	1.53	0.06	3.96
St. 19	40	9.15 8:50 ~ 9:00	5	21	0m	22.8	32.57		0.08	0.16	0.01	0.14	0.31	0.02	1.37	
					10m	22.72	32.41									
					20m	22.84	32.62	6.86	96.4	0.26	0.15	0.01	0.43	0.59	0.01	0.92
					30m	22.41	33.02									
					39m	19.54	33.15	6.59	87.6	0.01	1.10	0.91	0.67	2.68	0.15	13.24
St. 20	40	9.15 10:55 ~ 11:02	5	22	0m	23.3	31.96		0.35	0.29	0.04	1.18	1.51	0.03	4.79	
					10m	22.82	32.48									
					20m	22.90	32.67	6.86	96.5	0.20	0.19	0.01	0.63	0.83	0.02	0.66
					30m	21.72	32.98									
					39m	20.85	33.42	6.59	89.8	0.14	0.66	0.65	0.91	2.23	0.12	7.90

付表2 底質調査結果

調査地点	水深 m	粒度組成					IL %	COD mg/g	フェオフィチン μg/g	TS mg/g
		>500 μm	500~250	250~125	125~63	63 μm<				
St. 1	18	28.95	23.94	39.54	3.79	3.77	0.03	4.52	3.09	0.02
St. 2	46	16.77	22.47	34.37	6.05	20.35	0.05	8.37	5.66	0.00
St. 3	53	4.24	17.43	34.43	9.76	34.14	0.05	20.27	7.53	0.05
St. 4	20	46.79	24.23	18.60	1.73	8.66	0.02	7.20	4.19	0.00
St. 5	30	65.11	15.39	6.56	2.20	10.74	0.05	2.59	3.75	0.02
St. 6	41	19.53	22.03	13.85	7.80	36.78	0.06	18.65	9.69	0.04
St. 7	19	52.84	18.61	15.09	3.49	9.98	0.02	4.89	6.07	0.02
St. 8	29	61.48	12.71	15.06	3.79	6.96	0.02	5.62	5.73	0.02
St. 9	40	7.53	19.45	9.53	14.38	49.10	0.11	35.25	16.09	0.15
St. 10	23	8.21	8.98	13.08	27.31	42.42	0.08	22.90	8.43	0.19
St. 11	31	4.46	11.04	11.76	28.71	44.03	0.09	26.39	9.81	0.21
St. 12	18	0.65	2.87	34.11	42.58	19.79	0.03	4.08	4.82	0.01
St. 13	29	1.63	7.84	8.89	31.43	50.21	0.09	25.04	9.17	0.12
St. 14	21	5.92	7.96	9.58	33.51	43.03	0.08	19.52	10.99	0.21
St. 15	36	1.99	10.07	11.23	25.72	50.99	0.10	30.47	13.78	0.13
St. 16	44	3.79	17.62	9.08	12.27	57.24	0.10	30.05	11.68	0.14
St. 17	24	3.66	18.38	58.60	10.82	8.55	0.02	2.92	4.89	0.01
St. 18	37	2.64	5.89	24.41	31.16	35.91	0.06	19.17	7.54	0.15
St. 19	23	30.79	29.50	23.09	7.64	8.97	0.02	3.64	3.54	0.02
St. 20	31	15.54	20.17	24.08	12.26	27.95	0.05	11.30	7.81	0.05
St. 21	41	4.67	21.02	9.73	13.82	50.76	0.09	26.38	11.90	0.09
St. 22	39	35.43	17.37	21.86	13.64	11.69	0.04	8.06	7.38	0.02
St. 23	43	5.55	12.26	11.84	21.35	49.01	0.08	21.31	17.37	0.04
St. 24	51	2.56	11.10	13.10	13.38	59.85	0.10	19.65	13.69	0.13
St. 25	51	2.17	10.52	16.44	14.73	56.14	0.09	23.90	13.93	0.57
St. 26	38	5.33	13.47	6.82	18.40	55.98	0.09	26.33	12.84	0.18
St. 27	44	6.21	14.64	7.93	17.58	53.65	0.09	11.83	14.35	0.20
St. 28	26	14.77	12.63	13.59	10.57	48.44	0.07	16.60	12.93	0.04
St. 29	31	32.25	12.06	14.05	8.67	32.97	0.05	13.33	9.21	0.04
St. 30	26	22.52	22.17	14.60	10.13	30.57	0.05	12.86	10.64	0.06
St. 31	30	24.58	23.39	17.33	10.80	23.91	0.05	11.80	10.83	0.02
St. 32	30	24.74	28.40	20.80	11.31	14.75	0.04	13.53	8.09	0.01
St. 33	53	1.61	14.51	12.69	8.97	62.22	0.10	31.20	15.79	0.14
St. 34	25	9.47	5.49	15.85	11.88	57.31	0.07	23.56	9.13	0.28
St. 35	34	13.82	6.30	16.62	10.49	52.77	0.06	18.88	11.94	0.09
St. 36	25	11.55	50.91	23.78	7.23	6.54	0.03	5.74	5.86	0.01
St. 37	29	13.32	21.24	15.32	18.48	31.65	0.04	7.99	7.65	0.00
St. 38	46	6.94	50.55	12.62	16.11	13.79	0.03	8.76	9.52	0.01
St. 39	58	5.93	24.09	26.86	10.44	32.69	0.05	12.72	13.15	0.04
St. 40	53	1.87	18.53	7.54	15.77	56.29	0.09	30.99	21.12	0.06
St. 41	45	0.55	5.68	55.13	27.95	10.69	0.04	5.69	7.53	0.00
St. 42	44	0.69	11.06	55.60	27.19	5.45	0.04	5.15	6.64	0.00

付表 3 a 底生生物の分類結果 (St. 1 ~ St. 13)

出現種学名	和名	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	St. 9	St. 10	St. 11	St. 12	St. 13
多毛類														
<i>Phylodoce</i> sp.		1				5								
<i>Eteone</i> sp.														
<i>Eumida</i> sp.		1				1								
<i>Aphrodita</i> sp.					1									
<i>Harmothoe</i> sp.		11			2			1						
<i>Glyptis</i> sp.					1									1
<i>Ophiodromus angustifrons</i>	モグリオトヒメ	1				1		1	1					2
Hesionidae	オトヒメゴカイ科													
<i>Ancistrosyllis</i> sp.														
<i>Cabira pilargiformis japonica</i>	ニホンカギゴカイ													
<i>Sigambra hanaokai</i>	ハナカガキゴカイ	1				1			1		7			1
Syllinae		12	2			1		1						
<i>Nectoneanthes latipoda</i>	ナゲギゴカイ													
<i>Nereis</i> sp.		1	7	2		11		5	2					
<i>Platynereis bicanaliculata</i>	ツルビダゴカイ							1						
<i>Tambalagamia fauveli</i>	カニコカイ													
<i>Glycera nicobarica</i>	ナカリ											1		3
<i>Glycera pseudorobusta</i>	フクオカダナリ													
<i>Glycera</i> sp.		1	2	2	5	3			2		3			
<i>Glycinde</i> sp.		12	7	1	7	6	1	7	6		14			10
<i>Goniada</i> sp.		1			3	4		2	1					2
<i>Paralacydonia paradoxa</i>	カギアソコカイ													
<i>Nephtys caeca</i>	ハヤシロカネゴカイ	4			3			1						7
<i>Nephtys longosetosa</i>	ナカシロカネゴカイ													6
<i>Eunice indica</i>	ヤリノマ	3												
<i>Lumbrineris amboinensis</i>	アンボシギホシイリメ													
<i>Lumbrineris japonica</i>	ギホシイリメ	1				1								
<i>Minoe palmata</i>	エラギホシイリメ													
<i>Scoletoma longifolia</i>	カクマカリギホシイリメ		13	6			6		1	1	70	17		3
<i>Scoletoma</i> sp.			1											
<i>Drilonereis</i> sp.														
<i>Leitoscoloplos pugettensis</i>	ナカホコムシ	2							1					1
<i>Phylo</i> sp.														
<i>Scoloplos</i> sp.														
<i>Aricidea</i> sp.		2	1						1		4			1
<i>Cirrophorus miyakoensis</i>														
<i>Apistobranchus</i> sp.	ミヤコヒメゴカイ	1				1					1			
<i>Laonice</i> sp.					2	1		1			1			
<i>Paraprionospio</i> sp. Type C1										1		3		
<i>Polydora</i> sp.			51											
<i>Prionospio ehlersi</i>	エーレルスヒオ													

付表 3 a 底生生物の分類結果 (St. 1 ~ St. 13)

2/5

出現種学名	和名	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	St. 9	St. 10	St. 11	St. 12	St. 13
<i>Prionospio sexoculata</i>	ヲイリスビオ	2									4		2	
<i>Pseudopolydora</i> sp.											1			
<i>Scolecopsis</i> sp.		1											1	
<i>Spiophanes kroeyeri</i>	ススィヲリスビオ	1												
<i>Heterospio</i> sp.														
<i>Magelona japonica</i>	モロコカイ		1	1						1	4	1		
<i>Poecilochaetus</i> sp.		1							1					
<i>Spiochaetopterus</i> sp.											1			
<i>Acrocirrus</i> sp.			5											
<i>Chaetozone</i> sp.					1	2								
<i>Tharyx</i> sp.								1						
<i>Cossura</i> sp.														
<i>Brada villosa</i>	チロリアホウキ	2												
<i>Diplocirrus</i> sp.		5			7	10		5						
<i>Leiochrides</i> sp.						2			2					
<i>Notomastus</i> sp.		4	2						4		6			1
<i>Mediomastus</i> sp.														
<i>Pullioella</i> sp.														
<i>Nicomache</i> sp.		2						1						
<i>Clymeneella</i> sp.			4						9					1
<i>Praxillella gracilis</i>	サカハチケツゴカイ													
<i>Praxillella pacifica</i>	サカオケツゴカイ		1			1		1	2					
<i>Maldane cristata</i>	ホリケツゴカイ		13	3				3	3					
<i>Maldane pigmentata</i>	ヒョウモンケツゴカイ	4				8		3	16				4	
Maldanidae	ケツゴカイ科	5	2		1								11	
<i>Ophelina acuminata</i>														
<i>Scalibregma inflatum</i>	トノサゴカイ		24	6		6	21		2	4				
<i>Cistenides hyperborea</i>		1	1		2	1		1	1					
<i>Lagis bocki</i>	カミイゴムシ	3			1	2		9	8		1			
<i>Melinna</i> sp.								4						
<i>Asabellides</i> sp.			2	16	1	2			1					
<i>Amphicteis</i> sp.			1		1	1			1					
<i>Auchenopliax</i> sp.														
<i>Eupolyminia</i> sp.						3								
<i>Laphania</i> sp.														
<i>Loimia</i> sp.						1								
<i>Nicolea</i> sp.					1			1					1	
<i>Pista</i> sp.														
<i>Amaeana</i> sp.		1												
<i>Streblosoma</i> sp.						1								
Terebellidae	ツバゴカイ科					1								
<i>Terebellides horikoshii</i>	フトケビタマケツツバゴカイ		1					1	1		1			

付表 3 a 底生生物の分類結果 (St. 1 ~ St. 13)

出現種学名	和名	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	St. 9	St. 10	St. 11	St. 12	St. 13
<i>Trichobranchus bibrachiatu</i>	ヒトリツグツグカイ													
<i>Euchone</i> sp.					10	1		1			6			
<i>Chone</i> sp.					1	1		5						
Sabellidae	ケヤリ科							1						
甲殻類														
<i>Vargula hilgendorffii</i>	ウミホタル	1												
Cypridinidae	ウミホタル科	8												
<i>Euphilomedes japonica</i>	ウミホタルトキ	10			1				4					
Ostracoda	かじり目	2												
<i>Nebalia japonensis</i>	コハヒ					1								
Mysidae	アミ科													
<i>Bodotria</i> sp.	ナギサケマ属													
<i>Eocuma spiniferum</i>	ツリガハリタシケマ													
<i>Campylaspis</i> sp.	サイツサケマ属	2												
<i>Dimorphostylis</i> sp.	サツサケマ属					2			3					
Gnathiidae	ウミクダ科								2					
<i>Paranthura</i> sp.	ウミナツシ属							1						
<i>Symphysus caudatus</i>	ヤホホラムシ	1												
<i>Natatolana japonensis</i>	ヤマトスナホラムシ													
<i>Ampelisca brevicornis</i>	カレガサガメ	1											5	
<i>Ampelisca cyclops</i>	ヒトツメガメ													
<i>Ampelisca miharaensis</i>	ヒツガサガメ				1				1					
<i>Ampelisca misakiensis</i>	ミサキガメ													1
<i>Ampelisca naikaiensis</i>	ナカイガメ	3						1						
<i>Byblis japonicus</i>	ニホホサガメ	1			8			5						
<i>Cerapus erae</i>	イホツツムシ	1												
<i>Jassa</i> sp.	カマキヨコヒ属									7				
<i>Melita</i> sp.	メダヨコヒ属				3									
<i>Nippopisella nagatai</i>	ノロヨコヒ	15						1						7
<i>Liljeborgia serrata</i>	ユトメヨコヒ													
<i>Anonyx</i> sp.	ツリガヨコヒ属				2	1								1
Lysianassidae	ツリガヨコヒ科													
<i>Synchelidium</i> sp.	サンハヨコヒ属	2		1	1	2								1
<i>Urothoe</i> sp.	マルソコヒ属	1												4
<i>Caprella</i> sp.	ウレガ属	4												1
<i>Leptocheila sydnensis</i>	マルソコヒ													
<i>Alpheus japonicus</i>	アホガチホ													
<i>Alpheus</i> sp.	アホガチホ属													
<i>Callinassa</i> sp.	ササガチホ属													
<i>Asthenognathus inaequipes</i>	ヨコガチホ													
棘皮類														
<i>Luidia quinaria</i>	スヒト					1								

付表3 a 底生生物の分類結果 (St. 1～St. 13)

出現種学名	和名	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	St. 9	St. 10	St. 11	St. 12	St. 13
<i>Astropecten scoparius</i>	モシノガイ													1
<i>Amphiura</i> sp.														1
<i>Amphioplus japonicus</i>	カキウモヒト	112			25	18		8					28	
<i>Ophiura kinbergi</i>	クシノウモヒト	1	3										3	
<i>Schizaster lacunosus</i>	フシノクサカマ													
<i>Echinocardium cordatum</i>	ホカメノウケ	1			1									1
Cucumariidae	キノコ科	2			1	3		4						
Synaptidae	イカリマコ科	2	1		1			1	1		2			
軟体類														
<i>Lepidopleurus</i> sp.	サハダヒザガガイ属	4			8	13		31						
Ischnochitonidae	ウスヒザガガイ科				1	1		4						
<i>Philina argentata</i>	キセウガイ	3		3	1	2							2	
<i>Yokoyamaia ornativissima</i>	ヨコヤマキセウ	1												
<i>Petrasma japonica</i>	アサヒキヌタレガイ							1						
<i>Petrasma pusilla</i>	キヌタレガイ							1						
<i>Acila insignis</i>	キラガイ	2	14		1	1							1	
<i>Ennucula niponica</i>	クルミガイ		1											
<i>Yoldia johanni</i>	エンゾノガイ		1											
<i>Modiolus</i> sp.	ヒバリガイ属													
<i>Limaria hakodatensis</i>	フレユキミノガイ													
<i>Thyasira tokunagai</i>	ハナガイ					1			3					
<i>Lucinoma annulata</i>	ツカイモトキ			1	2	1		2		1				
<i>Wallucina striata</i>	チヂミカハナガイ	3												
<i>Fulvia</i> sp.	トリガイ属	1			2									1
<i>Phacosoma japonicum</i>	カクミガイ													1
<i>Theora fragilis</i>	シノガイ										5			
<i>Nitidote'llina minuta</i>	ウスザクラガイ	9			1			1			4			
<i>Nitidote'llina nitidula</i>	サクラガイ	1												10
<i>Laternula anatina</i>	オキガイ				3									
その他														
<i>Cavernularia obesa</i>	ウミサボテン													1
Edwardsiidae	シモトギノキノチャク科				1									
Actiniaria	イソギノチャク目	1												3
<i>Cerianthus</i> sp.														1
Polycladida	ヒラムシ目			1	1	2								
Heteronemertini	ヒラムシ目	2	2	1	1	2			1					
NEMERTINEA	ひも形動物門	13	11	1	1	12	1	6	1		8			1
Golfingiidae	フクロシジ科		1		1				1					
<i>Aplousoma</i> sp.	イトクスホムシ属													
<i>Phoronis</i> sp.		11												
<i>Lingula unguis</i>	ミドリシヤミセンガイ	8			1	2		4	1					
Balanoglossida	キノボシムシ目													1

付表3 a 底生生物の分類結果 (St. 1~St. 13)

出現種学名	和名	St. 1	St. 2	St. 3	St. 4	St. 5	St. 6	St. 7	St. 8	St. 9	St. 10	St. 11	St. 12	St. 13
Acentorogobius pflaumi	スジハゲ													
種別 (汚染指標生物)														
ヨツハネスピオA型	個体数													
ヨツハネスピオB型	個体数													
シズクガイ	個体数										5			
チヨノハナガイ	個体数													
多毛類	種類数	29	18	8	19	27	4	24	22	4	17	4	15	4
	個体数	87	135	37	55	78	29	56	67	7	128	24	53	6
	編組比率(%)	27.5	79.4	82.2	44.0	55.7	96.7	44.1	78.8	43.8	86.5	100.0	41.7	85.7
	質量(g)	4.13	3.09	0.57	2.23	1.83	0.30	3.58	2.92	0.14	1.64	0.48	2.37	0.16
	種類数	14	0	1	7	3	0	4	4	2	0	0	6	0
甲殻類	個体数	52	0	1	17	5	0	8	10	8	0	0	19	0
	編組比率(%)	16.5	0.0	2.2	13.6	3.6	0.0	6.3	11.8	50.0	0.0	0.0	15.0	0.0
	質量(g)	0.12	0.00	0.01	0.12	0.02	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00
	種類数	5	2	0	4	3	0	3	1	0	1	0	5	0
	個体数	118	4	0	28	22	0	13	1	0	2	0	34	0
棘皮類	編組比率(%)	37.3	2.4	0.0	22.4	15.7	0.0	10.2	1.2	0.0	1.4	0.0	26.8	0.0
	質量(g)	9.26	0.06	0.00	2.47	19.93	0.00	4.02	0.01	0.00	0.66	0.00	15.89	0.00
	種類数	8	3	2	8	6	0	6	1	1	2	0	5	0
	個体数	24	16	4	19	19	0	40	3	1	9	0	15	0
	編組比率(%)	7.6	9.4	8.9	15.2	13.6	0.0	31.5	3.5	6.3	6.1	0.0	11.8	0.0
軟体動物	質量(g)	1.53	7.28	3.29	0.16	0.72	0.00	0.52	0.12	23.53	0.28	0.00	14.70	0.00
	種類数	5	4	3	5	3	1	2	4	0	2	0	4	1
	個体数	35	15	3	6	16	1	10	4	0	9	0	6	1
	編組比率(%)	11.1	8.8	6.7	4.8	11.4	3.3	7.9	4.7	0.0	6.1	0.0	4.7	14.3
	質量(g)	11.25	0.11	0.13	0.04	0.03	0.00	4.23	0.06	0.00	0.04	0.00	0.16	4.83
合計	種類数	61	27	14	43	42	5	39	32	7	22	4	35	5
	個体数	316	170	45	125	140	30	127	85	16	148	24	127	7
	質量(g)	26.29	10.54	4.00	5.02	22.53	0.30	12.38	3.13	23.68	2.62	0.48	33.15	4.99
	多様度指数 H' (bit)	6.41	3.58	3.08	4.62	4.67	1.32	4.40	4.36	2.27	3.07	1.29	4.28	2.13

付表 3 b 底生生物の分類結果 (St. 14~St. 26)

1/5

出現種学名	和名	St. 14	St. 15	St. 16	St. 17	St. 18	St. 19	St. 20	St. 21	St. 22	St. 23	St. 24	St. 25	St. 26
多毛類														
<i>Phylodoce</i> sp.					1									
<i>Eteone</i> sp.														
<i>Eumida</i> sp.														
<i>Aphrodita</i> sp.														
<i>Harmothoe</i> sp.					1		2							
<i>Glyptis</i> sp.														
<i>Ophiodromus angustifrons</i>	モグリオトヒメ													
Hesionidae	オトヒメゴカイ科											1		
<i>Ancistrosyllis</i> sp.														
<i>Cabira pilargiformis japonica</i>	ニホンカギゴカイ					1				1				
<i>Sigambra hanaokai</i>	ハナカガキゴカイ	1				1					3			
Syllinae							2							
<i>Nectoneanthes latipoda</i>	ナゲギゴカイ													1
<i>Nereis</i> sp.								3						
<i>Platynereis bicanaliculata</i>	ツルビダゴカイ													
<i>Tambalagamia fauveli</i>	カニコカイ													
<i>Glycera nicobarica</i>	ナマリ					3	1			2				
<i>Glycera pseudorobusta</i>	フカオカダナマリ													
<i>Glycera</i> sp.		1			2									
<i>Glycinde</i> sp.							3				2			
<i>Goniada</i> sp.						11	5	1			3	2		
<i>Paralacydonia paradoxa</i>	カギアソコカイ				3									
<i>Nephtys caeca</i>	ハヤシロカネゴカイ				7									
<i>Nephtys longosetosa</i>	ナカシロカネゴカイ													
<i>Eunice indica</i>	ヤリアソコ													
<i>Lumbrineris amboinensis</i>	アンボソギホシイソメ													
<i>Lumbrineris japonica</i>	ギホシイソメ													
<i>Ninoe palmata</i>	エラギホシイソメ													1
<i>Scoletoma longifolia</i>	カクマカリギホシイソメ	2		1		26		30	2	11	11	2	2	1
<i>Scoletoma</i> sp.														
<i>Drilonereis</i> sp.														
<i>Leitoscoloplos pugettensis</i>	ナカホコムシ													
<i>Phylo</i> sp.														
<i>Scoloplos</i> sp.														
<i>Aricidea</i> sp.										1				
<i>Cirrophorus miyakoensis</i>	ミヤコヒメエラゴカイ													
<i>Apistobranchus</i> sp.														
<i>Laonice</i> sp.														
<i>Paraprionospio</i> sp. Type C1						1		8						
<i>Polydora</i> sp.														
<i>Prionospio ehlersi</i>	エーレルスビオ													

付表 3 b 底生生物の分類結果 (St. 14~St. 26)

2/5

出現種学名	和名	St. 14	St. 15	St. 16	St. 17	St. 18	St. 19	St. 20	St. 21	St. 22	St. 23	St. 24	St. 25	St. 26
<i>Prionospio sexoculata</i>	フナエビオ													
<i>Pseudopolydora</i> sp.														
<i>Scoletopis</i> sp.														
<i>Spiophanes kroeyeri</i>	スエウチノエビ							1		1				
<i>Heterospio</i> sp.														
<i>Magelona japonica</i>	モロコエビ	1					1	1		2	1	1		
<i>Poecilochaetus</i> sp.				3										
<i>Spiochaetopterus</i> sp.						1								1
<i>Acrocirrus</i> sp.														
<i>Chaetozone</i> sp.					1					1				
<i>Tharyx</i> sp.							1							
<i>Cossura</i> sp.														
<i>Brada villosa</i>	チロハネウシ													
<i>Diplocirrus</i> sp.							1							
<i>Leiochrides</i> sp.							1	1		2				
<i>Notomastus</i> sp.				1			1	4		2				2
<i>Mediomastus</i> sp.														
<i>Pullioella</i> sp.										2	1			
<i>Nicomache</i> sp.														
<i>Clymeneella</i> sp.					1		1							
<i>Praxillella gracilis</i>	ナガハチケツゴカイ													
<i>Praxillella pacifica</i>	ナガオチケツゴカイ													
<i>Maldane cristata</i>	ホリケツゴカイ													
<i>Maldane pigmentata</i>	ヒョウモンケツゴカイ						44							
Maldanidae	ケツゴカイ科							5						
<i>Ophelina acuminata</i>				1										
<i>Scalibregma inflatum</i>	トノサゴカイ									2	92		4	
<i>Cistenides hyperborea</i>														
<i>Lagis bocki</i>	ウミイゴムシ				4		1							
<i>Melinna</i> sp.														
<i>Asabellides</i> sp.														
<i>Amphicteis</i> sp.														9
<i>Auchenopanax</i> sp.														
<i>Eupolyminia</i> sp.														
<i>Laphania</i> sp.														
<i>Loimia</i> sp.							1							
<i>Nicolea</i> sp.														
<i>Pista</i> sp.														
<i>Anaeana</i> sp.														
<i>Streblosoma</i> sp.														
Terebellidae	フサゴカイ科													
<i>Terebellides horikoshii</i>	フトケビタマシフサゴカイ												1	

付表 3 b 底生生物の分類結果 (St. 14～St. 26)

3/5

出現種学名	和名	St. 14	St. 15	St. 16	St. 17	St. 18	St. 19	St. 20	St. 21	St. 22	St. 23	St. 24	St. 25	St. 26
<i>Trichobranthus bibrachiatu</i>	ヒモエダマシノガイ													
<i>Euchone</i> sp.							1							
<i>Chone</i> sp.														
Sabelliidae	ケヤリ科													
甲殻類														
<i>Vargula hilgendorffii</i>	ウミホタル													
Cypridiniidae	ウミホタル科													
<i>Euphilomedes japonica</i>	ウミホタルトキ				13		4							
Ostracoda	かじり目				1									
<i>Mebalia japonensis</i>	コハヒ						1							
Mysidae	アミ科													
<i>Bodotria</i> sp.	オキサカマ属				5									
<i>Eocuma spiniferum</i>	ツリガハリタシケマ				1									
<i>Campylaspis</i> sp.	サイツサカマ属													
<i>Dimorphostylis</i> sp.	ササミカマ属													
Gnathiidae	カミクガタ科													
<i>Paranthura</i> sp.	ウミナガシ属													
<i>Symphysius caudatus</i>	ヤホホアラシ													
<i>Natatolana japonensis</i>	ヤマトスナホリムシ													
<i>Ampelisca brevicornis</i>	カレガサガメ				108		1							
<i>Ampelisca cyclops</i>	ヒトツメガメ													
<i>Ampelisca miharaensis</i>	ヒゲガサガメ													
<i>Ampelisca misakiensis</i>	ミサキガメ													
<i>Ampelisca naikaiensis</i>	フクロガメ													
<i>Byblis japonicus</i>	ニホホサカメ						2							
<i>Cerapus erae</i>	イホツツムシ													
<i>Jassa</i> sp.	カマキヨコヒ属													
<i>Melita</i> sp.	メダヨコヒ属										1			
<i>Nippopisella nagatai</i>	ドヨコヒ						1							
<i>Liljeborgia serrata</i>	ヨドメガヨコヒ				1									
<i>Anonyx</i> sp.	ツリガヨコヒ属				1									
Lysianassidae	フトヒヨコヒ科				2									
<i>Synchelidium</i> sp.	サンハツヨコヒ属				4									
<i>Urothoe</i> sp.	マルソコヒ属				2									
<i>Caprella</i> sp.	ワレカ属													
<i>Leptocheila sydneyensis</i>	マルソコヒ													
<i>Alpheus japonicus</i>	チカチホガヒ													
<i>Alpheus</i> sp.	チホガヒ属						1							
<i>Callinassa</i> sp.	ササガヒ属													
<i>Asthenognathus inaequipes</i>	ヨコガトキ													
棘皮類														
<i>Luidia quinaria</i>	スヒト													

付表3 b 底生生物の分類結果 (St. 14~St. 26)

出現種学名	和名	St. 14	St. 15	St. 16	St. 17	St. 18	St. 19	St. 20	St. 21	St. 22	St. 23	St. 24	St. 25	St. 26
<i>Astropecten scoparius</i>	モシノガイ													
<i>Amphiura</i> sp.														
<i>Amphioplus japonicus</i>	カキクモヒトデ				9		5							
<i>Ophiura kinbergi</i>	クシハノモヒトデ				1									
<i>Schizaster lacunosus</i>	フノヅクサカマ													
<i>Echinocardium cordatum</i>	オカメノヅク				2		1							
Cucumariidae	キノコ科													
Synaptidae	イカリマコ科													
軟体類														
<i>Lepidopleurus</i> sp.	サハダヒザクラガイ属						3							
Ischnochitonidae	ウスヒザクラガイ科													
<i>Philine argentata</i>	キセウタガイ						1							
<i>Yokoyamaia ornaticissima</i>	ヨコヤマキセウタ					1								
<i>Petrasma japonica</i>	アサヒキヌタレガイ				2									
<i>Petrasma pusilla</i>	キヌタレガイ						1							
<i>Acila insignis</i>	キラガイ													
<i>Ennucula niponica</i>	カシミガイ													
<i>Yoldia johanni</i>	エンゾノガイ													
<i>Modiolus</i> sp.	ヒバリガイ属													
<i>Limaria hakodatensis</i>	フクユキミノガイ													
<i>Thyasira tokunagai</i>	ハナガイ						1							
<i>Lucinoma annulata</i>	ツキガイモドキ						1							
<i>Wallucina striata</i>	チヂミカノハガイ													
<i>Fulvia</i> sp.	トリガイ属													
<i>Phacosoma japonicum</i>	カカミガイ													
<i>Theora fragilis</i>	シノガイ													
<i>Nitidote'llina minuta</i>	ウスザクラガイ						2							
<i>Nitidote'llina nitidula</i>	サクラガイ				3									
<i>Laternula anatina</i>	オキガイ				1									
その他														
<i>Cavernularia obesa</i>	ウミサボテン					1								
Edwardsiidae	シモトギノツバク科				4									
Actiniaria	イソギノツバク目				3									
<i>Cerianthus</i> sp.							1							
Polycladida	ヒラムシ目				1									
Heteronemertini	ヒラムシ目													
NEMERTINEA	ひも形動物門					1	1	2	4	3	2	1		
Golfingiidae	フクロシジ科													
<i>Aplousoma</i> sp.	イトクスホムシ属													
<i>Phoronis</i> sp.							5							
<i>Lingula unguis</i>	ミドリシヤミセンガイ						5							
Balanoglossida	キノボシムシ目													

付表3 b 底生生物の分類結果 (St. 14~St. 26)

出現種学名	和名	St. 14	St. 15	St. 16	St. 17	St. 18	St. 19	St. 20	St. 21	St. 22	St. 23	St. 24	St. 25	St. 26
Acentorogobius pflaumi	スジハゲ													
種別 (汚染指標生物)														
ヨツハネスピオA型	個体数													
ヨツハネスピオB型	個体数													
シズクガイ	個体数													
チヨノハナガイ	個体数													
多毛類	種類数	5	0	3	10	6	19	9	1	14	9	4	6	2
	個体数	7	0	3	34	33	72	56	2	35	115	6	19	2
	編組比率(%)	100.0	-	100.0	17.2	91.7	66.1	96.6	100.0	89.7	96.6	75.0	95.0	100.0
	質量(g)	0.49	0.00	0.27	2.04	0.82	10.79	0.88	0.02	1.43	4.48	0.06	0.71	0.11
	種類数	0	0	0	10	0	6	0	0	0	1	0	0	0
甲殻類	個体数	0	0	0	138	0	10	0	0	0	1	0	0	0
	編組比率(%)	0.0	-	0.0	69.7	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
	質量(g)	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	種類数	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0
	個体数	0	0	0	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0
棘皮類	編組比率(%)	0.0	-	0.0	6.1	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	質量(g)	0.00	0.00	0.00	8.44	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	種類数	0	0	0	3	1	6	0	0	0	0	0	0	0
	個体数	0	0	0	6	1	9	0	0	0	0	0	0	0
	編組比率(%)	0.0	-	0.0	3.0	2.8	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
軟体動物	質量(g)	0.00	0.00	0.00	0.30	0.01	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	種類数	0	0	0	3	2	4	1	0	1	1	1	1	0
	個体数	0	0	0	8	2	12	2	0	4	3	2	1	0
	編組比率(%)	0.0	-	0.0	4.0	5.6	11.0	3.4	0.0	10.3	2.5	25.0	5.0	0.0
	質量(g)	0.00	0.00	0.00	0.32	21.24	4.16	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.05	7.37
その他	種類数	5	0	3	29	9	37	10	1	15	11	5	7	2
	個体数	7	0	3	198	36	109	58	2	39	119	8	20	2
	編組比率(%)	0.49	0.00	0.27	11.60	22.07	18.65	0.89	0.02	1.45	4.49	0.11	8.08	0.11
	質量(g)	2.24	0.00	1.58	2.94	1.64	3.86	2.37	0.00	3.45	1.39	2.25	2.30	1.00
	多様度指数 H' (bit)													

付表 3 c 底生生物の分類結果 (St. 27~St. 39)

出現種学名	和名	St. 27	St. 28	St. 29	St. 30	St. 31	St. 32	St. 33	St. 34	St. 35	St. 36	St. 37	St. 38	St. 39
多毛類														
<i>Phylodoce</i> sp.											3			
<i>Eteone</i> sp.											1	3		
<i>Eumida</i> sp.											1	1		
<i>Aphrodita</i> sp.														
<i>Harmothoe</i> sp.			1								3	3	2	
<i>Glyptis</i> sp.		1												
<i>Ophiodromus angustifrons</i>	モグリオトヒメ			1						1	2			
Hesionidae	オトヒメゴカイ科													
<i>Ancistrosyllis</i> sp.													2	
<i>Cabira pilargiformis japonica</i>	ニホンカギゴカイ					2	1			1	2	2	2	2
<i>Sigambra hanaokai</i>	ハナカガキゴカイ		5			1					3			
Syllinae														
<i>Nectoneanthes latipoda</i>	ナゲギゴカイ													
<i>Nereis</i> sp.			2	2	3	5				1	1	1	1	2
<i>Platynereis bicanaliculata</i>	ツルビダゴカイ													
<i>Tambalagamia fauveli</i>	カニコカイ										1			
<i>Glycera nicobarica</i>	ナマリ		1	1	1		1				2		1	
<i>Glycera pseudorobusta</i>	フカオカダナマリ							1						
<i>Glycera</i> sp.								1		1		2	1	1
<i>Glycinde</i> sp.			5		2	6	3		3		10	4	2	1
<i>Goniada</i> sp.											4	6		
<i>Paralacydonia paradoxa</i>	カギアソコカイ				1									
<i>Nephtys caeca</i>	ハヤシロカネゴカイ													
<i>Nephtys longosetosa</i>	ナカシロカネゴカイ										1			
<i>Eunice indica</i>	ヤリノマ										10			
<i>Lumbrineris amboinensis</i>	アンボシギボシイメ		5			1							10	
<i>Lumbrineris japonica</i>	ギボシイメ													
<i>Minoe palmata</i>	エラギボシイメ												1	1
<i>Scoletoma longifolia</i>	カクマカリギボシイメ	7	44	13	32	23	7	1	47	31				4
<i>Scoletoma</i> sp.														
<i>Drilonereis</i> sp.											1	1		
<i>Leitoscoloplos pugettensis</i>	ナカホコムシ													
<i>Phylo</i> sp.														
<i>Scoloplos</i> sp.														
<i>Aricidea</i> sp.		1												1
<i>Cirrophorus miyakoensis</i>	ミヤコヒメゴカイ					1							1	1
<i>Apistobranchus</i> sp.											2			
<i>Laonice</i> sp.		1									2			
<i>Paraprionospio</i> sp. Type C1		1				1			4	1				1
<i>Polydora</i> sp.											32			
<i>Prionospio ehlersi</i>	エーレルスヒオ											1		

付表 3 c 底生生物の分類結果 (St. 27~St. 39)

2/5

出現種学名	和名	St. 27	St. 28	St. 29	St. 30	St. 31	St. 32	St. 33	St. 34	St. 35	St. 36	St. 37	St. 38	St. 39
<i>Prionospio sexoculata</i>	マナシカク										1			
<i>Pseudopolydora</i> sp.			3											
<i>Scoletopis</i> sp.											1			
<i>Spiophanes kroeyeri</i>	スシカク	1	2		1						2			
<i>Heterospio</i> sp.														
<i>Magelona japonica</i>	マナシカク		2		2	4					1		1	2
<i>Poecilochaetus</i> sp.											7	4		
<i>Spirochaetopterus</i> sp.			1	2	1	2								
<i>Acrocirrus</i> sp.														
<i>Chaetozone</i> sp.			1								4		1	
<i>Tharyx</i> sp.			1								32	2		
<i>Cossura</i> sp.							1							
<i>Brada villosa</i>	マナシカク													
<i>Diplocirrus</i> sp.											1			
<i>Leiochrides</i> sp.			5		6	1			1		1	7	7	1
<i>Notomastus</i> sp.		2	7	4	5	7	3		5	3	6	6	1	
<i>Mediomastus</i> sp.			3			2					1			
<i>Pullioella</i> sp.														4
<i>Nicomache</i> sp.														
<i>Glymenella</i> sp.			1											
<i>Praxillella gracilis</i>	マナシカク		1										1	
<i>Praxillella pacifica</i>	マナシカク		1		3	5				1		5	1	
<i>Maldane cristata</i>	マナシカク													
<i>Maldane pigmentata</i>	マナシカク	3	1		9	5					2			
Maldanidae	マナシカク科	7			2	3					1	3		
<i>Ophelina acuminata</i>														
<i>Scalibregma inflatum</i>	マナシカク						3	14		4	50	7	72	32
<i>Cistenides hyperborea</i>														
<i>Lagis bocki</i>	マナシカク		3			1			1		1			
<i>Melinna</i> sp.											1			
<i>Asabellides</i> sp.							1				1		1	12
<i>Amphicteis</i> sp.														
<i>Auchenopliax</i> sp.												2		
<i>Eupolyminia</i> sp.														
<i>Laphania</i> sp.										1	1			
<i>Loimia</i> sp.														
<i>Nicolea</i> sp.											5	23	27	
<i>Pista</i> sp.														
<i>Anaeana</i> sp.														
<i>Streblosoma</i> sp.														
Terebellidae	マナシカク科		1											
<i>Terebellides horikoshii</i>	マナシカク	1	3	1	2	1	1		2					2

付表 3 c 底生生物の分類結果 (St. 27~St. 39)

出現種学名	和名	St. 27	St. 28	St. 29	St. 30	St. 31	St. 32	St. 33	St. 34	St. 35	St. 36	St. 37	St. 38	St. 39
<i>Trichobranthus bibrachiatu</i>	ヒモエダマツノコガイ		1				1				7	3		
<i>Euchone</i> sp.					1									
<i>Chone</i> sp.														
Sabelliidae	ケヤリ科													
甲殻類														
<i>Vargula hilgendorffii</i>	ウミホタル										15			
Gypridinidae	ウミホタル科										5			
<i>Euphilomedes japonica</i>	ウミホタルモドキ											1		
Ostracoda	かたし目											1		
<i>Mebalia japonensis</i>	コハヒ										1			
Mysidae	アミ科													
<i>Bodotria</i> sp.	ナギサケマ属													
<i>Eocuma spiniferum</i>	ツリガ ハリダ シケマ													
<i>Campylaspis</i> sp.	サイツ サケマ属													
<i>Dimorphostylis</i> sp.	サツ ナミサケマ属										1			
Gnathiidae	カミクガタ科													
<i>Paranthura</i> sp.	ウミナナジ属													
<i>Symphysius caudatus</i>	ヤホホ ムラムシ													
<i>Natatolana japonensis</i>	ヤマトスナホリムシ													
<i>Ampelisca brevicornis</i>	カビガ スガメ										2			
<i>Ampelisca cyclops</i>	ヒトツメガメ													
<i>Ampelisca miharaensis</i>	ヒゲガ スガメ													
<i>Ampelisca misakiensis</i>	ミサキガメ													
<i>Ampelisca naikaiensis</i>	ナカガメ										2			
<i>Byblis japonicus</i>	ニホホ ムサギメ										1	1		
<i>Cerapus erae</i>	イホツツムシ													
<i>Jassa</i> sp.	カマキヨコヒ 属													
<i>Melita</i> sp.	メダヨコヒ 属													
<i>Nippopisella nagatai</i>	ドモヨコヒ										10			
<i>Liljeborgia serrata</i>	ヨトメヨコヒ 属													
<i>Anonyx</i> sp.	ツリガ ヲコヒ 属										1			
Lysianassidae	フトヒ ヲコヒ 科										1	1		
<i>Synchelidium</i> sp.	サンハ ヲコヒ 属											1	1	
<i>Urothoe</i> sp.	マルソコヒ 属										1			
<i>Caprella</i> sp.	カハラ属					4								
<i>Leptochela sydhensis</i>	マルソコヒ													
<i>Alpheus japonicus</i>	テリガ テホ ヲコヒ							1						
<i>Alpheus</i> sp.	テホ ヲコヒ 属				1							1		
<i>Callinassa</i> sp.	スナモリ 属											1		
<i>Asthenognathus inaequipes</i>	ヨコガ モドキ				2									
棘皮類														
<i>Luidia quinaria</i>	スナヒナ													

付表3 c 底生生物の分類結果 (St. 27~St. 39)

出現種学名	和名	St. 27	St. 28	St. 29	St. 30	St. 31	St. 32	St. 33	St. 34	St. 35	St. 36	St. 37	St. 38	St. 39
<i>Astropecten scoparius</i>	モシノガイ										1			
<i>Amphiura</i> sp.														
<i>Amphioplus japonicus</i>	カキクモヒトデ	1							1		6			
<i>Ophiura kinbergi</i>	クシノウモヒトデ										4			
<i>Schizaster lacunosus</i>	フシノクサカマ													
<i>Echinocardium cordatum</i>	ホカメノフグク													
Cucumariidae	キノ科													
Synaptidae	イカリマコ科		2								1			
軟体類														
<i>Lepidopleurus</i> sp.	サハダヒザノガイ属													
Ischnochitonidae	ウスヒザノガイ科													
<i>Philina argentata</i>	キセウタガイ										5			
<i>Yokoyamaia ornativissima</i>	ヨコヤマキセウタ								2				1	
<i>Petrasma japonica</i>	アサヒキヌタレガイ													
<i>Petrasma pusilla</i>	キヌタレガイ													
<i>Acila insignis</i>	キラガイ													
<i>Ennucula niponica</i>	クルミガイ													
<i>Yoldia johanni</i>	エンゾノガイ													
<i>Modiolus</i> sp.	ヒバリガイ属										1			
<i>Limaria hakodatensis</i>	フクレユキノガイ										1			
<i>Thyasira tokunagai</i>	ハナガイ		1			1							2	
<i>Lucinoma annulata</i>	ツキガイモドキ													
<i>Wallucina striata</i>	チヂミカノハガイ													
<i>Fulvia</i> sp.	トリガイ属													
<i>Phacosoma japonicum</i>	カカミガイ													
<i>Theora fragilis</i>	シノガイ								2					
<i>Nitidote'llina minuta</i>	ウスザクラガイ		2			1					5		2	
<i>Nitidote'llina nitidula</i>	サクラガイ													
<i>Laternula anatina</i>	オキガイ										2			
その他														
<i>Cavernularia obesa</i>	ウミサボテン													
Edwardsiidae	シメトギノフヤク科		3		1									1
Actiniaria	イソギノフヤク目		4		3						2			1
<i>Cerianthus</i> sp.														
Polycladida	ヒラムシ目													
Heteronemertini	ヒラムシ目					1					1	2		
NEMERTINEA	ひも形動物門	1	2		1	8					25	1	10	1
Golfingiidae	フクロシジ科													
<i>Aplousoma</i> sp.	イトクスホムシ属													2
<i>Phoronis</i> sp.														
<i>Lingula unguis</i>	ミドリシヤミセンガイ													
Balanoglossida	キノシムシ目				1	1					1			

付表 3 c 底生生物の分類結果 (St. 27~St. 39)

出現種学名	和名	St. 27	St. 28	St. 29	St. 30	St. 31	St. 32	St. 33	St. 34	St. 35	St. 36	St. 37	St. 38	St. 39	
Acentorogobius pflaumi	スジハゲ														
種別 (汚染指標生物)															
ヨツバナスピオA型	個体数														
ヨツバナスピオB型	個体数								2						
シズクガイ	個体数														
チヨノハナガイ	個体数														
多毛類	種類数	6	26	9	14	18	11	4	7	10	38	20	20	13	
	個体数	13	110	26	65	76	23	17	63	45	207	86	136	64	
	編組比率(%)	86.7	89.4	96.3	83.3	83.5	100.0	100.0	91.3	100.0	67.6	84.3	86.1	98.5	
	質量(g)	0.80	1.82	0.83	2.04	1.27	0.61	12.81	1.13	1.13	0.84	2.59	1.86	2.54	0.70
	種類数	0	0	0	2	1	0	0	0	1	0	11	8	3	0
甲殻類	個体数	0	0	0	3	4	0	0	1	0	40	11	4	0	
	編組比率(%)	0.0	0.0	0.0	3.8	4.4	0.0	0.0	1.4	0.0	13.1	10.8	2.5	0.0	
	質量(g)	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	0.07	0.05	0.00	
	種類数	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0
	個体数	1	2	0	2	0	0	0	0	1	0	12	0	1	0
棘皮類	編組比率(%)	6.7	1.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.9	0.0	0.6	0.0	
	質量(g)	0.01	0.03	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	64.35	1.12	0.00	
	種類数	0	1	1	1	2	0	0	0	2	0	5	0	3	0
	個体数	0	2	1	1	2	0	0	0	4	0	14	0	5	0
	編組比率(%)	0.0	1.6	3.7	1.3	2.2	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	4.6	0.0	3.2	0.0
軟体動物	質量(g)	0.00	0.24	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.03	0.00	3.45	0.00	0.04	0.00	
	種類数	1	3	0	5	2	0	0	0	0	5	3	3	1	
	個体数	1	9	0	7	9	0	0	0	0	0	33	5	12	1
	編組比率(%)	6.7	7.3	0.0	9.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	4.9	7.6	1.5	
	質量(g)	0.01	0.20	0.00	0.55	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77	0.24	1.42	0.01	
その他	種類数	8	31	10	23	23	11	4	11	10	63	31	30	14	
	個体数	15	123	27	78	91	23	17	69	45	306	102	158	65	
	編組比率(%)	0.82	2.29	0.85	3.48	1.33	0.61	12.81	1.78	0.84	8.16	66.52	5.17	0.71	
	質量(g)	2.46	3.90	2.53	3.38	3.87	3.05	0.95	1.88	1.80	4.79	4.31	3.05	2.56	
	多様度指数 H' (bit)														

付表3 d 底生生物の分類結果 (St. 40~St. 42)

1/5

出題種学名	和名	St. 40	St. 41	St. 42	合計
多毛類					
<i>Phyllococe</i> sp.			1		7
<i>Eteone</i> sp.					0
<i>Eumida</i> sp.					2
<i>Aphrodita</i> sp.					1
<i>Harmothoe</i> sp.					14
<i>Glyptis</i> sp.					2
<i>Ophiodromus angustifrons</i>	モグリオトヒメ				6
Hesionidae	オトヒメガイ科				0
<i>Ancistrosyllis</i> sp.					0
<i>Cabira pilargiformis japonica</i>	ニホンカギゴカイ				0
<i>Sigambra hanaokai</i>	ハチカガキゴカイ		2		13
Syllinae					16
<i>Nectoneanthes latipoda</i>	オウギゴカイ				0
<i>Nereis</i> sp.			1		29
<i>Platynereis bicanaiculata</i>	ツルビゴカイ				1
<i>Tambalagama fauveli</i>	カニコカイ				0
<i>Glycera nicobarica</i>	和貝		1	1	6
<i>Glycera pseudorobusta</i>	フカオカダチロ貝				0
<i>Glycera</i> sp.			4	1	23
<i>Glycinde</i> sp.				4	75
<i>Goniada</i> sp.			4		17
<i>Paralacydonia paradoxa</i>	カギアソコカイ				0
<i>Nephtys caeca</i>	ハヤテロカネゴカイ				15
<i>Nephtys longosetosa</i>	ケナカシロカネゴカイ				6
<i>Eunice indica</i>	ヤリアソコ				3
<i>Lumbrineris amboinensis</i>	アンボソギホシイソメ		4	2	6
<i>Lumbrineris japonica</i>	ギホシイソメ				2
<i>Minoe palmata</i>	エラギホシイソメ		11	10	21
<i>Scoletoma longifolia</i>	カクマカリギホシイソメ	2			119
<i>Scoletoma</i> sp.					1
<i>Drilonereis</i> sp.					0
<i>Leitoscoloplos pugettensis</i>	ナカホコムシ		1	1	2
<i>Phylo</i> sp.					5
<i>Scoloplos</i> sp.					2
<i>Aricidea</i> sp.				1	10
<i>Cirrophorus miyakoensis</i>	ミヤコヒエゴカイ				0
<i>Apistobranchus</i> sp.					3
<i>Laonice</i> sp.			1	1	8
<i>Paraprionospio</i> sp. Type C1			1		8
<i>Polydora</i> sp.					52
<i>Prionospio ehlersi</i>	エーレルスヒオ		7	1	8

付表 3 d 底生生物の分類結果 (St. 40~St. 42)

2/5

出現種学名	和名	St. 40	St. 41	St. 42	合計
<i>Prionospio sexoculata</i>	マナシラヒオ				8
<i>Pseudopolydora</i> sp.					1
<i>Scoletopis</i> sp.					2
<i>Spiophanes kroeyeri</i>	ススエラシラヒオ			1	2
<i>Heterospio</i> sp.				1	1
<i>Magelona japonica</i>	モロコカイ				8
<i>Poecilochaetus</i> sp.					2
<i>Spirochaetopterus</i> sp.					1
<i>Acrocirrus</i> sp.					5
<i>Chaetozone</i> sp.			1		3
<i>Tharyx</i> sp.					2
<i>Cossura</i> sp.					0
<i>Brada villosa</i>	チロハホウウキ				2
<i>Diplocirrus</i> sp.					27
<i>Leiochrides</i> sp.			2		8
<i>Notomastus</i> sp.				2	19
<i>Mediomastus</i> sp.					0
<i>Pullioella</i> sp.		1			1
<i>Nicomache</i> sp.					3
<i>Clymeneella</i> sp.					14
<i>Praxillella gracilis</i>	ナガハチケツゴカイ				0
<i>Praxillella pacifica</i>	ナガオケツゴカイ				5
<i>Maldane cristata</i>	ホリケツゴカイ				19
<i>Maldane pigmentata</i>	ヒョウモンケツゴカイ				35
Maldanidae	ケツゴカイ科				19
<i>Ophelina acuminata</i>					0
<i>Scalibregma inflatum</i>	トノサゴカイ			2	65
<i>Cistenides hyperborea</i>					7
<i>Lagis bocki</i>	ウミイゴムシ				24
<i>Melinna</i> sp.					4
<i>Asabellides</i> sp.					22
<i>Amphicteis</i> sp.					3
<i>Auchenopliax</i> sp.				2	2
<i>Eupolyminia</i> sp.					3
<i>Laphania</i> sp.					0
<i>Loimia</i> sp.					1
<i>Nicolea</i> sp.			1	2	5
<i>Pista</i> sp.					2
<i>Amaeana</i> sp.					1
<i>Streptosoma</i> sp.					5
Terebellidae	フサゴカイ科				0
<i>Terebellides horikoshii</i>	フトケビタマケツフサゴカイ		1		5

付表3 d 底生生物の分類結果 (St. 40~St. 42)

出現種学名	和名	St. 40	St. 41	St. 42	合計
<i>Trichobranthus bibrachiatus</i>	ヒモイダクシゴカイ			1	1
<i>Euchone</i> sp.					18
<i>Chone</i> sp.					6
Sabelliidae	ケヤリ科				1
甲殻類					
<i>Vargula hilgendorffii</i>	ウミホタル				1
Cypridinidae	ウミホタル科			1	9
<i>Euphilomedes japonica</i>	ウミホタルトキ			2	17
Ostracoda	かじり目				2
<i>Nebalia japonensis</i>	コハヒ				0
Mysidae	アミ科				1
<i>Bodotria</i> sp.	ナギサクマ属				0
<i>Eocuma spiniferum</i>	ツリガハリダシクマ				0
<i>Campylaspis</i> sp.	サイツサクマ属				2
<i>Dimorphostylis</i> sp.	サツナミクマ属				5
Gnathiidae	カミクガタ科				2
<i>Paranthura</i> sp.	ウミナガジ属				1
<i>Symphysus caudatus</i>	ヤホホアラシ				1
<i>Natatolana japonensis</i>	ヤマトスナホリムシ				0
<i>Ampelisca brevicornis</i>	カビガサガメ				6
<i>Ampelisca cyclops</i>	ヒトツメガメ			1	1
<i>Ampelisca miharaensis</i>	ヒガサガサガメ				2
<i>Ampelisca misakiensis</i>	ミササガメ				1
<i>Ampelisca naikaiensis</i>	フクロガメ		1	1	6
<i>Byblis japonicus</i>	ニホフサガメ		1	1	16
<i>Cerapus erae</i>	イホツツムシ				1
<i>Jassa</i> sp.	カマキヨコヒ属				7
<i>Melita</i> sp.	メダヨコヒ属				3
<i>Nippopisella nagatai</i>	ドヨコヒ		4		27
<i>Liljeborgia serrata</i>	ヨトメダヨコヒ		2		2
<i>Anonyx</i> sp.	ツリガヨコヒ属				4
Lysianassidae	フヒガヨコヒ科			11	12
<i>Synchelidium</i> sp.	サンハツヨコヒ属		1		8
<i>Urothoe</i> sp.	マルソコヒ属				5
<i>Caprella</i> sp.	ケラ属				5
<i>Leptochela sydhensis</i>	マルソコヒ		1	1	2
<i>Alpheus japonicus</i>	チカチホウヒ				0
<i>Alpheus</i> sp.	チホウヒ属				0
<i>Callinassa</i> sp.	スチリ属			1	4
<i>Asthenognathus inaequipes</i>	ヨコガトキ				0
棘皮類					
<i>Luidia quinaria</i>	スヒナ				1

付表3 d 底生生物の分類結果 (St. 40～St. 42)

4/5

出現種学名	和名	St. 40	St. 41	St. 42	合計
<i>Astropecten scoparius</i>	モシガイ				1
<i>Amphiura</i> sp.					1
<i>Amphioplus japonicus</i>	カキウモヒト				191
<i>Ophiura kinbergi</i>	クシハクモヒト				7
<i>Schizaster lacunosus</i>	フンクサカマ				0
<i>Echinocardium cordatum</i>	オカメフウク			1	4
Cucumariidae	キノ科			1	11
Synaptidae	イカリマコ科				8
軟体類					
<i>Lepidopleurus</i> sp.	サハダヒガラガイ属				56
Ischnochitonidae	ウスヒガラガイ科				6
<i>Philine argentata</i>	キセウガイ		3	1	15
<i>Yokoyamaia ornatissima</i>	ヨコヤマキセウ				1
<i>Petrasma japonica</i>	アサヒキヌタレガイ				1
<i>Petrasma pusilla</i>	キヌタレガイ				19
<i>Acila insignis</i>	キラガイ				1
<i>Ennucula niponica</i>	カシミガイ				1
<i>Yoldia johanni</i>	エンゾガイ				1
<i>Modiolus</i> sp.	ヒバリガイ属				0
<i>Limaria hakodatensis</i>	フクユキミガイ				0
<i>Thyasira tokunagai</i>	ハナガイ				4
<i>Lucinoma annulata</i>	ツカイモトキ				7
<i>Wallucina striata</i>	チヂミカハカガイ				3
<i>Fulvia</i> sp.	トリガイ属				4
<i>Phacosoma japonicum</i>	カカミガイ				1
<i>Theora fragilis</i>	シカガイ				5
<i>Nitidote'llina minuta</i>	ウスザクラガイ				15
<i>Nitidote'llina nitidula</i>	サクラガイ				11
<i>Laternula anatina</i>	オキガイ				3
その他					
<i>Cavernularia obesa</i>	カミサテン				1
Edwardsiidae	シモトキソチャク科				1
Actiniaria	イソギソチャク目		1		5
<i>Cerianthus</i> sp.					1
Polycladida	ヒラム目			1	5
Heteronemertini	ヒラム目		1		9
NEMERTINEA	ひも形動物門			1	56
Golfingiidae	フクロシダ科				3
<i>Aplousoma</i> sp.	イトクホシ属			1	1
<i>Phoronis</i> sp.					11
<i>Lingula unguis</i>	ミドリシヤミセンガイ				16
Balanoglossida	キボシム目				1

付表3 d 底生生物の分類結果 (St. 40~St. 42)

出現種学名	和名	St. 40	St. 41	St. 42	合計
Aeentorogobius pflaumi	スジハテ				1
種別 (汚染指標生物)					
ヨツバナスピオA型	個体数				0
ヨツバナスピオB型	個体数				0
シズクガイ	個体数				5
チヨノハナガイ	個体数				0
多毛類	種類数	3	14	20	87
	個体数	4	40	39	2,160
	編組比率(%)	100.0	70.2	58.2	67.3
	質量(g)	0.04	0.96	1.04	2.04
	種類数	0	8	8	35
甲殻類	個体数	0	12	22	366
	編組比率(%)	0.0	21.1	32.8	11.4
	質量(g)	0.00	0.27	0.30	1.30
	種類数	0	0	2	9
	個体数	0	0	2	261
棘皮類	編組比率(%)	0.0	0.0	3.0	8.1
	質量(g)	0.00	0.00	21.22	22.22
	種類数	0	1	1	20
	個体数	0	3	1	199
	編組比率(%)	0.0	5.3	1.5	6.2
軟体動物	質量(g)	0.00	2.77	0.52	1.52
	種類数	0	2	3	13
	個体数	0	2	3	222
	編組比率(%)	0.0	3.5	4.5	6.9
	質量(g)	0.00	1.82	0.01	1.01
その他	種類数	3	25	34	164
	個体数	4	57	67	3,208
	質量(g)	0.04	5.82	23.09	28.09
	種類数	1.50	4.11	4.52	2.84
	質量(g)	1.50	4.11	4.52	2.84
多様度指数 H' (bit)					

付表4 調査地点の位置(緯度、経度)

水質調査	日本測地		世界測地	
	北緯	東経	北緯	東経
St. 1	41° 08' N	140° 41' E	41° 08' 09.491" N	140° 40' 47.284" E
St. 2	41° 04' N	140° 42' E	41° 04' 09.518" N	140° 41' 47.290" E
St. 3	41° 04' N	140° 49' E	41° 04' 09.529" N	140° 48' 47.250" E
St. 4	41° 00' N	140° 42' E	41° 00' 09.542" N	140° 41' 47.299" E
St. 5	41° 00' N	140° 47' E	41° 00' 09.548" N	140° 46' 47.270" E
St. 6	40° 56' N	140° 44' E	41° 56' 09.569" N	140° 42' 47.298" E
St. 7	40° 56' N	140° 47' E	40° 56' 09.573" N	140° 46' 47.283" E
St. 8	40° 52' N	140° 44' E	40° 52' 09.595" N	140° 43' 47.310" E
St. 9	40° 53' N	140° 47' E	40° 53' 09.592" N	140° 46' 47.292" E
St. 10	41° 10' N	141° 10' E	41° 10' 09.522" N	141° 09' 47.139" E
St. 11	41° 07' N	140° 55' E	41° 07' 09.517" N	140° 54' 47.214" E
St. 12	41° 07' N	141° 00' E	41° 07' 09.525" N	140° 59' 47.188" E
St. 13	41° 07' N	141° 05' E	41° 07' 09.534" N	141° 04' 47.171" E
St. 14	41° 07' N	141° 10' E	41° 07' 09.536" N	141° 09' 47.147" E
St. 15	41° 04' N	140° 55' E	41° 04' 09.535" N	140° 54' 47.215" E
St. 16	41° 04' N	141° 05' E	41° 04' 09.549" N	141° 04' 47.121" E
St. 17	41° 04' N	141° 10' E	41° 04' 09.551" N	141° 09' 47.153" E
St. 18	41° 00' N	141° 00' E	41° 00' 09.572" N	140° 59' 47.204" E
St. 19	41° 00' N	141° 10' E	41° 00' 09.577" N	141° 09' 47.167" E
St. 20	40° 58' N	141° 06' E	40° 58' 09.598" N	141° 05' 47.180" E

底質調査	日本測地		世界測地	
	北緯	東経	北緯	東経
St. 1	41° 08.02' N	140° 49.65' E	41° 08' 10.702" N	140° 49' 26.234" E
St. 2	41° 07.40' N	140° 49.98' E	41° 07' 33.506" N	140° 49' 46.034" E
St. 3	41° 06.37' N	140° 50.39' E	41° 06' 31.714" N	140° 50' 10.364" E
St. 4	41° 09.96' N	141° 00.10' E	41° 10' 07.104" N	140° 59' 53.182" E
St. 5	41° 08.94' N	141° 00.10' E	41° 09' 05.912" N	140° 59' 53.183" E
St. 6	41° 07.81' N	141° 00.10' E	41° 07' 58.120" N	140° 59' 53.185" E
St. 7	41° 10.84' N	141° 07.08' E	41° 10' 59.910" N	141° 06' 51.948" E
St. 8	41° 09.22' N	141° 07.08' E	41° 09' 22.722" N	141° 06' 51.953" E
St. 9	41° 07.74' N	141° 07.08' E	41° 07' 53.932" N	141° 06' 51.958" E
St. 10	41° 13.41' N	141° 10.63' E	41° 13' 34.099" N	141° 10' 24.925" E
St. 11	41° 11.42' N	141° 10.75' E	41° 11' 34.713" N	141° 10' 32.130" E
St. 12	41° 09.11' N	141° 14.18' E	41° 09' 16.131" N	141° 13' 57.926" E
St. 13	41° 09.06' N	141° 12.81' E	41° 09' 13.129" N	141° 12' 35.734" E
St. 14	41° 02.60' N	141° 13.37' E	41° 02' 45.564" N	141° 13' 09.341" E
St. 15	41° 02.61' N	141° 12.17' E	41° 02' 46.162" N	141° 11' 57.347" E
St. 16	41° 02.70' N	141° 07.32' E	41° 02' 51.552" N	141° 07' 06.373" E
St. 17	40° 58.34' N	141° 12.24' E	40° 54' 29.994" N	141° 12' 01.559" E
St. 18	40° 58.34' N	141° 11.49' E	40° 58' 29.993" N	141° 11' 16.563" E
St. 19	40° 53.85' N	141° 07.40' E	40° 54' 00.624" N	141° 07' 11.196" E
St. 20	40° 55.12' N	141° 07.40' E	41° 55' 16.820" N	141° 07' 01.189" E
St. 21	40° 58.25' N	141° 07.32' E	40° 58' 24.588" N	141° 07' 06.384" E
St. 22	40° 58.27' N	141° 00.10' E	40° 58' 25.784" N	140° 59' 53.209" E
St. 23	40° 59.92' N	141° 00.10' E	41° 00' 04.773" N	140° 59' 53.204" E
St. 24	41° 02.81' N	141° 00.10' E	41° 02' 58.154" N	140° 59' 53.195" E
St. 25	41° 02.94' N	140° 51.94' E	41° 03' 05.937" N	140° 51' 43.634" E
St. 26	40° 58.73' N	140° 51.55' E	40° 58' 53.364" N	140° 51' 20.249" E
St. 27	40° 58.73' N	140° 50.67' E	40° 58' 53.362" N	140° 50' 27.454" E
St. 28	40° 54.01' N	140° 50.92' E	40° 54' 10.193" N	140° 50' 42.469" E
St. 29	40° 53.94' N	140° 50.13' E	40° 54' 05.992" N	140° 49' 55.073" E
St. 30	40° 51.27' N	140° 45.33' E	40° 51' 25.803" N	140° 45' 07.104" E
St. 31	40° 52.30' N	140° 45.43' E	40° 52' 24.595" N	140° 45' 13.102" E
St. 32	40° 54.00' N	140° 45.48' E	40° 54' 09.584" N	140° 45' 16.096" E
St. 33	40° 58.75' N	140° 45.60' E	40° 58' 54.551" N	140° 45' 23.282" E
St. 34	40° 54.01' N	140° 41.19' E	50° 54' 10.176" N	140° 40' 58.719" E
St. 35	40° 54.03' N	140° 42.05' E	40° 54' 11.378" N	140° 41' 50.314" E
St. 36	40° 58.74' N	140° 41.11' E	40° 58' 53.948" N	140° 40' 53.907" E
St. 37	41° 03.21' N	140° 39.60' E	41° 03' 22.119" N	140° 39' 26.905" E
St. 38	41° 03.21' N	140° 40.57' E	41° 03' 22.121" N	140° 40' 21.500" E
St. 39	41° 03.21' N	140° 42.03' E	41° 03' 22.123" N	140° 41' 49.092" E
St. 40	41° 03.19' N	140° 45.76' E	41° 03' 20.929" N	140° 45' 32.871" E
St. 41	41° 07.21' N	140° 38.55' E	41° 07' 22.092" N	140° 38' 20.300" E
St. 42	41° 07.22' N	140° 39.37' E	41° 07' 22.693" N	140° 39' 09.495" E