フランスガキの人工採苗試験

佐藤 敦・横山 勝幸

はじめに

昭和41年、42年度（青森県陸奥湾水産増殖研究所、業務概要第11号）に述べたとおり過去2ケ年にわたり、フランスガキの飼育試験を行ない、一応 *Phaeodactylum tricornutum*（以後 Ph. と称す）で充分幼生飼育に役立つことがわかり、今後大量生産を計る上に極めて有益な結果を得たと思っている。

元来、二枚貝の幼生飼育に関しては Green Water（以後 G.W. と称す）を使用した例はないので、今年度は G.W. を用いて試験を行なった。

また、母貝の管理方法により早期採苗が可能となり、このことが付着稚貝の歩留り、および成育の面で、どのような影響を及ぼすかを検討してみた。

材料および方法

(1) 母貝成熟促進

昭和43年当センターで人工採苗によって得られた母貝を用いた。1月28日および3月5日の2回にわたり、それぞれ100個体の母貝を室内のコンクリート水槽に収容、16℃～17℃の温海水をかけ流し、生殖巣の成熟促進を図った。なお茂浦における1月から6月までの天然水温は第1図のとおりである。

第1図 昭和45年度茂浦湾表層水温

(2) 幼生放出

幼生の放出時期が近づいた頃、パールネットに10個体宛母貝を収容、容量0.5トンのフルコンタイ（商品名ポリダイヤモンド）水槽内に懸垂した。

水温は常時20℃とし、2日毎に水槽の水を交換し幼生の放出を待った。

(3) 幼生の飼育方法

浮遊幼生の飼育は、幼生の放出を行なわれたのと同じフルコンタイ水槽を使用した。

飼育海水は、ハイフレッシャーを使用しろ過したものを用いた。3日毎に100ミクロン目ミューラーガーゼにより、全換水を行ない飼育水温は常時22℃で全期間を通し、軽い通気を行なった。飼育密度は1,000個体/ℓであった。

(4) 餌料生物

(a) 第1回飼育（4月14日～6月10日）の際は、Ph.とPh.+G.W.（新潟県村上分場）の2水槽を用いて行なった。

(b) 第2回飼育（5月24日～4月30日）の際は、Ph. G.W. Monochrysis lutheri（以後Mc.と称す）の3水槽で行なった。

それぞれの給餌量は第1表に示したとおりである。

第1表 餌料生物の種類と給餌量

No.	飼育期間	餌料生物の種類	1日1水槽当りの給餌量	
1	4月14日～4月30日	Ph.	1,000万 cells/cc	1ℓ
2	4月14日～4月30日	Ph. + G.W.	1,000万 cells/cc 4,000～5,000万 cells/cc	0.5ℓ 0.5ℓ
3	5月24日～6月10日	Ph.	1,000万 cells/cc	1ℓ
4	5月25日～6月10日	G.W.	4,000～5,000万 cells/cc	0.5ℓ
5	5月27日～6月10日	Mc.	300～400万 cells/cc	1ℓ

(5) 付着稚貝の歩留りと成長

第1回飼育については5月5日、第2回飼育については6月14日に、それぞれ10枚のコレクターを選び内側に付着している稚貝の数をかぞえ、10月10日に再びその数と成育状況を測定した。

結 果

(1) 母貝の成熟状況および幼生放出

1月28日より18℃温海水をかけ流した母貝を4月1日に開殻して見たところ、10個体中White sick 2個体、また3月5日より処置したものについて5月1日開殻して見たところ、10個体中Grey sick 1個、White sick 1個が観察されたので直ちにフルコンタイ水槽中に懸垂した。

(2) 幼生放出

1月28日から成熟促進したものは、4月14日に1水槽約98万個体の幼生を放出した。殻長は

190~200ミクロン。また3月5日からの成熟促進したものは5月24日と5月27日の2日にわたり、幼生放出が見られた。殻長は185~210ミクロン。いずれの場合も正常な幼生が観察されたので直ちに飼育に入った。

(3) 幼生飼育

(i) 第1回飼育の成長経過は第2図のとおりである。餌料は Ph., Ph. + G.W. の2水槽で行なったが、Ph.の場合は4月22日飼育開始後8日目で平均殻長300ミクロンに達する程に成育していた。直ちにコレクターを投入したが、その後4日目になりようやく付着している稚貝が観察できた。また、Ph. + G.W.の場合は、飼育後13日目で平均殻長290ミクロンに達し、付着し始めたのは16日目からであった。付着期までの歩留りはPh.が85%、Ph. + G.W.が80%であった。

第2図 フランスガキ飼育結果 (昭和45年度)

(ii) 第2回飼育の結果は、第3図のとおりである。飼育はフルコンタイ水槽、3槽を用いて行なった。このうち付着期まで到達できたのは2例で、Mc.を用いた1例は生残率70%程度で、伸びやみの状態で終わってしまった。

成功を見た2例は、Ph. + G.W., G.W.を餌料としたものでPh. + G.W.の場合は、飼育開始後8日目で平均300ミクロンに達し、12日目頃から付着が始まった。

G.W.の場合は、飼育後10日目で285ミクロンに達し、13日目より付着が始まった。付着期までは、それぞれPh. 85%、G.W. 85%であった。Mc.は飼育後12日までの歩留りは75%であった。

第1回飼育の際、採苗枚数は205枚、第2回515枚であり、遊泳している幼生がかなりあったが中止した。

第3図 フランスガキ飼育結果 (昭和45年度)

第2表 付着稚貝数および生残数

(5月5日垂下)

No.	付着稚貝数 (5月5日現在)	生残稚貝数 (10月10日現在)
1	25 個	3 個
2	26	3
3	18	3
4	32	4
5	41	5
6	52	5
7	17	3
8	18	2
9	25	7
10	29	7
計	283 ($\bar{x} = 28.3$ 個)	42 ($\bar{x} = 4.2$ 個)

第3表 付着稚貝数および生残数

(6月8日垂下)

No.	付着稚貝数 (6月20日現在)	生残稚貝数 (10月10日現在)
1	27 個	8 個
2	28	12
3	18	8
4	34	14
5	41	7
6	51	16
7	15	9
8	17	8
9	23	13
10	51	15
計	305 ($\bar{x} = 30.5$ 個)	110 ($\bar{x} = 11$ 個)

第4図 5月5日付着稚員の育成状況(10月10日現在)

第5図 6月20日付着稚員の育成状況
(10月10日現在)

(4) 付着稚貝の歩留りと成長

5月5日、6月28日にそれぞれコレクターの内側に付着した稚貝の数を計数し、22℃の飼育槽から、13.0℃および18.0℃の海中に垂下し、10月10日同時にとり上げ、その歩留りおよびその育成状況をしらべた。その結果は、第2、3表および第4、5図のとおりである。付着数では、5月5日垂下した群については、平均23.8個が4.2個で、14.4%となっているのに反し、6月20日の群は平均30.5個が11.0個で、36.0%とかなり高い歩留りを示している。成長の面では、5月5日垂下のものは3.7cm、6月28日垂下のものは3.2cmとなっており平均0.5cmの差である。

なお10月10日現在、生残り個数は4700個であった。

考 察

(1) 幼生放出

フランスガキの早期採苗を行なう場合、1月28日、4月14日処置したものと、約2ヶ月間16~17℃の温海水をかけ流し、幼生の放出が見られた。生殖巣の成熟状況は極めて良好で、正常な幼生を得ることができた。(但し、第2回目のM.c.を餌料としたものは、何が原因で付着期まで達することができなかつたかわからない)。

(2) 幼生飼育

飼育方法は昭和41年、42年と殆んど同じで極めて容易に付着期まで到達することができた。餌料としてのP.h.は、昭和42年度に一応報告済みであるように、幼生の育成が順調であるが、300ミクロン位の付着期に達し、尚4~5日間遊泳生活を続けてから付着が始まっている。G.W.は4000万~5000万 cells/ccの餌を0.5ℓ与えて、どうにか採苗する大きさまで飼育できたが、今後はもっと大量の餌を給餌することにより、もっと良い結果が得られるのではないかと考えられる。

(3) 付着別による歩留りと成長

浮遊幼生の飼育は、22℃の飼育水の中で行なわれるので、付着期までは特に時期的な差異は認められない。併し、付着稚貝を5月5日、6月20日にそれぞれ13℃、18℃の海中に懸垂した際、10月10日の測定の段階で生残率14.4%、36.0%と約2.5倍の付着となっている。このことは急激な水温の変化による稚貝の斃死と考えられる。付着稚貝の育成状況については、第4、5図に示したように5月5日垂下群では平均3.7cm、6月20日垂下群では4.2cm、46日のちがいで平均0.5cmの差である。

以上のように早期採苗を行なっても、稚貝の斃死、育成などから見て、付着稚貝を低い水温の海中に垂下するのは検討の要があろう。