





青森県の海域ごとの水温の推移



日本海沿岸： 2013年は1月～7月まで低めの傾向、9月が「かなり高い」、10月が「はなはだ高い」、11月が「やや高い」の後、12月は「平年並み」となった。2014年は、1月が「かなり低い」、2月、6月、7月が「やや低い」、9月と10月が「やや高い」のほかは、平年並みであった。

津軽海峡沿岸： 2013年は1～3月が「やや低い」、その後は「平年並み」、7月が「かなり高い」、8月が「はなはだ高い」、9月以降は「平年並み」から「やや高い」であった。2014年は、1月と4月がやや低い、2月が「かなり低い」、3月が「はなはだ低い」、6月と8月はやや高い、7月が「かなり高い」、の後10月以降は「やや低い」で推移した。

陸奥湾内： 2013年は1～5月は「平年並み」から「やや低い」、6月以降は高めに転じ、8、9月に「かなり高い」のほかは「やや高い」で推移した。2014年は、1月と4月はやや低い、2月が「かなり低い」、3月が「はなはだ低い」、6月がやや高い、7月が「かなり高い」のほかは平年並みであった。

太平洋沿岸： 2013年は1、2月が「やや低い」、その後「平年並み」で推移し、7～10月は高めで推移した後は「平年並み」となった。2014年は、1月がやや低い、2月が「かなり低い」、3月と4月が「はなはだ低い」、のほかは概ね平年並みであった。

資料：定地水温

(日本海は深浦、津軽海峡は竜飛、佐井、蛇浦、関根浜、太平洋は尻労、泊、八戸、階上の平均値)

注: 平年並み：平年差が $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ 未満

やや：平年差が $\pm 0.6^{\circ}\text{C}$ 以上高い(または低い)

かなり：平年差が $\pm 1.3^{\circ}\text{C}$ 以上 $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ 未満(または低い)

はなはだ：平年差が $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ 以上高い(または低い)