

サザエ

Turbo cornutus



生態

- ①寿命：7～8 年程度
- ②成熟：殻高 60mm 以上
- ③産卵期：8 月頃から（水温 20℃以上）
- ④分布：北海道中部から九州にかけて分布
- ⑤生態：受精後 3～4 日程度の浮遊生活。殻高 0.3mm 前後で水深 3m 前後の海底に着底。潮間帯から水深 30m 程度までのツルアラメ、コンブ、ホンダワラ類、アナアオサなどが生育する岩盤又は転石地帯に生息する。一般に稚貝は浅所に多く、成長とともに深い所へ移動する。貝殻の突起は、静穏な磯場のものでは小さいか消失するとされる。夜行性。生息可能な下限水温は 6～7℃。成長できる水温は 12～30℃。




図 サザエの成長（深浦）

主な漁業

さし網、銚やたもを使った底見で漁獲される。津軽海峡大間崎周辺から日本海に至る沿岸で採捕されるが、水温が比較的高い日本海沿岸で漁獲量が多い。漁期は春季から夏季が中心。

漁獲の動向と水準

昭和 59 年に発生した異常冷水のため昭和 60 年には漁獲量が 39 トンまで大幅に落ち込んだ。その後、平成 3 年までに一旦回復したものの、それ以降は 23～140 トンで大きく変動した。令和元年には昭和 56 年以降最低の 16 トンとなった。漁獲量が減少したのは平成 29 年及び平成 30 年春季のへい死が原因と考えられる。




図 青森県におけるサザエの漁獲量及び漁獲金額の推移



資源を上手に利用するために

○資源管理計画（深浦漁協 平成 5 年 3 月）

- ・殻高 6cm 以下小型個体の保護を検討することとした。

☆上記取組など、成熟前の小型個体を取り過ぎないようにすることが必要である。