

水稻作況試験の生育状況（移植苗の活着）


■生育状況（5月25日現在）




- ・代枯れ症状などは見られず、生育は良好です。

■活着調査について

- ・5月20日（移植日）に剪根した苗を水田に植え、その5日後に発生した新根の本数と根長を測定することで、活着の良否を評価します。新根の発生程度には移植後の気象条件のほか、苗の充実度なども影響します。



※破線内が活着調査区



移植後5日後の新根発生状況

表 移植 5 日後の新根数と最長新根長

調査項目		まっしぐら	はれわたり	つがるロマン	青天の霹靂
新根数(本)	本年	6.8	6.8	10.7	8.2
	平年	4.6	(6.2)	6.8	6.0
最長新根長(cm)	本年	5.0	4.9	4.6	5.3
	平年	3.0	(3.2)	2.7	3.2

※はれわたりの平年は前年値

- ・発生した新根数は多く、根長は長く、活着状況は良好でした。

■ 2 週間天気予報（気象庁：5 月 26 日現在）

【青森】

日付	過去の実況														1週目の予報（日別）							2週目の予報（5日間平均）					かなり高い 高い 平年並 低い かなり低い
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7							
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火							
青森 (最高気温)	23.2	24.8	22.0	17.4	21.0	23.7	26.0	当日	23	20	22	20	17	19	20	20	20	20	20	21							
青森 (最低気温)	10.3	12.3	10.5	14.7	13.7	14.2	12.1	当日	16	15	13	13	12	13	14	12	12	12	12	13							

【八戸】

過去の実況															1週目の予報（日別）							2週目の予報（5日間平均）					かなり高い 高い 平年並 低い かなり低い	
日付	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7								
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火								
																(1~5日)	(2~6日)	(3~7日)	(4~8日)	(5~9日)								
八戸 (最高気温)	24.3	24.7	25.2	20.4	19.1	22.2	27.7	当日	22	22	24	17	17	21	21	19	19	19	19	20								
八戸 (最低気温)	9.1	12.6	10.7	13.5	11.9	13.0	12.4	当日	16	13	14	12	11	12	13	12	12	12	12	12								

- ・青森では 5 月 30 日まで、八戸では 5 月 29 日までは気温が平年並みから高く、それ以降が平年並みから低い予想となっています。

■分げつ期の栽培管理のポイント

初期分げつの確保は、収量・品質の高位安定や食味の向上（玄米タンパク質含有率の抑制）にもつながります。早期に莖数を確保できるよう、「昼間止水・夜間かんがい」、「漏水防止」などの基本技術を守るほか、きめ細やかな水温上昇対策を行ってください。

【水管理のポイント】

- ・ 気温が高く、暖かい日が続くときは水深を 3 cm 程度の浅水として、水田水温の上昇を促します。
- ・ 一方、気温が低く、寒い日が続くときは水深を 5 ～ 6 cm 程度とイネ全体が冠水しない程度の深水条件にしてイネを保温します。