

花きの生育状況（令和5年7月10日現在）

（地独）青森県産業技術センター
農林総合研究所 花き・園芸部

○夏秋ギク

側枝長は前年、一昨年より短い。葉数は前年、一昨年よりは少ない。

品 種	年 次	挿し芽日 (月日)	定植日 (月日)	草丈 (cm)	葉数 (枚)	備 考
岩の白扇 (8月開花)	本 年	4/ 5	4/25	68.5	31.3	病虫害の発生は 見られない
	前 年	4/ 5	4/25	89.9	34.1	
	一昨年	4/ 5	4/26	90.9	33.2	

※5月2日に摘心。2本仕立て。

令和2年度以降は摘心栽培で実施。定植後、電照を行っており6月25日に終了。



7月10日撮影 夏秋ギク「岩の白扇」

○秋ギク

7月3日に摘心を行い、側枝の発生を確認した。病虫害の発生はみられていない。

品 種	年次	挿し芽日 (月日)	定植日 (月日)	摘心日 (月日)	備 考
神馬 (10月開花)	本 年	6/9	6/24	7/3	病虫害の発生は見 られない
	前 年	6/5	6/25	7/8	
	一昨年	6/10	6/25	7/1	

※ 摘心2本立て、季咲き栽培



7月10日撮影 秋ギク「神馬」

○トルコギキョウ

草丈は前年より長く、一昨年と同等である。節数は前年、一昨年とほぼ同等である。出蕾日は前年と同じで、一昨年より4日遅い。

品 種	年 次	は種日 (月/日)	定植日 (月/日)	草丈 (cm)	節数 (節)	出蕾日 (月/日)	備考
ボヤージュ 2型ホワイト	本 年	2/15	4/20	61.6	12.4	6/20	病虫害の発生は見られない
	前 年	2/15	4/20	48.9	11.8	6/20	
	一昨年	2/17	4/20	62.5	12.8	6/16	
ハピネス ホワイト (参考)	本 年	2/15	4/20	52.7	13.3	6/25	病虫害の発生は見られない



「ボヤージュ2型ホワイト」
7月10日撮影

「ハピネスホワイト」
トルコギキョウ