

花きの生育状況（令和6年5月10日現在）

青森県産業技術センター
農林総合研究所 花き・園芸部

○夏秋ギク

5月2日に摘心を行い、側枝の発生を確認した。病虫害の発生はみられていない。

品 種	年 次	挿し芽日	定植日	側枝長 (cm)	側枝の葉数 (枚)	備 考
岩の白扇	本 年	4/ 5	4/25	—	—	病虫害の発生はみられていない。
	昨 年	4/ 5	4/25	—	—	
	一昨年	4/ 5	4/25	—	—	

※ 5月2日に摘心。2本仕立て。摘心直後のため、側枝長、側枝の葉数に関するデータは取れない。令和2年度以降、摘心栽培を実施。
挿し芽日の4月5日より電照を開始。消灯日は6月25日の予定。。



5

5月10日撮影 夏秋ギク「岩の白扇」

○トルコギキョウ


草丈はボヤージュ（２型）ホワイトでは昨年及び平年より長く、ハピネスホワイトでは昨年より長い。節数はボヤージュ（２型）ホワイトでは昨年及び平年より多く、ハピネスホワイトでは昨年より少し多い。病虫害の発生はみられていない。

品 種	年 次	は種日	定植日	草丈 (cm)	節数 (節)	備 考
ボヤージュ (２型) ホワイト	本 年	2/15	4/19	4. 8	4. 4	病虫害の発生 はみられてい ない。
	昨 年	2/15	4/20	3. 8	4. 1	
	平 年	2/15	4/20	3. 9	3. 7	
ハピネス ホワイト (参考)	本 年	2/15	4/19	4. 5	4. 4	病虫害の発生 はみられてい ない。
	昨 年	2/15	4/20	3. 8	4. 2	


※ 作付前に土壌消毒を行い、現時点で土壌病害の兆候はない。

※ ボヤージュ（２型）ホワイトの平年値は、平成29年、令和元年～５年の平均

※ ハピネスホワイトは昨年度から栽培を開始した。



5月10日撮影 トルコギキョウ「ボヤージュ 2型ホワイト」



5月10日撮影 トルコギキョウ「ハピネスホワイト」