

花きの生育状況（令和6年6月10日現在）

（地独）青森県産業技術センター
農林総合研究所 花き・園芸部

○夏秋ギク

側枝長は前年より長く、一昨年より短い。葉数は前年より多く、一昨年と同等である。

品 種	年 次	挿し芽日 (月日)	定植日 (月日)	側枝長 (草丈) (cm)	葉数 (枚)	備 考
岩の白扇	本 年	4/ 5	4/25	29.0	11.4	病虫害の発生は見られない
	前 年	4/ 5	4/25	25.9	10.1	
	一昨年	4/ 5	4/25	36.1	11.3	

※5月2日に摘心。2本仕立て。令和2年度以降、摘心栽培を実施。

挿し芽日の4月5日より電照を開始。消灯日は6月25日の予定。



6月10日撮影 夏秋ギク「岩の白扇」

○トルコギキョウ

草丈はボヤージュ（２型）ホワイトでは前年及び平年に比べ高く、ハピネスホワイトでは前年よりやや低い。節数はボヤージュ（２型）ホワイトでは前年及び平年とほぼ同等で、ハピネスホワイトでは前年より少ない。

品 種	年 次	は種日 (月日)	定植日 (月日)	草丈 (cm)	節数 (節)	備 考
ボヤージュ（２型）ホワイト	本 年	2/15	4/19	1 7 . 8	8 . 6	病害虫の発生は見られない。
	前 年	2/15	4/20	1 6 . 3	8 . 7	
	平 年	2/15	4/20	1 6 . 3	8 . 4	
ハピネス ホワイト (参考)	本 年	2/15	4/19	1 2 . 7	7 . 7	病害虫の発生は見られない。
	前 年	2/15	4/20	1 3 . 4	8 . 5	

※ ボヤージュ（２型）ホワイトの平年値は平成29年、令和元年～５年の平均

※ ハピネスホワイトは前年から栽培を開始



6月10日撮影 トルコギキョウ
「ボヤージュ（２型）ホワイト」



6月10日撮影 トルコギキョウ
「ハピネスホワイト」