

花きの生育状況（令和6年7月10日現在）

（地独）青森県産業技術センター
農林総合研究所 花き・園芸部

○夏秋ギク

側枝長は前年より長く、一昨年より短い。葉数は前年より多く、一昨年と同程度である。病虫害の発生は見られない。

品 種	年 次	挿し芽日 (月日)	定植日 (月日)	側枝長 (cm)	葉数 (枚)	備 考
岩の白扇 (8月開花)	本 年	4/ 5	4/25	83.8	33.7	病虫害の発生は 見られない
	前 年	4/ 5	4/25	68.5	31.3	
	一昨年	4/ 5	4/25	89.9	34.1	

※5月2日に摘心。2本仕立て。令和2年度以降、摘心栽培を実施。

挿し芽日の4月5日より電照を開始。消灯日は6月25日。



7月10日撮影 夏秋ギク「岩の白扇」

○秋ギク

7月3日に摘心を行い、側枝の発生を確認した。病虫害の発生はみられない。

品種	年次	挿し芽日 (月日)	定植日 (月日)	摘心日 (月日)	備 考
神馬 (10月開花)	本 年	6/5	6/25	7/3	病虫害の発生は 見られない
	前 年	6/9	6/24	7/3	
	一昨年	6/5	6/25	7/8	

※ 摘心2本立て、季咲き栽培



7月10日撮影 秋ギク「神馬」

○トルコギキョウ

草丈は、ボヤージュ2型ホワイトでは前年及び平年より長く、ハピネスホワイトでは前年より長い。節数は、ボヤージュ2型ホワイトでは前年より多く、平年より少し多く、ハピネスホワイトでは前年より少し多い。

出蕾日はボヤージュ2型ホワイトは前年より1日早く、平年より1日遅く、ハピネスホワイトでは前年より2日早い。

品 種	年 次	は種日 (月/日)	定植日 (月/日)	草 丈 (cm)	節 数 (節)	出蕾日 (月/日)	備考
ボヤージュ 2型ホワイト	本 年	2/15	4/20	69.6	13.3	6/19	病害虫の発生は見られない
	前 年	2/15	4/20	61.6	12.4	6/20	
	平 年	2/15	4/20	55.8	13.0	6/18	
ハピネス ホワイト (参考)	本 年	2/15	4/20	55.5	13.6	6/23	病害虫の発生は見られない
	前 年	2/15	4/20	52.7	13.3	6/25	



「ボヤージュ 2 型ホワイト」

「ハピネスホワイト」

7月10日撮影 トルコギキョウ