秋サケ資源調査

涌坪 敏明・黄金崎栄一

1. 調査目的

青森県太平洋沿岸域に来遊する秋サケ資源の来遊経路及び漁場特性等を把握し、今後の秋サケ資源の漁業調整及び適正な資源管理に資する。

2. 調査経過の概要

調査は試験船東奥丸（134t）により、10月7日から10月23日までの第1次航海と11月9日から11月18日までの第2次航海と11月26日から12月3日までの第3次航海の3航海を実施した。

第1次航海では流し網調査3回、はえनाव調査4回を実施した。第2次航海では流し網調査4回、はえनाव調査2回を実施した。第3次航海は発達した低気圧による時化のため調査はできなかった。

使用した流し網は、北部太平洋サケマス資源調査で用いている調査網の1部と商業網の2種類である。調査網としては、106、121、138、157mmの目合を7反（106、121mm各1反、138mm3反、157mm2反）用い、商業網は112、116mmの目合計42反を用いた。はえनावは1鉢の長さ180m、枝糸は1鉢25本、1回の調査で10鉢を使用した。餌はサンマ、塩蔵カタクチイワシ・イカナゴを用いた。

また、東奥丸は主に沖合域を調査したので、より沿岸域での秋サケの分布等を調査するため、10トン未満船（13隻）によるはえनाव調査を11～12月にかけて実施した。

3. 調査結果

A. 試験船東奥丸による結果

(1) 秋サケの分布

調査航海毎の調査結果を表1に示した。

第1次航海では、3回（147反）の流し網調査で41尾の漁獲があったのみで、はえनाव調査では漁獲がなかった。流し網調査では反当たり（調査網・商業網込み、以下同様）0.3尾であった。調査時の表面水温は14.5～18.8℃であった。漁獲があったのは、調査海域のうち最も表面水温の低かったえりも岬の南約30マイルの地点のみであった（図1）。

第2次航海では、4回（196反）の流し網調査で6尾の漁獲があったのみで、はえनाव調査では漁獲がなかった。流し網調査では反当たり0.03尾と極めて少なかった。調査時の表面水温は11.3～15.9℃であった（図2）。図の表面水温分布からわかるように、この期間N40°-30′、E144°-30′付近に暖水塊があり、津軽暖流と接し、親潮第一分枝の南下接岸を阻む形で存在していた。このことが、昨年比へ漁獲状況の悪かった一因と考えられる。

（その他の混獲生物）

その他の混獲生物については表1に示すとおりである。イワシが2,205尾、アカイカが1,039尾と多く、ついでサバが31尾、シマガツオ（エチオピア）が101尾となっている。昨年に比べイワシ、アカイカなどの暖水系の生物がかなり多く混獲されたが、これはさきほど述べた暖水塊の影響によるものと思われる。

(2) 秋サケの生物学的特徴

漁獲物の中から合計47尾の魚体測定を実施し、航海毎の秋サケの年齢別の平均体長、体重、生殖腺重量、及び年齢組成を表2、3に示した。

a. 体長

第1次航海では41尾の測定を行った。雌雄別にみると雌では3～4才魚で626～636mmであり、雄では3～5才魚で587～671mmであった。第2次航海では6尾の測定を行ったが、雌では4～5才魚で637～642mm、雄では4才魚で580mmであった。各航海とも年齢が増すごとに大きくなる傾向を示しているが、測定個体が少ないためか高齢魚において1才前のものより小さくなっているものもある。

b. 体重

雌雄別にみると、第1次航海の雌では2,871～2,930g、雄では2,473～3,633gであった。第2次航海の雌では2,675～2,850g、雄では2,117gであった。

c. 生殖腺重量

雌雄別にみると、第1次航海の雌では376～393g、雄では152～240gであった。第2次航海の雌では405～470g、雄では96gであった。

d. 年齢組成

表3により各航海での秋サケの年齢組成をみると、漁獲数が少ないためか昨年出現した2才と6才魚の出現がみられない。第1次航海では3才魚が22%、4才魚が68%、5才魚が10%となっている。第2次航海では測定個体数が少ないが、4才魚が83%、5才魚が17%となっている。1次、2次航海を通してみると、70%が4才魚、19%が3才魚、11%が5才魚となっており、昨年の結果（61%が4才魚、24%が3才魚、11%が5才魚）とほぼ同様に主体は4才魚となっている。

(3) 青森県太平洋沿岸における近年の秋サケ漁況と沖合の海況推移

近年の漁況のパターンをみるため、図3にその年の漁期に対する旬及び月の漁獲量割合の経年変化を示した。月でみると昭和54～57年までは、12月がピークとなっており、昭和58年以降は11月がピークとなっている。さらに詳しく旬についてその漁況のピークをみると、昭和54年が12月下旬、昭和55～57年が12月上旬、昭和58年、昭和60～61年が11月中旬、昭和59年と昭和62年が11月下旬に漁況のピークがみられている。近年の特徴としては、漁獲量が飛躍的に増大するにともない漁期が早まっていることがあげられる。

昭和60年度以降の秋サケの主漁期（10～12月）における漁況と海況の推移を図4、5に示した。先程昭和62年度の漁況が低調な理由の要因として、沖合暖水塊の発達があげられるとした。ここ3ケ年では漁況のピークは、先程みたように昭和60～61年は11月中旬、昭和62年

は11月下旬となっている。そのピークの前後で漁況を分けると、昭和62年は昭和60～61年と比べて漁期前半の11月中旬まで漁況が低調であるが、後半ではほぼ同様の漁況となっている。そのときの海況をみると、昭和62年は10月下旬まで沿岸から沖合まで暖水（15℃等水温線を目やす）の範囲が広がっている。さらに、近年の主漁期である11月中旬ではえりも岬の南に大きな暖水塊が形成されている。この暖水及び暖水塊の存在が漁期前半の漁況低調な要因だったものと考えられる。11月下旬以降の漁期後半に入ってから、冷水（親潮系水）の接岸・広がり状況はほぼ例年並となっており、漁況推移も昭和60～61年並かやや良くなっている。

B. はえなわ委託船による結果

当初は旬一回を目途に図6に示した定点に各船を配置し、一斉調査を実施し、同時に標識放流も予定したが、前述したように漁況推移が芳しくなかったのと海象条件が北と南の海域ではかなり異なったため、全海域一斉にという調査は少なかった。

(1) 委託船の操業状況

はえなわ委託船による操業状況を図6に、はえなわ1鉢当りの漁獲尾数の日変動を図7に示した。太線で囲まれたところが調査海域である。海域的にみると委託船の配置に地域的な偏り（南部に多い…A～K船：八戸～階上、L～M船：泊）があるが、昨年と同様に八戸沖の海域が調査回数・漁獲とも良かった。11月は漁況が著しく低調であったため、調査も十分行えなかったようで、全海域で39回の調査を行い 373鉢の延縄を使用し 131尾の漁獲のみとなっていた。1鉢当りの漁獲尾数（C.P.U.E）は 0.4尾であった。12月に入ると、泊沖と八戸沖で少し漁がみられるようになり、泊沖では6日にC.P.U.Eが 3.6尾／鉢と 4.0尾／鉢のやや高い日がみられたが、それ以降ではあまり高くない。八戸沖をおもに操業した船の結果では、中旬の10日と15日に 2.3～ 4.5尾／鉢のやや高い日と下旬の24日以降 4～5尾／鉢の日がみられる。特にC船では15.8尾／鉢という日もみられた。E～J船では11月下旬以降ほとんど出漁していないが、これは11月の漁況が低調であったため、12月を待たず漁を切上げたことによる。

(2) 標識放流・再捕結果

はえなわ委託船では5のつく日を目途に図6に示した一斉調査点において漁獲調査及び標識放流を実施することになっていたが、前述したように調査期間を通じて漁獲状況が悪かったことから、標識放流が行われたのは12月6日の10尾と15日の5尾のみであった。

このときの放流状況及び再捕状況を図8に示した。再捕があったのは、いずれも12月15日放流のもので、1尾は放流後3日目に三沢沖で、残りの3尾は放流後7～12日目に岩手県で再捕されている。移動方向としては昨年と同様に南下傾向を示していた。

表1 昭和62年秋さけ資源調査結果

航海次数		1次				2次				計			
調査時期		10月7～23日				11月9～18日							
魚体		反数	ギン	ブナ	小計	反数	ギン	ブナ	小計	反数	ギン	ブナ	小計
流し網	(回数)	(3)				(4)				(7)			
	反数	147				196				343			
	尾数		40	1	41		5	1	6		45	2	47
延縄	(回数)	(4)				(2)				(6)			
	鉢数	40				20				60			
	尾数												
	放流尾数												
合計漁獲尾数			40	1	41		5	1	6		45	2	47
混獲魚	イワシ				2,205	サンマ			1	イワシ			2,205
	サバ				26	サバ			5	サバ			31
	シマガツオ				12	シマガツオ			89	ブリモドキ			1
	シイラ				5	ブリモドキ			1	サンマ			1
	ヨシキリザメ				6	アブラツノザメ			1	シマガツオ			101
	ネズミザメ				2	アカイカ			700	シイラ			5
	アカイカ				339	海鳥			2	アブラツノザメ			1
	カニ類				1					ネズミザメ			2
										アカイカ			1,039
										カニ類			1
									海鳥			2	

注) ギンケ、ブナケの判別にあたっては少しでも婚姻色の見られるものはブナケとした。

表2 昭和62年秋さけの年齢別雌雄別平均体長、体重、生殖腺重量

項 目		1 次 航 海				2 次 航 海				計				
		N	FL	BW	GW	N	FL	BW	GW	N	FL	BW	GW	
年 齢	3	♀	3	636	2,871	393					3	636	2,871	393
		♂	6	587	2,473	164					6	587	2,473	164
	4	♀	10	626	2,930	376	2	642	2,675	405	12	628	2,888	381
		♂	18	594	2,506	152	3	580	2,117	96	21	592	2,450	144
	5	♀					1	637	2,850	470	1	637	2,850	470
		♂	4	671	3,633	240					4	671	3,633	240
小 計	♀	13	628	2,916	380	3	640	2,733	427	16	630	2,882	389	
	♂	28	604	2,660	167	3	580	2,117	96	31	601	2,607	160	
合 計			41	611	2,741	235	6	610	2,425	261	47	611	2,701	238

注) N : 尾数、FL : 尾又長 (mm)、BW : 体重 (g)、GW : 生殖腺重量 (g)

表3 秋さけの調査時期別年齢組成

項 目		1 次 航 海		2 次 航 海		計	
		♀	♂	計	♀	♂	計
年 齢	3	3	6	9 (22)			3 6 (19)
	4	10	18	28 (68)	2	3	5 (83)
	5		4	4 (10)	1		1 (17)
合 計		13	28	41	3	3	6 16 31

() 内は%

図1 調査海域と表面水温分布

(表面水温は(社)漁業情報サービスセンター発行)
海況速報 10月13~16日

図2 調査海域と表面水温分布

(表面水温は(社)漁業情報サービスセンター発行)
海況速報 11月17~20日

図3 秋サケの太平洋沿岸における各旬及び各月の全漁期に占める漁獲割合の経年変化

図4 青森県太平洋沿岸での秋サケ漁獲尾数の旬推移

図5 秋サケ来遊時期における表面水温分布の推移

(資料：漁業情報サービスセンター 漁海況速報)

図6 秋サケ延縄委託船の調査状況 (11~12月)

図7 延縄委託船の1鉢当り漁獲尾数 (CPUE) の日変動

図8 秋サケの標識放流・再捕状況 (延縄委託船)