1 太平洋底棲生物分布調査

I 調査目的

むつ小川原巨大開発が予定されている地域沿岸における底棲生物の分布ならびに資源の現状を把握することを目的とする。

II 調査内容

1. 調査期間 47年1月18日から
47年3月1日まで
2. 調査海域 青森県太平洋沖合(三沢、六ヶ所沖)
3. 調査員および調査船
 - (1) 調査員 技師 十三 邦 昭
技師 中 田 凱 久
技師補 松 井 謙 介
 - (2) 調査船 幸洋丸(121トン400馬力)
4. 調査項目
 - (1) 底棲生物分布状況
 - (2) 発育段階別分布状況
 - (3) 回遊移動状況
 - (4) 産卵場および産卵時期の究明
 - (5) 漁場環境
5. 調査方法
1 そうびき底びき網漁具により調査

III 調査結果

1. 底棲生物分布状況

今回の調査期間中に出現した底魚の種類は48個に分類された。この中、主に漁獲された魚類を月毎に漁場毎にまとめたのが第1表である。厳密には月毎にまとめることには調査場所、調査時期のズレ及び調査回数等問題が多いが、およそその傾向は判明される。これで見ると1月は1網当りの漁から三沢沖及び六ヶ所沖ともに漁が非常に悪く、2月に漁がよくなっていることがうかがわれる。また、これを魚種毎にみても1月は三沢沖ではヤリイカ、カナガシラ、アブラツノザメ、ババガレイの分布が他魚種に比較して多いようであるが、六ヶ所沖ではヤリイカ、アブラツノザメ、ババカレイ、スケトウタラが多い。2月に入ると三沢沖ではコチ、カナガシラ、コウイカ、マコガレイが多くなり、六ヶ所沖ではコウイカ、カナガシラ、ムシカレイ、スケトウタラが多くなっている。3月は三沢沖ではマコガレイ、コウイカが多獲された。全般に三沢沖ではコチ、カナガシラ、マコガレイ、コウイカ、六ヶ所沖では、コウイカ、カナガシラ、スケトウタラ、ムシカレイが多いと云う状態で両漁場とも経済的価値の低い魚種が多獲され、民間船が主眼としているババカレイ、メヌケ、マダラ等の高級魚は水深が浅いところでの操業が多いためか非常に少なかった。次に第2表は深度別の1網当り漁獲組成で水深370m以浅の調査漁場内でのこの期間では水深100~150mが最も多獲されている。最も少いのは有効曳網回数が1回だけで他深度と比較するには問題があるが、水深50m以浅の1網当り52尾であった。なお、今回の調査から深度別にみると漁場がおよそでは2つに大別され、三川

目～天ヶ森間の三沢沖を一つの漁場とする水深100～400m海域に区分される。深度別の優占種をみると50m以浅ではヒラメ、50～100mではカナガシラ、100～150mではコウイカ、150～200mではババカレイ、200～300m及び300～370mではスケトウタラが優占している。一方、対象魚種の深度の分布状況をみるとババカレイは50～300m、マコカレイは50～150m、ヒラメは150m以浅、カナガシラ50～150m、ヤリイカ150～300m、スケトウタラ200～400mに主に分布し、アブラツノザメは広く分布していることがうかがわれた。

2. 発育段階別分布状況

多項目調査尾数が少ないため、いろいろ問題があるが主要魚種について若干記述する。

ババカレイ……後述する生殖腺重量比Rの値および、東北水研八戸支所で調査している肉眼的観察からババカレイの成熟体長は約20cmと推定されるが、全長に換算すると約24cmから成魚、以下を未成魚に区分される。1月のパンチング調査および、多項目調査からは調査尾数64尾の中、成魚が55尾、未成魚が9尾で86%以上成魚で占められている。体長(全長)範囲は16～38cm間に認められ、モードは30cmに認められる。2月は80尾の中、成魚が76尾、未成魚4尾で95%が成魚で全長範囲は19～46cm間にあり、33cmモードである。3月は10尾だけの調査で成魚6尾、未成魚4尾で全長範囲は18～35cmであった。

ソウハチガレイ

生殖腺R及び肉眼的観察から大体18cmから成熟体長に達しているものと考えられる。これを全長に換算すると22cm以上となる。したがって22cm以下を未成魚として取り扱うと1月は調査尾数56尾の中、成魚26尾、未成魚30尾で未成魚が僅かに多い。体長範囲は16cmから27cmの範囲でモードが21cmに認められる。2月は1月より若干大型群の来遊がみられ、調査尾数66尾の中、成魚62尾、未成魚4尾で成魚が圧倒的に多い。この時期の全長範囲は21～36cmの範囲でモードが28cmに認められる。3月は42尾の中、成魚37尾、未成魚5尾で成魚が88%を占め、この時期も圧倒的に成魚が多い。体長範囲は19～35cmでモードが25、26cmに認められる。

ムシカレイ

ババカレイ、ソウハチガレイと同様の方法で検討したが、成熟体長は明確ではない。したがって発育段階別に区分できないが1月は全長11～36cm、モード19cmに認められる。2月は19～34cmの範囲でモード26cm、3月は15～26cmの範囲でモード20cmに認められる。

マコカレイ

多項目調査結果からでは未熟のものが殆んどで成熟体長は不明である。したがって発育段階別に区分できない。1月は全長12～33cm、モード22cm、2月は17～32cm、モード22cm、3月は17～30cm、モード21cmである。

ヒラメ

18尾の多項目調査結果では未熟のものが殆んどでこの時の全長は17～34cmであった。またパンチング調査では1月は全長17～32cm、2月は16～39cm、モード29cm、3月は21～27cmの範囲であった。

カナガシラ

1月は全長28～48cmでモードが36cmに認められた。

スケトウタラ

2月に52尾のパンチング調査したが、全長28～48cmでモードが36cmに認められた。

3. 回遊移動状況

標識放流を実施できなかったため各魚種の回遊移動状況は不明である。

4. 産卵場および産卵時期の予測

ババカレイ

調査尾数が非常に少ないため問題があるが生殖腺重量比R($R=W/W^1 \times 100$ ただしWは生殖腺重

量 W' は生殖腺を除いた体重、単位 g)の月別変化をみると♀では1、2、3月と生殖腺重量比 R の値が大きくなっており、特に3月には10 g 以上ものもみうけられるようになっている。また、この時期の♂の生殖腺重量比をみてみると成熟個体では0.5~2 g のものが多いが、0.2 g の成熟個体もあり、放精しているものもあることがうかがわれた。東北水研八戸支所のこれまでの調査では(31年9月、東北海区の底魚)産卵期は3~4月、産卵場所は大部分は三陸沿岸であると考えられている。

ソウハチカレイ

生殖腺重量比は♀では1、2、3月と次第に増加の傾向を示しているが、成熟のものは殆んどみられていない。♂では1.0~5.0 g のものが多く、殆んど成熟しているが半熟のものも多く、産卵にはまだ間があるものと思われる。また産卵場所もこの調査から不明である。

ムシカレイ

♀の調査が多いが生殖腺重量比は殆んど1 g 以下で半熟である。♂では3月に成熟個体のみうけられるが、生殖腺も2~4 g と小さく産卵にはまだ間があるようである。

マコカレイ

1月10尾、3月14尾の多項目調査からは♀♂とも成熟のものは1尾もみとめられない。

ヒラメ

3月1日18尾の多項目調査からは半熟以上のものは殆んど認められず、もっと遅い時期であろうと思われる。

5. 漁場環境

(1) 主要魚種の食性

多項目調査結果から各魚種の胃内容物をみてみると第3表のとおりで、ヒラメは主として魚類、ムシカレイは甲殻類のエビジャコ、ソウハチは甲殻類のオキアミ、ババカレイは多毛類のゴカイ、スケトウタラはオキアミを捕食していたがマコカレイは何れも空胃であった。

(2) 海況

1月中~下旬……表面水温は17回測定、ほぼ7~10°Cの範囲にあった。また底層水温はこの期間に6回水深40~190mの底層でおこなったが、7.5~10°Cの範囲にあり、一番近いときでも表面水温よりは高かった。底層水温が比較的高いところは水深100~130mで低いところは160~190mとなっているが、これら水温の高低は測定最深層の190mまで対流がおこなわれていることを意味するものと思われ、表面水温の変動巾から考えて垂直混合の最も盛んな時期と考えられる。

2月上中……表面水温は15回の測定結果であるが、ほぼ7.8~8.8°Cの間において変動巾は1°Cであった。底層水温は6回水深80~340mの範囲で測定したが5.4~9.0°Cの変動巾をもち、その変動巾は水深340mで最大の3.6°Cで、それより浅いところでは2°C以内に限定されていることから340m付近が対流の限界近くであろうと思われる。即ち、これより浅いところの水は上下層の混合が行われ、これより深いところの水は比較的水温が低く、安定しているものと思われ、水系的な境界がこの辺りにあると考えられる。

2月下旬~3月上旬……この期間には水温の測定は表面、底層とも4回のみであり、底層水温の水深は80~90mの極く狭い範囲であった。水温は表面で6.4~6.8°C、底層では6.8~7.1°Cの範囲で夫々変動巾は1°C以内であり、また底層水温は表面よりも高く、この時期のこの海域の水は完全に垂直混合が行われ、上下とも同一水系である。以上を総合すると、この期間は対流期であり、かつある水深までは津軽暖流水であり、底層水温は時期を追って僅かづつ降温するが、海域による相異はある水深以内では殆んどない。この水系的な境界は340m付近にみとめられ、これより深いところでは対流を生じにくい比較的稳定した別な水系が占めているものと考えられる。

IV 調査の成果および今後の課題

1. 調査の成果

これまで八戸近海の底魚については東北区水産研究所八戸支所でかなり古くから調査され、主要魚種の分布、回遊、生態等、詳細に報告されているが、沿岸部及び一部の魚種については詳しく報告されていないので、これを多少なりとも埋める意味で意義があったものと思われる。

2. 今後の課題

今年は試験船の運航等の問題から僅か1月半の調査より出来ず、厳密には時期的にも殆んど検討できない状況で、今後周年を通しての調査が必要である。それと同時に調査海域においても時期的な検討を行うには1月に調査できる漁区とか点を設けて調査した方がよいのではなかろうかと考えられる。

第 1 図 昭和 46 年度太平洋底棲生物調査漁場図

第 1 表 漁場別、月別、魚種別漁獲状況

尾数

魚種	1 月		2 月		3 月		計	
	三 沢 沖	六ヶ所沖	三 沢 沖	六ヶ所沖	三 沢 沖	六ヶ所沖	三 沢 沖	六ヶ所沖
ヒ ラ メ	33		52	74	6		91	74
ババカレイ	107	53	167	184	15		289	237
マコカレイ	61		548	396	182		791	396
ソウハチ	84		54	267	23		161	267
ムシカレイ	74		29	486	78		181	486
ヤナギムシカレイ			48	118			48	118
マガレイ	14		1	3			15	3
サメガレイ				5				5
アブラカレイ				34				34
マダラ		3	4	38	9		13	41
スケトウ		52	95	474			95	526
カナガシラ	136	1	814	891	30		980	892
ヤリイカ	196	165	32	24	10		238	189
コウイカ	28		520	2,470	167		715	2,470
アブラツノザメ	125	55	70	309	40		235	364
スズキ	5				33		38	
タコ	1		29	95	2		32	95
ホシザメ	70						70	
ニギス	1		67	4			68	4
マサバ	20		61	7			81	7
アカムツ			2	95			2	95
アイナメ	3			5			3	5
タナゴ	15			180			15	180
コチ			1,500				1,500	
バラメヌケ	10						10	
その他	99		84	309	33		216	309
計	1,082	329	4,177	6,468	628		5,887	6,797
操業回数	11	5	8	16	3		22	21
1 網 当 り	98.4	65.8	522.1	404.3	209.3		267.6	323.7

第 2 表 水深別、魚種別、漁獲状況

() 1 網当り 単位 尾数

	50 m 以浅	50 ~ 100 m	100 ~ 150 m	150 ~ 200 m	200 ~ 300 m	300 ~ 400 m	計
操業回数	1	13	7	5	9	8	43
ババカレイ		145 (11)	79 (11)	102 (20)	156 (17)	44 (6)	526 (12)
マコカレイ	3 (3)	786 (61)	392 (56)		2 (0.2)	4 (0.5)	1,187 (28)
ソウハチカレイ		72 (6)	110 (16)	80 (16)	138 (15)	32 (4)	432 (10)
マガレイ	8 (8)	5 (0.4)		1 (0.2)	1 (0.1)	3 (0.4)	18 (0.4)
ムシカレイ	5 (5)	153 (12)	447 (64)	46 (9)	11 (1)	30 (4)	692 (16)
ヒラメ	23 (23)	56 (4)	40 (6)	10 (2)	13 (1)	23 (3)	165 (4)
カナガシラ	8 (8)	901 (69)	370 (125)		4 (0.4)	88 (11)	1,872 (44)
アブラザメ		102 (8)	87 (12)	61 (12)	194 (22)	132 (17)	576 (13)
ヤリイカ		63 (5)	65 (9)	100 (20)	195 (22)	4 (0.5)	427 (10)
スケトウ					244 (27)	277 (35)	521 (12)
その他	5 (5)	2,450 (188)	2,795 (399)	37 (7)	431 (48)	550 (69)	6,268 (146)
計	52 (52)	4,733 (364)	4,885 (698)	437 (87)	1,389 (154)	1,188 (149)	12,684 (295)

第 3 表 主要魚種の胃内容物

胃内容 餌料種 捕食魚種	多毛類	頭足類	甲 殻 類					クモヒ トデ類	魚 類	空 胃 計
	ゴカイ	タ コ	ヨコ エビ	オキ アミ	エ ビ ジャコ	エビ	カニ	—	—	
ヒ ラ メ		1			1				2	9
ム シ ガ レ イ		2	1		3		1		1	6
ソ ウ ハ チ		2		4	1				1	27
マ コ ガ レ イ										24
サ メ ガ レ イ								1		2
バ バ ガ レ イ	10		2					1		13
タ ラ		1				1			1	
ス ケ ト ウ ダ ラ				2						6
計	10	6	3	6	5	1	1	2	5	87

第 2 図 水深と底層水温の関係

太平洋底棲生物

調査項目 \ 月日	1. 1 8	1. 1 8	1. 1 8	1. 1 9	"	"	1. 2 3	"	1. 2 4
調査点	164	153	144	170	171	173	140	141	133
曳網開始時刻	10-15	12-40	14-15	9-55	11-20	13-05	10-05	11-40	10-10
揚網開始時間	10-45	12-50	14-25	10-00	11-30	13-15	10-10	11-45	10-20
曳網時間	30	10	10	5	10	10	5	5	10
曳網の長さ	2,000 ^m	2,000	2,000	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
魚場水深	95 ^m	110	132	40	50	90	70	156	192
漁場底質	S M	S	S	S	S	S	S	S	S M
底層水温	9.92		9.74	8.35		9.91	9.06		7.50
天候	B C	B C	B C	B C	B C	B	S	C	B C
風向力	W 4	W 4	W 3	SW 3	SW 3	SW 3	WNW 4	WSW 5	SW 2
漁獲量 (尾)	マガレイ	4			3	5		1	
	ムシカレイ	15		2	1	4	1	12	40
	ババカレイ	2		3					2 88
	マコカレイ	4				3	1	53	
	ソウハチ	4							60
	ヤナギムシカレイ								
	ヒラメ				20	3			2
	タラ類								
	カナガシラ	40	50	20		2	4	20	
	アブラザメ	40	20	30			10	4	4 2
	ヤリイカ	20	20	30		5	1	20	20 50
	コウイカ								
	サバ								20
	その他	71	34	34		6	4	19	5
計	尾 200	124	119	24	28	21	129	51	255
備考									

分布調査結果

試験船 幸洋丸 No.1 単位尾

"	"	"	1. 2 8	"	1. 2 9	"	"	"	2. 4
134	132	132	123	122	119	121	124	125	135
11-30	13-15	14-55	10-35	12-50	7-05	10-30	12-30	14-55	10-40
11-40	13-25	15-00	10-45	13-00	7-15	10-40	12-45	15-10	10-50
10	10	5	10	10	10	10	15	15	10
1,400	1,400	1,400	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
192	168	195	246	232	85	265	280	235	236
S M	S M	S M	M	M	M	M	M	M	M
7.50	7.78								
B C	S	S	S	S	S	C	C	C	C
SW 2	S 2	S 2	WNW 4	N W 4	W 3	W 3	W 3	W 3	N 3
		1							1
3	1	2							
5	3	4	20	30	1		1	1	28
									2
	10	10							9
									48
2	3	3							2
			25	26	2		2		94
					1				2
	10	5	20	25	5		3	2	16
		30	75	75	7		3	5	25
		20							20
4	7	8							22
14	34	83	140	156	16		9	8	269

太平洋底棲生物

調査項目 \ 月日	2. 4	"	2. 7	"	"	2. 8	"	"	"	
調査点	115	114	120	123	110	100	101	99	109	
曳網開始時刻	13-15	15-40	11-05	13-15	15-45	7-25	9-25	11-35	13-40	
揚網開始時刻	13-25	16-00	11-20	13-30	15-55	7-45	9-45	11-55	13-55	
曳網時間	10	20	15	15	10	20	20	20	15	
曳網の長さ	2,000 ^m	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
漁場水深	370	360	260	310	290	290	310	300	230	
漁場底質	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
底層水温			8.45			8.85				
天候	C	C	B	B	S	C	S	C	C	
風向力	N 3	N 2	NW 3	NW 3	NNW 3	NW 4	NNW 4	NNW 4	NW 4	
漁獲量 (尾)	マガレイ	2								
	ムシカレイ							2	9	
	ババカレイ	1		8	2	8	14	11	15	46
	マコカレイ		4							
	ソウハチ	8	6	2	6	9	4	2	10	100
	ヤナギムシカレイ	2	2							
	ヒラメ		1				1	1	9	
	タラ類	23	22	106	119	9	52	12	23	26
	カナガシラ	82	4	1		1				
	アブラザメ	80	7	46	17	65	16	4	12	31
	ヤリイカ	2		1						
	コウイカ	4	2	2			1	2	2	93
	マサバ									
	その他	93	80	47	84	16	22	36	44	47
	計	尾 297	128	213	229	108	110	68	108	361
備考										

分布調査結果

試験船 幸洋丸 No 2 単位尾

2.1 0	"	2.1 6	"	"	"	2. 1 7	"	"	"
89	88	111	109	109	109	112	113	129	139
11-15	13-20	11-05	13-05	14-45	16-25	07-55	10-05	12-25	14-30
11-30	13-35	11-15	13-15	14-55	16-40	08-10	10-20	12-35	14-40
15	15	10	10	10	15	15	15	10	10
2, 000	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000
340	260	144	110	130	140	340	340	70	60
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
8. 96		7. 10				5. 4			
B	B	C	C	C	C	C	C	C	C
0	0	NW 4	N W 3	WNW 4	WNW 4	ME 2	NE 2	W 3	NNW 3
29		46	188	99	112	1		6	4
		4	30	13	17	11	4		
		55	157	94	86			50	
10		11	55	22	22				
110	4								
21	1	5	15	10	10			30	20
			4	1	2	1	90		
		140	100	400	160	3		2	1
3		8	5	8	5		2	3	7
2	1	2	10	4	2				
30	3	333	666	333	666				
		1	4	4					5
31	6	2	98	404	50	5	6	1, 025	525
235	15	617	1, 332	1, 392	1, 132	21	102	1, 116	562

太平洋底棲生物分布調査結果

試験船 幸 洋 丸 No 3 単位尾

調査項目	月 日	2. 1 9	2. 2 3	2. 2 3	2. 2 3	2. 2 5	2. 2 6	3. 1	3. 1	3. 1
	調 査 点	174	175	176	177	150	151	152	161	162
曳 網 開 始 時 刻		09-20	09-35	11-30	15-40	09-55	09-55	10-20	12-00	13-50
揚 網 開 始 時 刻		09-35	09-50	11-40	15-55	10-10	10 10	10-35	12-15	14-05
曳 網 時 間		15	15	15	15	15	15	15	15	15
曳 網 の 長 さ	^m	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
漁 場 水 深		86	92	90	114	80	80	80	60	100
漁 場 底 質		M	M	M	R			M	M	M
底 層 水 温		8.17	7.10			7.0	7.0	6.8		
天 候		B C	B C	B C	B C	S	C	C	C	C
風 向 力		SW 2	NW 4	NW 4	NW 4	NW 5	SW 2	ENE 4	ENE 3	ENE 3
漁 獲 量 (尾)	マ ガ レ イ									
	ム シ カ レ イ	2	10	7				48	28	20
	バ バ カ レ イ	8	59	72						15
	マ コ カ レ イ	5	39	39		236	177	79	24	79
	ソ ウ ハ チ	7	27	11	根			17		6
	ヤ ナ ギ ム シ カ レ イ				が					
	ヒ ラ メ				か				6	
	タ ラ 類				り			4	1	4
	カ ナ ガ シ ラ	10	400	400	皆			30		
	ア ブ ラ ザ メ		4	11	無	15	20	25		15
	ヤ リ イ カ							10		
	コ ウ イ カ					333	167	167		
	マ サ バ	50								
そ の 他	2	68	51				11	9	30	
計	84	607	591		584	364	391	68	169	
備 考										