3 むつ湾、太平洋小川原地区の水質底質調査

I 調査目的

むつ湾、太平洋海域の水質、底質を把握し、漁業の計画的拡大をはかるとともに、今後の漁場における環境保全対策に資する。

II 調査方法

1 調査海域	むつ湾	19点(測点位置図参照)
	太平洋	9点(" ")
2 調査期日	むつ湾	6月(24~26日)
		12月(22~23日)
	太平洋	8月(24~26日)
		47年3月(21~23日)

3 調査機関

- (1) 海洋観測及び採水(泥)青森県水産試験場
- (2) 水質、底質分析 " 衛生研究所
新日本気象海洋株式会社

4 採水の方法

上記調査地点において各測点とも上層を海面下1m、中層を全水深の中間、下層を海底上1mにとって各3層採水した。

5 水質の分析項目とその分析方法

- ①※水 温……J I S K 0 1 0 2・4のペツテンコーヘル水温計で測定した。
- ②※外 観……J I S K 0 1 0 2・5の方法によった。
- ③※臭 気……J I S K 0 1 0 2・7の方法によった。
- ④透 視 度……J I S K 0 1 0 2・6の透視度計で測定した。
- ⑤※透 明 度……セツキの透明度板を用いた。
- ⑥P H ……J I S K 0 1 0 2・8のガラス電極法によった。
- ⑦※B O D……J I S K 0 1 0 2・16の20、5日間酸素消費量を測定した。
- ⑧※C O D……「水質汚濁に係る環境基準について(昭和45年4月21日閣議決定)」に示されたアルカリ性法によった。
- ⑨※D O ……J I S K 0 1 0 2・24のウインクラーアジ化ナトリウム変法によった。
- ⑩※懸濁物質……J I S K 0 1 0 2、10、2、1のガラス炉過器法およびメンブランフィルターを用いる方法によった。
- ⑪リン酸イオン……J I S K 0 1 0 1、32、1のモリブデン青法および
J I S K 0 1 0 2、27、10法によった。
- ⑫硫酸イオン……塩化バリウムゼラチン溶液による比濁法によった。
- ⑬※塩 素 量……むつ湾の夏期と鷹架沼はJ I S、K、0 1 0 1、25、3のモール法
- ⑭※沃素消費量……下水試験法の硫化物a・1の方法で、滴定は酸性下で行なった。
- ⑮※アンモニウムイオン……J I S K 0 1 0 2、17、1、2のフェノール法によった。
- ⑯※n-ヘキサン抽出物質……J I S K 0 1 0 2、18の方法によった。
- ⑰※カドミウム……原子吸光法(昭和45年10月2日厚生省環境衛生局公害課)によった。
- ⑱ひ 素……ジエチル・ジチオ・カルバミン酸銀法によった。
- ⑲アルキル水銀……ガスクロマトグラフ法によった。
- ⑳総 水 銀……原子吸光光度計を使用して還元気化循環法で求めた。

- ②① 鉛 ……原子吸光光度計で測定した。
- ②② 総クロム……ジフェニルカルバジットによる比色法によった。
- ②③ 有機リン……ガスクロマトグラフ法によった。
- ②④ 銅 ……原子吸光法によった。
- ②⑤ シアンイオン……J I S K 0 1 0 1・2 9のピリジンピラズロン法で分析した。

※印は青森県衛生研究所で分析。

6 採泥の方法

上記調査地点において、グラフ式採泥器を用い表層泥を採取した。

7 底質の分析項目と分析方法

- ① 単位体積重量……土質試験法に示された方法のうち体積置換法で測定した。
- ② 含水量……土質試験法によった。
- ③※C O D……「水質汚濁調査指針」の底質のC O Dの分析方法によった。
- ④ 強熱減量……土質試験法の電気マツフル炉を使用する方法で測定した。
- ⑤※硫化物……「公共用水域の水質試験方法(昭和35年10月10日経企水保第49号)」によった。
- ⑥ シアンイオン……硫化物処理操作を加えた上で水質と同じ方法によった。
- ⑦※カドミウム……水質と同じ方法によった。
- ⑧ ひ素……王水処理を行った試料について水質と同じ方法によった。
- ⑨ アルキル水銀……ベンゼン抽出後ガスクロマトグラフィーで測定した。
- ⑩ 総水銀……硫酸と過酸化水素水で処理を行なった後、水質と同じ方法によった。
- ⑪ 鉛 ……乾式分解(500℃未満)で有機物を分解した後、水質と同じ方法によった。
- ⑫ 総クロム……乾式処理を行なった後、水質と同じ方法によった。
- ⑬ 有機リン……N-ヘキサン抽出後ガスクロマトグラフィーで測定した。
- ⑭ 銅 ……450℃までで乾式処理し、硝酸で抽出後水質と同じ方法によった。

※印は青森県衛生研究所で分析。

III 水質分析結果

1 むつ湾

A 夏期の水質

昭和46年6月24日～26日に採水した試料の分析結果は別表に示した。

各項目の分析結果について以下に略記する。

- 1) 水温……観測時の水温は11.0～19.0℃と変動が大きい。
上層部では14.5℃～19.0℃で測点によってかなり異なるが、各点とも上層で最も高温になっている。
全般に、水深10m付近で14～16℃、40m以深では11～12℃で、上下層間の水温差は4～5℃の所が多く、夏場の水温躍層の形成が始まっていることがうかがわれる。
- 2) 外観、臭気、各サンプルとも澄明で無臭であった。
- 3) 透視度……全サンプルで30cm以上であった。
- 4) 透明度……透明度は8～18mでは全点で10m以上あるいは底までという高い値を示した。海域が非常に清澄であったことがうかがわれる。
- 5) PH ……7.9～8.2で大部分は8.1であった。清澄な海域としては一般的な値である。
- 6) B O D……B O Dの分析値は0.8～5.4 ppm で測点2.3.5.8.9.10.17の各点で高目である。これ等の地点では5 ppm 前後のものも相当認められたが他の地点では2 ppm 以下のものが多かった。

2 ppm 以下のものが多かった。

各地点とも上下層間に明瞭な傾向は認められない。

- 7) C O D……CODの分析値は0.04～1.8 ppmと非常に低い。最高値は測点11の上層で認められたがこの値もCODとしてはあまり問題にならない。
BODとCODの間の相関はほとんど認められない。
- 8) D O……溶存酸度は8.0～9.7 ppm、酸素飽和度95～115%で各点各層とも酸素は豊富である。
- 9) 懸濁物質……水中の浮遊懸濁物量を示す懸濁物質は1以下～6 ppmで、測点5.17で高い。
懸濁物質が高目の値を示す試料ではBODも高目になっているものも多く、両者の間に何か関連があるかも知れない。
- 10) リン酸イオン……6月に採取した試料はJIS K-0101・32・1法で分析した。分析値は全点0.08 ppm以下で、このうちほとんどのサンプルはこの方法の定量限界0.05 ppm以下であった。
むつ湾の海水のようにリン酸イオン含有量が非常に低い試料の分析にはこの方法は不適當であることが判明したので、以後はJIS・K・0102・27のC法、即ち一度モリブデン青法で発色させたものをN-ブチルアルコールで濃縮して抽出する方法を用いることにした。
- 11) 硫酸イオン……硫酸イオンの分析値は2550～2720 ppmであった。
海域の硫酸イオンは塩素量とは一定の比率関係にあり、塩素量：硫酸イオンはほぼ1：0.14程度といわれている。
- 12) 塩素量……塩素イオンの分析値は17,370 ppmであった。
測点1上層で17,370 ppmを示した他は18,200 ppm以上で全般に高鹹であり、各点の上下層間の差も小さい。
今回分析したJIS法は塩分濃度の高い海水の分析法としては不適當なので、以後の分析は「海洋観測指針」のクヌーツセン測器を用いる方法で行なうこととした。
- 13) 沃素消費量……全試料で0であった。
- 14) アンモニウムイオン……アンモニウムイオンの分析値は0.01以下～0.39 ppmで、0.1 ppm以下の低値を示す所が多い。0.3 ppm以上のやや高目の値がみられたのは測点12の上層および測点16の下層であるが全般的にはアンモニウムイオンによる汚染は小さい。
アンモニウムイオンが高目の地点とBOD、CODが高目の地点はほとんど一致していない。
- 15) n-ヘキサン抽出物質……一般に油分として分析されるものである。
分析値は全点全層で1 ppm以下であり、海域がほとんど油汚染を受けていないことを示している。
- 16) カドミウム……全点全層で不検出であった。
- 17) ひ素……全試料で不検出であった。
- 18) アルキル水銀……全試料で不検出であった。
- 19) 総水銀……分析値は不検出～0.002 ppmで測点2測点16以外の各点で0.001～0.002 ppm検出された。
- 20) 鉛……全点全層で不検出であった。
- 21) 総クロム……全試料で不検出であった。
- 22) 有機リン……全点全層で不検出であった。
- 23) 銅……銅の分析値は0.001～0.011 ppmで測点16の表層で最高値を示した。

24) シアンイオン……全試料で不検出であった。

B 冬期の水質

冬期の彩水は測点 4. 5. 7. 1. 1. 1. 3. 1. 4. 1. 5. 1. 7. 1. 8. の各点は昭和 46 年 12 月 18 日、測点 1. 2. 3. 6. 8. 9. の各点では昭和 47 年 2 月 16 日、また測点 1. 0. 1. 2. 1. 6. の各点では 2 月 17 日にそれぞれ採水した。

以下に分析結果を略記する。

- 1) 水 温……水温の測定値は 12 月 18 日分では 9.0～11.8℃、2 月 16 日分では 4.0～7.3℃、2 月 17 日分では 4.0～6.1℃で、12 月と 2 月の間には 4～5℃の水温差ができています。同日観測分でも測点によって水温差がみられるが、大部分の測点では上下層間の水温差はほとんどなくなっており、冬期の混合期にあたることを示している。
- 2) 外 観……各サンプルとも外観は澄明であった。
- 3) 透 明 度……透明度は 8～23.0 m で各地点とも高い値を示している。最高値は測点 6 の 23 m で底まで見えている。全般に清澄な海域であることを示している。
- 4) P H ……PH は 7.6～8.0 で大部分は 7.9 以下であり、夏期に比べて大分低くなっている。
- 5) B O D……BOD の分析値は 0.8～3.9 ppm であった。夏期に比べて 4 ppm、5 ppm という高い値はみられないが測点 2. 4. 5. 6 では水温で述べたように上下混合期にあるせいもあって上層から下層まで 3 ppm 程度の値がみられる。
最低値は測点 1 の上層で最高値は測点 18 の下層で測定された。
測定日による BOD 値の差は明瞭ではないが、12 月 18 日に採水した測点 1. 1. 1. 3. 1. 4 で比較的低値であった。
- 6) C O D……COD の分析値は 0.1～1.1 ppm で測点 19 の上層を除けば全て 1 ppm 以下の低値であった。夏期と同様に COD 値は非常に低くまた測定日および測点間の差は明らかでない。
- 7) D O……溶存酸素は 7.2～11.3 ppm であった。最低値の測点 1 下層で飽和度 71.4% と低いが、他の試料では飽和度 91.4～113% で、夏期ほどではないが酸素量は豊富であった。
- 8) 懸濁物質……冬期測定時の懸濁物質は 1 ppm 以下～5 ppm で、夏期の場合と同様、測点 5 で若干高目である。測定日による差は明らかでないが 12 月 18 日採水の各点で 2 月採水時のものより低値になっているようでしかしこれが単に時期のちがいでよいか、あるいは測点固有の値なのかは不明である。
- 9) りん酸イオン……夏期の PO₄ が J I S・K・0 1 0 1・3 2 法でほとんど定量されなかったので今回は J I S・K・0 1 0 2・2 7・C 法で分析した。
分析値は t_r ～0.200 ppm で最高値の測点 4 下層を除けばすべて 0.1 ppm 以下の低値であり、大部分は 0.05 ppm 以下であった。
- 10) 硫酸イオン……硫酸イオンの分析値は 2.530～2.640 ppm であった。
- 11) 塩 素 量……塩素量の測定は海洋観測指針に示される方法で行った。
分析値は 7.84～18.92‰ で、大湊湾奥の測点 19 の上層で 7.84‰ と低鹹であった。他は 18‰ 以上の高鹹水、このうち大部分は 18.5‰ 以上の高値を示した。
測点 19 の中層は 18.43‰ の高鹹水であり、測点 17. 18 など相対的に近い測点でも全層で 18.5‰ 以上を示していることから測点 19 上層の低鹹水は田名部川からもたらされた陸水に起因する局地的な値であると推察される。

なお測点5、測点19等港(湾)奥部の地点を除けば各点とも上下層間の塩素量の差はほとんどなく、また上層で高目の値を示す場合もしばしば認められ、塩素量の面からも冬期の上下混合期にあることがうかがわれる。

- 12) 沃素消費量……全点全層で0であった。
- 13) アンモニウムイオン……アンモニウムイオンの分析値は0.01以下～0.26ppmで全般に低値であり、大半は0.1ppm以下であった。夏期、冬期とも海域のアンモニウムイオンは低値であり、CODの低値と相まって海域の有機汚染がきわめて低いことが推察される。
- 14) n-ヘキサン抽出物質……全点全層で1ppm以下であった。
- 15) カドミウム……全点全層で不検出であった。
- 16) ひ素……全点全層で不検出であった。
- 17) アルキル水銀……全試料で不検出であった。
- 18) 総水銀……全試料で不検出であった。
- 19) 鉛……不検出～0.009ppmで測点1測点12以外の地点で検出されている。
- 20) 総クロム……全点全層で不検出であった。
- 21) 有機リン……全試料で不検出であった。
- 22) 銅……不検出～0.009ppmで全地点で微量ながら検出されている。
- 23) シアンイオン……全試料で不検出であった。

以上むつ湾の水質について夏期および冬期の概況を述べた。

COD、溶存酸素、りん酸イオン、アンモニウムイオン等の分析値は清浄な海域でみられる値であり、また透明度も大であるがその割にBODが高いのが気になる。

2 太平洋小川原地区の水質

A 夏期の水質

太平洋小川原地区での採水は昭和46年8月23～25日に行なった。

分析結果について以下に略記する。

- 1) 水温……水温は海茨で18.0～21.4℃、尾駮沼と鷹架沼では22.0～22.6℃で陸水域で2℃ほど高温である。
海域、陸水とも上下層間の温度差は小さく、高瀬川沖合約9kmの測点7の下層で他の測点より約2℃低温であった他は、上下層間の温度差は1℃以内であった。
- 2) 外観・臭気……海域では各試料とも澄明で無臭であった。尾駮沼、鷹架沼は透視度の項で述べるように微細浮遊物による透視度の低下があったが臭気は感じられなかった。
- 3) 透視度……海域ではいずれも30cm以上であった。
尾駮沼では上層で27cm、下層で25cm、鷹架沼は上層で26cm、下層で17cmといずれも懸濁物質の存在を示す値であった。
- 4) 透明度……海域の透明度は5.9～14mで沖合ほど高く、沿岸部では低目の値であった。
尾駮沼および鷹架沼では透明度は低く、それぞれ3m、1.6mであった。
- 5) PH……海域のPHは8.0～8.1で一般的な値であった。尾駮沼では上下層とも8.1、鷹架沼では上層で8.5、下層8.3であった。
- 6) BOD……BODの分析値は海域、陸水部とも低く0.3～2.0ppmであった。
- 7) COD……海域のCODは0.1～0.8ppmと非常に低い。陸水域では3.0～4.2ppmで、海域と比べて高目であった。最高値は鷹架沼で測定された。この試料は透視度で最低値を示したものである。
- 8) DO……海域のDOは7.3～8.3ppm、飽和度に換算して95～110%で各試料と

も十分酸素があることを示している。尾駮沼および鷹架沼では7.6～8.8ppm飽和度に換算して85.4～104%で尾駮沼の上下層間で若干酸素量の差がみられたが、いずれにせよ酸素の欠乏状態は認められなかった。

- 9) 懸濁物質……浮遊懸濁物量を示す懸濁物質は海域では1ppm～3ppmで概して上層でやや高目になっている。
尾駮沼および鷹架沼では3.5～10.1ppmで、両沼とも上層で高値を示した。
- 10) リン酸イオン……リン酸イオンの含有量は非常に低く、海域では全試料で0.02以下、尾駮沼および鷹架沼では0.02ppm未満～0.035ppmであった。
- 11) 硫酸イオン……硫酸イオンは海域で1990～2620ppm、陸水域で26.6～1990ppmであった。
- 12) 塩素量……海域の塩素イオンは14.38～18.71%で、鷹架沼沖合の測点4、上層でやや低値である。尾駮沼では13.35～13.65%鷹架沼では69.4～73.7ppmで、尾駮沼は海水の影響が大きいが鷹架沼の測点3は淡水である。
- 13) 沃素消費量……全試料で0であった。
- 14) アンモニウムイオン……アンモニウムイオンは0.01ppm以下～0.26ppmで測点4の下層で若干高いが、他は海域、陸水域とも低値でアンモニウムイオンによる汚染はほとんど認められない。
- 15) n-ヘキサン抽出物質……全試料で1ppm以下で油汚染はほとんどないと考えられる。
- 16) カドミウム……全試料で不検出であった。
- 17) ひ素……全試料で不検出であった。
- 18) アルキル水銀……全点全層で不検出であった。
- 19) 総水銀……総水銀は不検出～0.006ppmで測点8の下層で0.006ppmを示したが他の測点では不検出～0.002ppmであった。
- 20) 鉛……全試料で不検出であった。
- 21) 総クロム……全試料で不検出であった。
- 22) 有機りん……全点全層で不検出であった。
- 23) 銅……0.001～0.016ppmが検出された。測点9の下層で若干高いがほぼ一般的な値である。
- 24) シアンイオン……全試料で不検出であった。

B 冬期の水質

冬期の採水は昭和47年3月22日に行なった。

- 1) 水温……海域の水温は測点5を除けば7.0～7.2℃で上下層間および測点間の差はほとんどない。測点5では他の測点に比べて若干低温であり表層5.0℃中、下層で6.8℃および6.7℃であった。
尾駮沼および鷹架沼では5.9～6.1℃で海域より約1℃低温であった。
- 2) 外観……夏期と同様に、海域では澄明、陸水域で若干浮遊物のある状態であった。
- 3) 透視度……透視度は陸水域についてのみ行った。
尾駮沼では上下層とも11.5cmと低値であるが鷹架沼では30cm以上であった。
- 4) PH……PHは海域で7.8～7.9、陸水域で7.8～8.1で変動が少なく、いずれも夏期より低くなっている。
- 5) BOD……BODは0.8～4.3ppmで、測点1および測点5の上層でやや高目である。各測点とも夏期より若干高いようである。
- 6) COD……CODは鷹架沼上層の3.3ppmを除けば1ppm以下であり、夏期と同様にCODで示される有機物量はきわめて少ないものと推察される。

- 7) D O……冬期の溶存酸素は海域で9.1～10.2 p p m、飽和度に換算して91.4～106%であった。また陸水域では83.4～92%で尾駸沼下層および鷹架沼上層で若干低目であった。
- 8) 懸濁物質……懸濁物質は海域で1 p p m以下～3 p p mと低かった。陸水域では10～27 p p mで透視度の悪かった尾駸沼よりも透視度30 cm以上の鷹架沼の方が値が大で27 p p mの最高値であった。
- 9) りん酸イオン……りん酸イオンは海域で0.02 p p m以下～0.136 p p m、陸水域で0.028～0.145 p p mであり、夏期に比べて高くなっている。
- 10) 硫酸イオン……硫酸イオンは海域で2510～2620 p p m、陸水域で20.9～1340であった。
- 11) 塩素量……海域の塩素イオンは17.94～18.68%で、高瀬川沖の測点6の上層でやや低鹹である。陸水域では夏期と同様に尾駸沼では海水の影響がみられ、上層で9.46%、下層で11.30%であるが鷹架沼は55.9 p p mで淡水であることを示している。
- 12) 沃素消費量……全試料で0であった。
 太平洋小川原地区の海域の水質では汚染指標物質は概して低値であり、汚染の少ない良好な状態であることを示している。
 また、夏期、冬期とも上下層間の温度差はきわめて小さく、沿岸で普通にみられる日射による夏期の水温躍層の形成は認められなかった。
 陸水域の尾駸沼、鷹架沼では海域に比べて汚染指標物質は若干高くなっている。夏期、冬期とも透視度は低目で懸濁物質は高値であった。
- 13) アンモニウムイオン……アンモニウムイオンの分析値は0.03～0.21 p p mで総じて夏期に比べて若干高くなっているが、汚染状況は認められない。
- 14) カドミウム……全試料で不検出であった。
- 15) ひ素……全試料で不検出であった。
- 16) アルキル水銀……全試料で不検出であった。
- 17) 鉛……鉛は不検出～0.003 p p mで測点4以外で微量ではあるが検出された。
- 18) 総水銀……全試料で不検出であった。
- 19) 総クロム……全試料で不検出であった。
- 20) 有機りん……全点全層で不検出であった。
- 21) 銅……0.001～0.006 q q mの一般的な値であった。
- 22) シアンイオン……全試料で不検出であった。

IV 底質分析結果

1. むつ湾

A 夏期の底質

昭和46年6月24日に採泥を行った。採泥は9測点で行ったがこのうち4測点は礫状底質であったため試料を採取することができなかった。

今回、分析に使用した試料は測点4, 5, 13, 18, 19, の5点のものである。

以下、各項目の分析結果について略記する。

- 1) 単位体積重量……単位体積重量は $1.2 \sim 1.6 \text{ g/cm}^3$ (但し測点5は試料不足で不検定) で測点19で小さく底質があまりしまっていないことが伺われる。
- 2) 含水量……ここでの含水量は $\{(\text{水分の重さ}) / (\text{乾燥泥の重さ})\} \times 100 (\%)$ で示される値である。分析値は $13.0 \sim 40.8 \%$ で全般に非常に水分が少なかった。
- 3) COD……CODの分析値は $0.3 \sim 1.8 \text{ O}_2 \text{ mg/g}$ 乾泥ときわめて小さい値であった。一般に有機汚染の進行している底質ではCOD値は $30 \text{ O}_2 \text{ mg/g}$ 乾泥以上といわれている。
- 4) 強熱減量……強熱減量は $4.3 \sim 14.6 \%$ で測点5および測点19でやや高い。強熱減量が 13% 以上の時は有機汚染の疑いがあるとされている。
- 5) 硫化物……硫化物の分析値は $0.01 \sim 0.04 \text{ S mg/g}$ 乾泥と小さく、底質の還元化の傾向は認められない。底質が還元状態となり、底棲生物にとって要注意状態となるのは 0.3 S mg/g 乾泥以上といわれている。
- 6) シアンイオン……全試料で不検出であった。
- 7) カドミウム……カドミウムは $0.1 \sim 0.6 \text{ ppm}$ で自然海域で普通にみられる値であった。
- 8) ひ素……ひ素は測点13, 18で不検出、他の測点では $3.8 \sim 9.8 \text{ ppm}$ で測点9で若干高いが、まず一般的な値である。
- 9) アルキル水銀……全試料で不検出であった。
- 10) 総水銀……総水銀は $0.21 \sim 0.89 \text{ ppm}$ という一般的な値であった。水銀汚染があるとみられるのはほぼ 1 ppm 以上の底質である。
- 11) 鉛……鉛の分析値は $1.26 \sim 4.63 \text{ ppm}$ であった。鉛は自然海域で 50 ppm 程度まで検出される。
- 12) 総クロム……クロムは13および19で不検出、他の測点で $3.57 \sim 5.80 \text{ ppm}$ と非常に小さかった。自然海域のクロムは 50 ppm 程度まで検出される。
- 13) 有機りん……全試料で不検出であった。
- 14) 銅……銅の分析値は $2.52 \sim 4.57 \text{ ppm}$ であった。銅は自然状態で $70 \sim 100 \text{ ppm}$ 検出される。

B 冬期の底質

昭和46年12月17～18日に夏期と同じ測点で採泥した。しかし、採取した試料は前回とかなり異なっており、全体に含水量の大きい泥分の含有率の高いものであった。

なお今回の調査でも測点14の底質は採取できなかったが、前回採取できなかった測点11, 12, 15は今回は採取できたので分析した。

分析結果は次のようであった。

- 1) 単位体積重量……試料不足の測点4および測点11については分析しなかったが、他の地点では、 $1.3 \sim 1.9 \text{ g/cm}^3$ で、測点5, 15, 19の各地点で大きな値であった。
- 2) 含水量……前回の分析値に比べて含水量は著るしく大きい。分析値は $35.5 \sim 21.6 \%$ で、測点11で最高値を示した。

- 3) C O D……試料不足の測点11を除けば分析値は1.00～3.902 mg / 1 g 乾泥で底質のC O Dとしては小さな値である。
- 4) 強熱減量……強熱減量は2.4～11.0%であった。
- 5) 硫化物……硫化物の分析値は試料不足の測点11を除いて0.05～0.2 S mg / 1 g 乾泥であった。測点5, 15, 18, 19の各点で0.1 S mg / 1 g 乾泥とやや高い値であった。
- 6) シアンイオン……全試料で不検出であった。
- 7) カドミウム……試料不足の測点11を除いて分析値は0.1～0.3 p p mと低値であった。
- 8) ひ素……ひ素の分析値は9.0～25.8 p p mで前回の試料より高い値になっている。とくに測点4, 15, 18では15 p p m以上であった。
- 9) アルキル水銀……全点で不検出であった。
- 10) 総水銀……総水銀の分析値は0.04～0.45 p p mであった。
- 11) 鉛……鉛の分析値は8～39 p p mと一般的な値であった。
- 12) 総クロム……クロムは1.8～4.2 p p mの低値であった。
- 13) 有機りん……全点で不検出であった。

むつ湾の底質の採泥は夏期と冬期で同一地点で行なわれたはずであるが、採取されたサンプルは全く状態が異なっている。夏期に採取されたものは非常に水分の少ない砂質であったが冬期のものは泥分を多く含んだ含水量の高い試料が多かった。

分析結果でも硫化物ひ素等は冬期の試料でやや高目であった。

しかし、全般的には夏期、冬期とも底質の汚染度は小さく、良好な状態に保たれているとみることができる。

2. 太平洋小川原地区

A 夏期の底質

昭和46年8月28日に測点4, 5, 6, 7, 9, の各点で採泥を行なった。但し測点7は礫状底質のため採泥できなかった。

各項目の分析結果について以下に略記する。

- 1) 単位体積重量……各測点とも試料不足のため分析できなかった。
- 2) 含水量……各地点の含水量は34.7～36.5%と非常に小さかった。
- 3) C O D……C O Dは0.39～1.57 O₂ mg / 1 g 乾泥で各地点とも小さい。
- 4) 強熱減量……分析値は1.8～6.8%と小値であった。
- 5) 硫化物……硫化物の分析値は0.01～0.03 S mg / 1 g 乾泥と非常に小さく、底質は好気的な状態に保たれていることがうかがわれる。
- 6) シアンイオン……全地点で不検出であった。
- 7) カドミウム……分析値は0.1～0.28 p p mと低い。
- 8) ひ素……測点4で2.3 p p m、他の地点では不検出であった。
- 9) アルキル水銀……全点で不検出であった。
- 10) 総水銀……全点で不検出であった。
- 11) 鉛……鉛の分析値は3.0～6.8 p p mと非常に低かった。
- 12) 総クロム……クロム1.3～1.7 p p mという小さな値であった。
- 13) 有機りん……全地点で不検出であった。
- 14) 銅……銅も0.7～1.3 p p mと非常に小さい値であった。

B 冬期の底質

冬期の採泥は昭和47年3月22日に行なった。

分析結果を以下に略記する。

- 1) 単位体積重量……全点で1.8～1.9 g / cm³という非常に高い値であり各点とも底質がしまっ

いることを示している。

- 2) 含水量……含水量は3.06～4.30%で各点とも低値である。
- 3) COD……0.05～0.63 O₂mg / 1g乾泥という非常に小さな値であった。
- 4) 強熱減量……強熱減量は1.4～11.2%で、測点5でやや高目である。しかし各点とも有機汚染は考えられない。
- 5) 硫化物……分析値は0.01～0.02 ppm で夏期の場合と同様に非常に小さい値であった。
- 6) シアンイオン……全地点で不検出であった。
- 7) カドミウム……分析値は0.06～0.18 ppm の小値であった。
- 8) ひ素……夏期と同様に測点4で7.7 ppmを示した他は各地点とも不検出であった。
- 9) アルキル水銀……全地点で不検出だった。
- 10) 総水銀……総水銀の分析値は0.02～0.04 ppm であった。
- 11) 鉛……分析値は夏期より若干高く5～35 ppm であった。
- 12) 総クロム……分析値は4.3～8.5 ppm であった。
- 13) 有機りん……全地点で不検出であった。

以上太平洋小川原地区の底質について略記した。この海域の底質は夏期、冬期とも非常にきれいで、現在のところ有機汚染、重金属等特殊項目汚染とも認められない。

要約

むつ湾および太平洋小川原地区の水質および底質の状況を把握するために昭和46年6月～8月に夏期の昭和46年12月～47年2月には冬期のサンプルについて採水、採泥し、指定項目について分析した。

むつ湾の水質は一般項目の分析結果からも推察されるように、有機汚染の少ない清澄な海域であり、COD、アンモニウムイオン、リン酸イオン等、栄養塩類も低値である。1～2の例外を除いて各測点とも全層にわたって高鹹であり、透明度も大である。

重金属等「人の健康に係る項目」も夏期には水銀、銅を除いて、冬期には鉛、銅を除いて不検出であった。検出された各項目も環境基準（但し銅は規定されていない）に定められた定量限界以下で、とくに汚染されているとは考えられない。

太平洋小川原地区では海域の各点では外洋型の性格が大で、夏期でも水温は低目であり、日射に起因する水温躍層の形成は認められなかった。

栄養塩類等の有機汚染指標物質はむつ湾よりもさらに低値であり、人為的な汚染はほとんど認められない。

重金属等「人の健康に係る項目」はむつ湾同様、夏期に水銀と銅が、冬期には鉛と銅が微量ながら検出されている。しかし太平洋小川原地区でもこれ等の項目は、環境基準に定められた定量限界以下でとくに問題にはならない。

同時に調査した尾駮沼および鷹架沼では海域に比べて懸濁物質が多く、澄明さは劣っているが、汚染指標物質や重金属等は海域と同様かそれ以下でこの水域でも人為汚染の進行はうかがわれない。

むつ湾の夏期の底質は9測点中4測点で礫状底質であったため分析できなかった。分析を行なった5測点の資料はいずれも砂質で、含水量が小さく、COD、強熱減量、硫化物等の有機汚染の進行によって底質の悪化をきたす各項目はいずれもきわめて小さく、重金属等「人の健康に係る項目」も不検出か、検出されてもごく小さい値であった。

一方冬期の底質は夏期と同一地点で採泥されたはずであるが、採取されたサンプルは全く異なったものであり、泥質か、泥まじり砂のものが多かった。これ等の試料は夏期のもの比べて含水量が高く強熱減量も大となっているものが多い。また各サンプルともひ素の含有量が高くなっているのが目立つ。

しかし冬期の試料でも底質の悪化は認められず、一般的には重金属等の項目もごく低値を示している。

太平洋小川原地区の底質は夏期、冬期とも同様な砂質であり、有機汚染、指標物質、重金属「人の健康に係る項目」ともきわめて低値で、この海域の底質が清浄な状態に保たれていることを示している。

むつ湾・太平洋小川原地区測点位置図