

サザエ *Turbo sazae*



生態

- ①寿命：8 年程度
- ②成熟：殻高 60mm 以上
- ③産卵期：8 月頃から（水温 20℃以上）
- ④分布：北海道南部から九州、朝鮮半島
- ⑤生態：受精後 3 日～4 日程度は浮遊生活。殻高 0.3mm 前後で水深 3m 前後の海底に着底。潮間帯から水深 30m 程度までのツルアラメ、コンブ、ホンダワラ類、アナアオサなどが生育する岩盤又は転石地帯に生息する。一般に稚貝は浅所に多く、成長に伴い深所に移動する。貝殻の突起は静穏な磯場のものでは小さいか消失するとされる。夜行性。生息可能な下限水温は 6℃～7℃。成長できる水温は 12℃～30℃。




図 青森県におけるサザエの成長（深浦）

出典：須川ら（1982）S55 年度青水増事業概要. 11. 231-234

主な漁業

刺し網、ほこやたもを使った底見で漁獲される。津軽海峡大間崎周辺から日本海に至る沿岸で採捕されるが、水温が比較的高い日本海沿岸域で漁獲量が多い。漁期は春季から夏季が中心。

漁獲の動向と水準

1984 年に発生した異常冷水のため、1985 年には漁獲量が 39 トンまで大幅に落ち込んだ。その後、1991 年までに一旦回復したものの、それ以降は 23 トン～140 トンで大きく変動している。

近年の漁獲量は 2019 年に 1981 年以降で最低の 16 トンに減少（2017 年～2018 年に発生したへい死が原因と推測）したものの、2020 年からは回復傾向となっており、2024 年は前年の 2 倍超となる 143 トンとなった。

2024 年の漁獲水準は、漁獲量の最高値と最低値との間を 3 等分し、上から高位、中位、低位とすると、高位であった。

資源を上手に利用するために

○資源管理計画（深浦漁協 1993 年 3 月）

・殻高 6cm 以下小型個体の保護を検討することとした。

☆上記取組など、成熟前の小型個体を獲り過ぎないようにすることが必要である。




図 青森県におけるサザエの漁獲量及び漁獲金額の推移

