

花きの生育状況（令和7年6月10日現在）


（地独）青森県産業技術センター
農林総合研究所 花き・園芸部

○夏秋ギク

側枝長は前年、平年より短い。葉数は前年、平年より少ない。

品 種	年 次	挿し芽日 (月日)	定植日 (月日)	側枝長 (草丈) (cm)	葉数 (枚)	備 考
岩の白扇	本 年	4/ 4	4/25	1 9. 5	9. 7	病害虫の発生は見 られない
	前 年	4/ 5	4/25	2 9. 0	1 1. 4	
	平 年	4/ 5	4/25	3 2. 0	1 1. 1	

※5月2日に摘心。2本仕立て。令和2年度以降、摘心栽培を実施
※挿し芽日の4月4日より電照を開始。消灯日は6月25日の予定。
※平年値は令和2年～6年の平均



6月10日撮影 夏秋ギク「岩の白扇」

○トルコギキョウ

草丈は、ハピネスホワイトでは前年及び一昨年より低く、ボヤージュ（2型）ホワイトでは前年及び平年に比べ低い。節数は、ハピネスホワイトでは前年多く、一昨年より少なく、ボヤージュ（2型）ホワイトでは前年及び平年より少ない。

品 種	年 次	は種日 (月日)	定植日 (月日)	草丈 (cm)	節数 (節)	備 考
ハピネス ホワイト	本 年	2/14	4/21	1 1. 3	8. 2	若干の生育不良 株が見られる。
	前 年	2/15	4/19	1 2. 7	7. 7	
	一昨年	2/15	4/20	1 3. 4	8. 5	
ボヤージュ 2型ホワイト (参考)	本 年	2/14	4. 21	1 3. 2	8. 0	若干の生育不良 株が見られる。
	前 年	2/15	4/19	1 7. 8	8. 6	
	平 年	2/15	4/20	1 6. 3	8. 7	

※ ハピネスホワイトは前年から栽培を開始

※ ボヤージュ（2型）ホワイトの平年値は平成29年、令和元年～6年の平均



6月10日撮影 トルコギキョウ
「ハピネスホワイト」



6月10日撮影 トルコギキョウ
「ハピネスホワイト」