

花きの生育状況（令和7年7月10日現在）

（地独）青森県産業技術センター
農林総合研究所 花き・園芸部

○夏秋ギク

土壌病害が発生し、生育は不良である。側枝長は前年、一昨年よりかなり短く、葉数は昨年、一昨年よりかなり少ない。害虫の発生は見られない。

品 種	年 次	挿し芽日 (月日)	定植日 (月日)	側枝長 (cm)	葉数 (枚)	備 考
岩の白扇 (8月開花)	本 年	4/ 4	4/25	31.1	18.3	土壌病害が発生し、生育は不良である
	前 年	4/ 5	4/25	83.8	33.7	
	一昨年	4/ 5	4/25	68.5	31.3	

※5月2日に摘心。2本仕立て。令和2年度以降、摘心栽培を実施。

挿し芽日の4月4日より電照を開始。消灯日は6月25日。



7月10日撮影 夏秋ギク「岩の白扇」

○秋ギク

7月2日に摘心を行い、側枝の発生を確認した。病虫害の発生は見られない。

品種	年次	挿し芽日 (月日)	定植日 (月日)	摘心日 (月日)	備 考
神馬 (10月開花)	本 年	6/5	6/25	7/2	病虫害の発生は見られない
	前 年	6/5	6/25	7/3	
	一昨年	6/9	6/24	7/3	

※ 摘心2本立て、季咲き栽培



7月10日撮影 秋ギク「神馬」

○トルコギキョウ

草丈は、ハピネスホワイトでは前年より短く、一昨年より長い。ボヤージュ2型ホワイトでは前年より短く、平年より長い。

節数は、ハピネスホワイトでは前年及び一昨年より多く、ボヤージュ2型ホワイトでは前年及び平年より少ない。

出蕾日はハピネスホワイトでは前年より1日遅く、一昨年より1日早い。ボヤージュ2型ホワイトでは前年と同じで、平年より1日遅い。

品 種	年 次	は種日 (月/日)	定植日 (月/日)	草 丈 (cm)	節 数 (節)	出蕾日 (月/日)	備考
ハピネス ホワイト	本 年	2/14	4/21	53.6	14.0	6/24	若干の生育 不良株が見 られる
	前 年	2/15	4/20	55.5	13.6	6/23	
	一昨年	2/15	4/20	52.7	13.3	6/25	
ボヤージュ 2型ホワイト (参考)	本 年	2/14	4/21	63.1	12.7	6/19	若干の生育 不良株が見 られる
	前 年	2/15	4/20	69.6	13.3	6/19	
	平 年	2/15	4/19	57.8	13.0	6/18	



「ハピネスホワイト」

7月10日撮影



「ボヤージュ2型ホワイト」

トルコギキョウ