

重要魚類資源モニタリング調査

佐藤大介・今村豊・和田由香・田中友樹・村松里美・杉浦大介・松谷紀明・石黒智大

目 的

青森県の重要な水産資源であるタラ類 2 種、カレイ類 5 種、ヤリイカ、ハタハタ、ヒラメの計 10 魚種について分布密度を求め、資源の現状と動向を評価する。なお、ハタハタとヒラメについては本誌「資源評価調査委託事業・ハタハタ」、「資源評価調査委託事業・ヒラメ」に示した。

材料と方法

1. オッタートロール調査

2024 年 4 - 9 月（以下「前期」）及び 2024 年 10 月 - 2025 年 3 月（以下「後期」）に、試験船青鵬丸により、図 1 に示す日本海に設定した水深 100 - 300 m にある計 9 地点及びその中間点において、袖網長 7.5 m、身網長 11.8 m、網口幅 2 m、コットエンド長 2.6 m のオッタートロール網を船速 2 ノット - 3 ノットで 30 分間曳網した。漁獲された魚類について科レベル以下に同定し個体数を計数したのち、マダラ、スケトウダラ、ハタハタ、ヤリイカについては無作為に各々約 100 個体を抽出し全長、標準体長あるいは外套背長を、ババガレイ、マコガレイ、ムシガレイ、ヤナギムシガレイ、マガレイ、ヒラメの 6 魚種については全個体の全長、標準体長、体重を測定した。毎回の曳網前にメモリー式 CTD（シーバード SBE-19）を用いて鉛直水温と塩分を、曳網中には漁網監視装置により袖網間隔、曳網水深、網口の高さを測定し、袖網間隔に北川ら¹⁾の方法により求めた曳網距離を乗じて曳網面積を求め、面積密度法により前記の 10 魚種について水深 50 m 帯（水深 0 - 100 m）、水深 150 m 帯（同 101 - 200 m）、水深 250 m 帯（同 201 - 300 m）、水深 350 m 帯（同 301 m 以深）の水深別に平均分布密度を算出した（表 1）。

マダラ、スケトウダラ及びヤリイカについて、大戸瀬崎地先から権現崎地先までの範囲における現存尾数を、小向²⁾が算出した各水深帯の面積（表 2）に、各魚種の水深ごとのサイズ別平均密度を乗じて推定した。なお、マダラについて、標準体長 130 mm 未満を 0 歳魚、130 - 279 mm を 1 歳魚、280 mm 以上を 2 歳魚以上、スケトウダラについて標準体長 120 mm 未満を 0 歳魚、120 - 259 mm を 1 歳魚、260 mm 以上を 2 歳魚以上に各々区分し、年齢別に現存尾数を求めた。

これらの調査結果を 2007 年以降の各値と比較して動向を評価するとともに、系群全体の資源動向と比較した。




図 1. オッタートロール調査地点

表 1. 水深帯別調査回数・面積

調査期間	2024 年日本海前期 (2024/4/22-9/26)			
水深帯 (m)	50	150	250	350
曳網回数	8	6	9	1
曳網距離 (m)	22,379	18,118	24,354	2,654
曳網面積 (km ²)	0.2350	0.1902	0.2557	0.0279
調査期間	2024 年日本海後期 (2024/10/7-2025/3/12)			
水深帯 (m)	50	150	250	350
曳網回数	5	8	10	4
曳網距離 (m)	13,979	22,473	27,808	9,037
曳網面積 (km ²)	0.1468	0.2360	0.2920	0.0949

表 2. 水深帯別海域面積

海域	単位: km ²			
	50 m	150 m	250 m	350 m
日本海	222	406	53	60
太平洋	768	785	351	347

2. オッタートロールと民間沖合底曳網漁船（かけまわし船）との漁獲特性比較

オッタートロールと民間沖合底曳網漁船との漁獲特性の比較を行うため、2024年6月、9月および10月に民間の沖合底曳網漁船（以下、「かけまわし船」）に計4回乗船し、試験船青鵬丸が操業した計16調査地点にて、同時期にかけまわし網を曳網した。操業ごとに、漁獲物の上に50 cm四方の抽出枠を1-2個設置し、漁獲物全体の画像をGoPro HERO11 BLACKを用いて撮影した。その後、抽出枠内の漁獲物について、魚種ごとに全長または外套背長をパンチングした。

次に、曳網面積の検討を行った。かけまわし式沖合底曳網漁業は、浮標を海面に投下し、操業しようとする範囲を包囲するように曳網、網、曳網を投入、浮標を回収して両弦の曳網を巻き上げる。また、網の投下中に、時計回りに90°回頭する「肩折り」を行うことで、網が開いた状態で網を投下することができる³⁾。かけまわし網漁具はオッターボードのような開口装置を持たず、操業中の漁具の形状は随時変化すること、曳網中の漁具の挙動を直接観測する方法が限られていることから、かけまわし網の曳網面積の推定は難しい⁴⁾。そこで本研究では、曳網開始後、両弦の曳網が閉じるまで網が前方に動かないものと仮定した。つまり、かけまわし漁具の投網地点を中心とし、曳網時の左舷側及び右舷側の肩折りした2地点と中心を結んで得られる角度を中心角、袖網距離360 mを半径とした扇形の面積をかけまわし漁具の曳網面積とし、統計解析ソフトR(ver. 4.2.3)⁵⁾及びパッケージgeosphere(ver. 1.5.18)⁶⁾を用いて曳網面積を算出した。

また、9-10月の調査について、漁獲物の画像から画像解析ソフトImageJ⁷⁾を用いて、ひと網ごとの漁獲物全体に対する抽出枠内のサンプル抽出率を推定した。調査ごとの漁獲物画像をImageJで読み込んでグレースケールに変換し、魚体と背景が分かれるように2値化し、魚体部分のピクセル数を漁獲物全体の面積 S_{total} として測定した。同様に、抽出枠内の魚体部分のピクセル数を抽出枠内の魚体面積 S_{sample} として測定した（図2）。測定した漁獲物全体の面積 S_{total} および抽出枠内の魚体面積 S_{sample} を基に、サンプル抽出率 f を（1）式によって操業ごとに求めた。

$$f = \frac{S_{sample}}{S_{total}} \quad (1)$$

かけまわし船の操業ごとに、魚種 x の測定尾数 $n_{x,k}$ 、曳網面積 A_k 、サンプル抽出率 f を用いて、単位面積当たりの採捕尾数 d_k を（2）式によって求めた。同様に、同時期同調査地点における試験船青鵬丸（以下、オッター船）の調査結果から、魚種 x の測定尾数 $n_{x,o}$ 、曳網面積 A_o を用いて、単位面積当たりの採捕尾数 d_o を（3）式によって求めた。

$$d_k = \frac{n_{x,k}}{f \cdot A_k} \quad (2)$$

$$d_o = \frac{n_{x,o}}{A_o} \quad (3)$$

上式から得られた両船の単位面積当たりの採捕尾数から、（4）式により採捕密度比 p を算出し、地点別魚種別に両船の比較を行った。

$$p = \frac{d_k}{d_k + d_o} \quad (4)$$

さらに、同じく9-10月のオッタートロールおよびかけまわし船による魚種別単位面積当たりの採捕尾数や漁獲物組成を基に、漁法間の群集組成の類似度を解析した。解析には統計解析ソフトR及びパッケージvegan(ver. 2.6.4)⁸⁾を使用した。Bray-Curtis指数に基づく非類似度行列を計算し、非計量多次元尺度構成法⁹⁾ (non-metric multidimensional scaling: NMDS) を用いて操業ごとの群集組成を二次元平面上にプロットした。両船の群集組成の差の検定にはノンパラメトリック多変量分散分析^{9, 10)} (permutational multivariate analysis of variance: PERMANOVA) を行い、群内分散の違いを検証するため等分散性の検定

¹⁰⁾ (permutational analysis of multivariate dispersions: PERMDISP) を行った。なお、同時期・同地点で行われた調査の対応を考慮するため、PERMANOVA では回次×地点を層化変数として指定した。また、群集差に寄与する種を特定するため、SIMPER 解析¹¹⁾ (similarity percentage analysis) を行い、各魚種の寄与の大きさを評価した。




図 2. 漁獲物画像からピクセル数を計測する手順

結果と考察

1. オッタートロール調査

調査地点ごとの操業データ及び魚種別の採捕個体数、CTD による層別の水温を付表 1 に示した。

(1) マダラ

2007 - 2024 年の各年前期における水深帯別分布密度を表 3-1 に、年齢別の現存尾数を表 3-2 に、2024 年前期のマダラ体長別現存尾数を図 3 に示した。

2024 年の 0 歳魚の分布は確認されなかった。1 歳魚は水深 150 m 帯で 0.005 個体/1,000 m² と、前年を下回った。2 歳魚以上は水深 150 m 帯で 0.005 個体/1,000 m²、水深 250 m 帯で 0.01 個体/1,000 m²、水深 350 m 帯で 0.03 個体/1,000 m² と、前年を下回った（表 3-1）。

2024 年の現存尾数は、1 歳魚および 2 歳魚以上で前年を下回った（表 3-2）。

マダラ本州日本海北部系群の加入量（3 歳魚の資源尾数）は、高豊度の 2014、2017 年級群が漁獲加入した 2017、2020 年に高かった¹²⁾。本調査結果の 2014、2017 年級群の 1 歳魚の現存尾数は 2007 年以降の 18 年間で 1、2 番目に多く、両年級群が高豊度年級であることを支持する結果となっている。系群全体では、2018 年級群以降の豊度が低かったことが示唆されており、今後、資源が減少傾向となる可能性がある¹²⁾。本調査結果においても 2018 年級群以降低豊度であり、系群全体の傾向と共通していた。青森県日本海沿岸におけるマダラ分布状況と系群全体の資源変動と何らかの関係を持つと推察されることから、調査を継続する必要がある。

表 3-1. マダラ年齢別水深帯別分布密度

年齢	西暦	水深帯			
		50 m	150 m	250 m	350 m
0歳魚	2007	-	0.14	0.09	0.00
	2008	2.73	0.03	0.01	0.00
	2009	0.19	0.09	0.00	0.00
	2010	0.09	3.07	0.61	0.05
	2011	0.00	0.01	0.00	0.00
	2012	0.18	0.30	0.25	0.00
	2013	0.07	0.06	0.00	0.00
	2014	0.02	0.15	0.01	0.00
	2015	0.00	0.04	0.03	0.00
	2016	0.01	0.13	0.08	0.00
	2017	0.02	0.28	0.01	0.04
	2018	0.00	0.01	0.00	0.00
	2019	0.00	0.00	0.01	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.10	0.00
	2022	0.00	0.01	0.00	0.00
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1歳魚	2007	-	0.00	0.00	0.00
	2008	0.00	0.04	0.03	0.11
	2009	0.00	0.04	0.12	0.00
	2010	0.00	0.26	3.14	1.01
	2011	0.00	1.28	0.42	0.09
	2012	0.00	0.24	0.52	0.28
	2013	0.00	1.64	0.75	0.43
	2014	0.00	0.48	0.62	0.00
	2015	0.00	1.91	1.38	4.53
	2016	0.00	0.22	0.98	0.97
	2017	0.00	0.07	0.14	0.10
	2018	0.00	1.27	6.26	0.75
	2019	0.00	0.00	0.20	0.01
	2020	0.00	0.00	0.01	0.00
	2021	0.00	0.00	0.01	0.00
	2022	0.00	0.03	0.02	0.00
	2023	0.00	0.02	0.01	0.00
	2024	0.00	0.005	0.00	0.00
2歳魚 以上	2007	-	0.00	0.00	0.17
	2008	0.00	0.04	0.18	0.19
	2009	0.00	0.01	0.07	0.00
	2010	0.00	0.02	0.02	0.07
	2011	0.00	0.03	0.18	0.26
	2012	0.00	0.10	0.20	0.43
	2013	0.00	0.05	0.81	0.09
	2014	0.00	0.01	0.58	1.02
	2015	0.00	0.05	0.50	0.47
	2016	0.00	0.01	0.20	0.20
	2017	0.00	0.01	0.34	0.57
	2018	0.00	0.01	0.13	0.37
	2019	0.00	0.00	0.50	0.54
	2020	0.00	0.00	0.00	0.06
	2021	0.00	0.00	0.05	0.15
	2022	0.00	0.00	0.02	0.05
	2023	0.00	0.01	0.02	0.09
	2024	0.00	0.005	0.01	0.03

表 3-2. マダラ年齢別現存尾数

西暦	年齢		
	0歳魚	1歳魚	2歳魚以上
2007	16	13	10
2008	252	12	46
2009	257	36	12
2010	480	197	15
2011	2	547	38
2012	176	141	76
2013	40	731	69
2014	65	230	95
2015	19	1,119	76
2016	60	199	27
2017	122	40	57
2018	4	894	33
2019	0	11	59
2020	0	1	4
2021	5	0	12
2022	4	12	4
2023	0	8	9
2024	0	2	5




図 3. 2024 年前期のマダラ体長別現存尾数

(2) スケトウダラ

2007 - 2024 年の各年前期における水深帯別分布密度を表 4-1 に、年齢別の現存尾数を表 4-2 に、2024 年前期のスケトウダラ体長別現存尾数を図 4 に、前期と同様の方法で算出した 2024 年後期のスケトウダラ体長別現存尾数を図 5 に示した。

2024 年の 0 歳魚の分布密度は、水深 150 m 帯で 0.005 個体/1,000 m²、水深 250 m 帯で 0.015 個体/1,000 m²と、前年を下回った。1 歳魚の分布密度は、水深 250 m 帯で 0.005 個体/1,000 m²、水深 350 m 帯で 0.73 個体/1,000 m²と、前年を上回った。2 歳魚以上の分布密度は、水深 250 m 帯で 0.005 個体/1,000 m²、水深 350 m 帯で 0.17 個体/1,000 m²と、前年を下回った（表 4-1）。

2024 年の現存尾数は、0 歳魚で前年を下回り、1 歳魚及び 2 歳魚以上で前年を上回った（表 4-2）。一方で、2024 年後期では多量の小型スケトウダラが採捕された（付表 1）。後期のスケトウダラについて、成長を考慮して標準体長 180 mm 未満を 0 歳魚、180 - 329mm を 1 歳魚とし、前期と同様に現存尾数を算出したところ、現存尾数は 0 歳魚が 683 千尾、1 歳魚は 31 千尾と算出された（図 5）。0 歳魚の値は 2007 - 2024 年の各年前期の結果から算出された現存尾数に比べ多く、2024 年級群が高豊度である可能性が示唆された。

スケトウダラ日本海北部系群の 0 - 2 歳魚を対象とした仔稚魚分布調査及び未成魚分布調査の結果からは、

2006、2012、2015、2016、2018、2019、2021 - 2024 年級群は高豊度、2007 - 2009、2011、2013、2014、2017、2020 年級群は低豊度であると考えられている¹³⁾。現状、本調査が示す 0、1 歳魚の年変動と、系群全体の資源の年変動との間に関連性は見い出せないが、今年度の後期の 0 歳魚（2024 年級群）、前後期の 1 歳魚（2023 年級群）が高豊度を示したと一致した。今後、資源状態が中位、あるいは高位に転じた段階で再検討することにより資源量指標値としての有効性が示される可能性があるため、調査を継続してデータを収集する必要がある。

表 4-1. スケトウダラ年齢別水深帯別分布密度

年 齢	西 暦	単位：個体/1,000 m ²			
		水深帯			
		50 m	150 m	250 m	350 m
0歳魚	2007	0.00	0.00	0.00	0.00
	2008	0.16	0.00	0.04	0.00
	2009	0.01	0.12	0.77	0.00
	2010	0.00	0.01	0.13	0.37
	2011	0.00	0.01	0.01	0.04
	2012	0.00	0.11	0.02	0.23
	2013	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014	0.01	0.16	0.01	0.00
	2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	2016	0.00	0.01	0.02	0.00
	2017	0.00	0.00	0.01	0.01
	2018	0.00	0.00	0.02	0.00
	2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.01	0.00
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023	0.00	0.00	0.08	0.27
	2024	0.00	0.005	0.01	0.00
1歳魚	2007	0.00	0.00	0.06	0.24
	2008	0.00	0.00	0.04	0.00
	2009	0.00	0.02	0.73	0.00
	2010	0.00	0.00	1.42	0.31
	2011	0.00	0.01	0.01	0.06
	2012	0.00	0.00	0.12	0.01
	2013	0.00	0.05	0.04	0.01
	2014	0.00	0.01	0.07	0.15
	2015	0.00	0.11	0.10	0.21
	2016	0.00	0.00	0.12	0.13
	2017	0.00	0.00	0.01	0.03
	2018	0.00	0.00	0.04	0.17
	2019	0.00	0.00	0.00	0.02
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	0.14
	2022	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024	0.00	0.00	0.005	0.73
2歳魚 以上	2007	-	0.00	0.00	0.17
	2008	0.00	0.04	0.18	0.19
	2009	0.00	0.01	0.07	0.00
	2010	0.00	0.02	0.02	0.07
	2011	0.00	0.00	2.55	1.65
	2012	0.00	0.08	0.20	1.85
	2013	0.00	0.07	1.02	0.53
	2014	0.00	0.04	0.89	0.94
	2015	0.00	0.00	0.28	1.42
	2016	0.00	0.01	0.38	0.52
	2017	0.00	0.00	0.13	1.04
	2018	0.00	0.00	0.26	0.90
	2019	0.00	0.00	0.00	0.04
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00
	2021	0.00	0.00	0.00	1.42
	2022	0.00	0.00	0.00	0.06
	2023	0.00	0.00	0.03	0.26
	2024	0.00	0.00	0.005	0.17

表 4-2. スケトウダラ年齢別現存尾数

西 暦	単位：千尾		
	年 齢		
	0歳魚	1歳魚	2歳魚以上
2007	0	17	10
2008	39	2	46
2009	54	45	12
2010	34	94	15
2011	5	7	234
2012	58	8	152
2013	2	22	112
2014	67	17	119
2015	0	62	100
2016	4	14	53
2017	1	2	70
2018	3	13	68
2019	0	1	2
2020	0	0	0
2021	0	9	85
2022	0	0	3
2023	3	0	8
2024	2	45	11




図 4. 2024 年前期のスケトウダラ体長別現存尾数




図 5. 2024 年後期のスケトウダラ体長別現存尾数

(3) カレイ類、ヤリイカ

カレイ類（ババガレイ、マガレイ、マコガレイ、ムシガレイ、ヤナギムシガレイ）及びヤリイカの水深帯別分布密度について、2024 年分を表 5 - 表 7 に、2023 年分を表 8 - 表 10 に示した。また、面積密度法により調査海域に引き伸ばしたヤリイカの外套背長組成を図 6 に示した。

ババガレイは前期の水深 150 m 帯で分布がみられ、分布密度は最大で 0.005 個体/1,000 m²と前年の最大値 0.003 個体/1,000 m²を上回った（表 5、6、8、9）。

ムシガレイは前期の水深 50 m 帯、水深 150 m 帯、水深 250 m 帯、及び後期の水深 50 m 帯、水深 150 m 帯で分布がみられ、分布密度は最大で 0.80 個体/1,000 m²と前年の最大値 0.70 個体/1,000 m²を上回った（表 5、6、8、9）。

マガレイは後期の水深 150 m 帯、水深 250 m 帯で分布がみられ、分布密度は最大で 0.02 個体/1,000 m²と前年の最大値 0.04 個体/1,000 m²を下回った（表 5、6、8、9）。

マコガレイは前期の水深 50 m 帯、及び後期の水深 50 m 帯で分布がみられ、分布密度は最大で 0.01 個体/1,000 m²と前年の最大値と同程度であった（表 5、6、8、9）。

ヤナギムシガレイは前期の水深 50 m 帯、水深 150 m 帯、及び後期の水深 50 m 帯で分布がみられ、分布密度は最大で 0.02 個体/1,000 m²と、前年の最大値 0.23 個体/1,000 m²を下回った（表 5、6、8、9）。

ヤリイカは前期の水深 50 m 帯、及び後期の 50 m 帯、水深 150 m 帯、水深 250 m 帯で分布がみられた（表 7）。分布密度は最大で後期の水深 50 m 帯で 1.34 個体/1,000 m²と最大となり、前年の最大値 1.25 個体/1,000 m²を上回った（表 7、10）。外套背長は前期の水深 50 m 帯で 50 mm、後期の水深 50 m 帯で 60 mm、水深 150 m 帯で 70 mm、水深 250 m 帯で 150 mm にそれぞれモードがみられた（図 6）。

表5. 2024年前期水深帯別分布密度

魚種名	単位：個体/1,000 m ²			
	水深帯			
	50 m	150 m	250 m	350 m
ババガレイ	0.00	0.005	0.00	0.00
ムシガレイ	0.80	0.12	0.002	0.00
マガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00
マコガレイ	0.003	0.00	0.00	0.00
ヤナギムシガレイ	0.02	0.005	0.00	0.00

表8. 2023年前期水深帯別分布密度

魚種名	単位：個体/1,000 m ²			
	水深帯			
	50 m	150 m	250 m	350 m
ババガレイ	0.003	0.00	0.002	0.00
ムシガレイ	0.33	0.24	0.00	0.00
マガレイ	0.01	0.03	0.00	0.00
マコガレイ	0.01	0.01	0.00	0.00
ヤナギムシガレイ	0.08	0.07	0.00	0.00

表6. 2024年後期水深帯別分布密度

魚種名	単位：個体/1,000 m ²			
	水深帯			
	50 m	150 m	250 m	350 m
ババガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00
ムシガレイ	0.48	0.29	0.00	0.00
マガレイ	0.00	0.02	0.01	0.00
マコガレイ	0.01	0.00	0.00	0.00
ヤナギムシガレイ	0.01	0.00	0.00	0.00

表9. 2023年後期水深帯別分布密度

魚種名	単位：個体/1,000 m ²			
	水深帯			
	50 m	150 m	250 m	350 m
ババガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00
ムシガレイ	0.70	0.04	0.00	0.00
マガレイ	0.01	0.04	0.02	0.00
マコガレイ	0.00	0.00	0.004	0.00
ヤナギムシガレイ	0.07	0.23	0.04	0.00

表7. 2024年ヤリイカ水深帯別分布密度

調査時期	単位：個体/1,000 m ²			
	水深帯			
	50 m	150 m	250 m	350 m
前期	0.47	0.00	0.00	0.00
後期	1.34	1.25	0.02	0.00

表10. 2023年ヤリイカ水深帯別分布密度

調査時期	単位：個体/1,000 m ²			
	水深帯			
	50 m	150 m	250 m	350 m
前期	0.00	0.03	0.00	0.00
後期	1.25	0.28	0.07	0.00




図 6. 2024 年のヤリイカの外套背長階級別現存尾数（日本海）
 （左上：前期の水深 50 m 帯、右上：後期の 50 m 帯、
 左下：後期の 150 m 帯、右下：後期の 250 m 帯）

2. オッタートロールと民間沖合底曳網漁船（かけまわし船）との漁獲特性比較

かけまわし船による比較操業について、調査地点ごとの操業データ及び魚種別の採捕個体数を付表 2 に示した。推定されたかけまわし船の曳網面積は 0.14 - 0.17 km² で、同地点のオッター船の曳網面積の 5.6 - 7.16 倍であった。かけまわし船のサンプル抽出率は 0.03 - 0.34 であった。

(2)、(3)式で算出した操業ごと魚種ごとの単位面積当たりの採捕尾数を付表 3 に、うち重要魚種（マダラ、スケトウダラ、ババガレイ、ムシガレイ、マガレイ、マコガレイ、ヤナギムシガレイ、ヤリイカ、ハタハタ）の単位面積当たりの採捕尾数を表 11 に、9 - 10 月の調査について採捕の有無で二値集計した結果を表 12 に、(4)式で算出した採捕密度比を付表 4、図 7 に、うち重要魚種の採捕密度比を表 13 に示す。同調査地点における両船の魚種ごとの採捕の有無は、全魚種の 85 %、重要魚種の 91 % で一致していた（付表 3）。また、オッター船で採捕された魚種のうち、38 % がかけまわし船でも採捕された（付表 3）。両船で共に採捕された魚種の採捕密度比 p について、便宜的に $0.25 < p \leq 0.75$ の場合を「同程度の採捕密度」として評価すると、同調査地点において両船で共に漁獲された魚種のうち、46 % の採捕密度は同程度、29 % がかけまわし船で多く、25 % がオッター船で多いと推定された（付表 4、図 7）。重要魚種に限ると、両船で共に採捕された魚種のうち、63 % は同程度、19 % はかけまわし船で多く、19 % はオッター船で多いと推定された（表 13）。両船で共に採捕された魚種のうち、採捕密度が同程度と評価された魚種が最も多いこと、かけまわし船またはオッター船に偏った魚種の割合に近いことから、本研究で使用した、かけまわし船の曳網面積の計算法と、漁獲物写真を基にしたサンプル抽出率推定法、採捕密度推定法は、オッター船と同程度の結果が得られることが示唆された。一方で、片方の船のみで採捕される魚種や採捕密度が大きくなる魚種も多く存在した。両船は同時期に同じ調査地点で操業を行ったが、調査日や座標は厳密には一致していないこと、オッター船は等深線に沿って水平に、かけまわし船は基本的に等深線に垂直方向に深場から浅場に向かって曳網するため曳網方向が違うことなどが影響していると考えられる。また、写真によるサンプル抽出率の推

定は、標本の重なりや厚みなどを考慮していないため、誤差を多く含む可能性がある。片方の船のみで採捕される魚種を減らすため、希少種の取りこぼしを減らす工夫が必要である。また、片方の船で採捕密度が高く推定されたことについて、サンプリング方法や抽出率の計算法を改善し、推定精度を改善する必要がある。

表 11. かけまわし船およびオッター船における重要魚類の単位面積当たりの採捕尾数

調査回次	1		1		1		1	
調査日	2024/6/12		2024/6/12		2024/6/12		2024/6/12	
調査海域・水深	出来島100		出来島200		出来島300		高山200	
漁獲物（採捕密度 尾/km ² ）	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船
マダラ	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00
スケトウダラ	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00
ババガレイ	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	44.68
ムシガレイ	－	125.89	－	0.00	－	0.00	－	0.00
マガレイ	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00
マコガレイ	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00
ヤナギムシガレイ	－	83.93	－	0.00	－	0.00	－	0.00
ヤリイカ	－	0.00	－	0.00	－	0.00	－	0.00
ハタハタ	－	0.00	－	0.00	－	205.28	－	0.00
調査回次	2		2		2		2	
調査日	2024/9/11		2024/9/11		2024/9/11		2024/9/11	
調査海域・水深	高山100		高山200		高山300		十三100	
漁獲物（採捕密度 尾/km ² ）	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船
マダラ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
スケトウダラ	0.00	0.00	0.00	40.93	0.00	517.15	0.00	0.00
ババガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ムシガレイ	381.25	1396.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1558.06	866.18
マガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マコガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤナギムシガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤリイカ	0.00	2207.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1361.15
ハタハタ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調査回次	3		3		3		3	
調査日	2024/10/3		2024/6/12		2024/6/12		2024/6/12	
調査海域・水深	十三300		十三200		十三100		高山100	
漁獲物（採捕密度 尾/km ² ）	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船
マダラ	1061.51	208.40	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
スケトウダラ	0.00	1083.66	0.00	1162.42	0.00	0.00	0.00	0.00
ババガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ムシガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	387.87	1062.53	521.12	451.06
マガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マコガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤナギムシガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01
ヤリイカ	0.00	0.00	0.00	0.00	1292.91	637.52	3300.44	4756.68
ハタハタ	636.91	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
調査回次	4		4		4		4	
調査日	2024/10/25		2024/10/25		2024/10/25		2024/10/25	
調査海域・水深	出来島100		出来島200		出来島300		高山300	
漁獲物（採捕密度 尾/km ² ）	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船
マダラ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.42	87.20
スケトウダラ	258.14	0.00	149.60	1131.57	498.87	126.06	49.42	348.79
ババガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ムシガレイ	567.90	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マコガレイ	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤナギムシガレイ	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤリイカ	1652.08	1831.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ハタハタ	0.00	0.00	373.99	0.00	249.44	588.28	1482.55	261.60

表 12. 9 - 10 月の調査について採捕の有無
で二値集計した結果

採捕の有無		オッター船	
		採捕あり	採捕なし
かけまわし船	採捕あり	68	44
	採捕なし	110	798

表 13. 重要魚種の採捕密度比
(空欄は両船ともに採捕されなかった魚種)

調査回数	2	2	2	2
調査海域・水深	高山100	高山200	高山300	十三100
採捕密度比				
マダラ				
スケトウダラ		0.00	0.00	
ババガレイ				
ムシガレイ	0.21			0.64
マガレイ				
マコガレイ				
ヤナギムシガレイ				
ヤリイカ	0.00			0.00
ハタハタ				
調査回数	3	3	3	3
調査海域・水深	十三300	十三200	十三100	高山100
採捕密度比				
マダラ	0.84	0.00		
スケトウダラ	0.00	0.00		
ババガレイ				
ムシガレイ			0.27	0.54
マガレイ				
マコガレイ				
ヤナギムシガレイ				0.00
ヤリイカ			0.67	0.41
ハタハタ	0.66			
調査回数	4	4	4	4
調査海域・水深	出来島100	出来島200	出来島300	高山300
採捕密度比				
マダラ				0.36
スケトウダラ	1.00	0.12	0.80	0.12
ババガレイ				
ムシガレイ	0.51			
マガレイ				
マコガレイ	1.00			
ヤナギムシガレイ	0.00			
ヤリイカ	0.47			
ハタハタ		1.00	0.30	0.85




図 7. 操業ごとの採捕された魚種の採捕密度比

続いて、両船の漁獲物組成の類似度を統計解析した結果を表 14 - 表 17 に、類似度を NMDS 平面上にプロットした結果を図 8 に示す。両船の信頼区間の楕円には重なりが見られ、魚種組成に共通性が示されたが、NMDS2 方向では両船の間に差異がみられた（図 8）。ストレス値は 0.12 であり、あてはまりは妥当（ <0.2 ）と判断された（表 14）。

PERMANOVA の結果、両船の漁獲物組成には有意な差（ $p<0.05$ ）が認められたが、 R^2 が小さく、船の違いによる影響は限定的と考えられた（ $F=1.41$ 、 $R^2=0.06$ 、 $p=0.02$ ）。PERMDISP の結果、両船の群内分散に有意な差は認められなかった（ $F=0.95$ 、 $p=0.35$ ）。両船で採捕される魚種の組成には統計的に有意な差が認められたが、その差の大きさは限定的であり、群集全体には共通性も多く見られることが示唆された（表 15）。

SIMPER の結果、両船の群集差への寄与の大きい魚種として、マアジ、ハツメ、ニギス、カナガシラなどが挙げられた（表 17）。重要魚種では、ヤリイカ、スケトウダラの寄与率が比較的高いことが示された。上記の魚種は一度に多数漁獲される特徴があり、これらの多獲性魚種が両船の漁獲物組成の違いに特に影響していることが示唆された。




図 8. NMDS による 2024 年 9 - 10 月の漁獲物群集組成二次元プロット。

赤点はかけまわし船の操業を、青点はオッター船の操業を、楕円は各船の 95 % 信頼区間を示す。

表 14. NMDS のサンプル座標 (kkmws はかけまわし船の結果を、otter はオッター船の結果を示す)

回次_地点_船	NMDS1	NMDS2	gear
2 十三100_kkmws	-1.25761	-0.90495	kkmws
2 十三100_otter	-1.33473	-0.15787	otter
2 高山100_kkmws	-2.09428	0.043715	kkmws
2 高山100_otter	-1.31886	0.52366	otter
2 高山200_kkmws	-0.53168	-1.70255	kkmws
2 高山200_otter	0.626914	1.319882	otter
2 高山300_kkmws	1.389004	-1.7052	kkmws
2 高山300_otter	1.362921	0.137098	otter
3 十三100_kkmws	-0.83724	0.777118	kkmws
3 十三100_otter	-2.43316	-0.59196	otter
3 十三200_kkmws	0.645819	-0.26735	kkmws
3 十三200_otter	1.182832	1.052408	otter
3 十三300_kkmws	1.405778	-1.32371	kkmws
3 十三300_otter	1.110911	0.210167	otter
3 高山100_kkmws	-1.53008	0.541397	kkmws
3 高山100_otter	-1.52101	0.637253	otter
4 出来島100_kkmws	-0.70481	-0.28674	kkmws
4 出来島100_otter	-1.44165	0.370435	otter
4 出来島200_kkmws	0.87448	-0.53092	kkmws
4 出来島200_otter	1.266801	1.048543	otter
4 出来島300_kkmws	1.550319	0.177448	kkmws
4 出来島300_otter	1.286549	-0.10593	otter
4 高山300_kkmws	0.790998	0.473199	kkmws
4 高山300_otter	1.511788	0.264853	otter
stress	0.120977		

表 15. PERMANOVA の結果

	Df	SumOfSqs	R2	F	Pr(>F)
gear	1	0.571903188	0.060174	1.408582	0.015
Residual	22	8.932295687	0.939826		
Total	23	9.504198875	1		

表 16. PERMDISP の結果

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F	N.Perm	Pr(>F)
Groups	1	0.004096	0.004096	0.953765	999	0.35
Residuals	22	0.094487	0.004295			

表 17. SIMPER 解析の結果

	average	sd	ratio	ava	avb	cumsum	p-vals
マアジ	0.186083	0.278595	0.667933	3865.083	16071.25	0.206021	0.867
ハツメ	0.128129	0.252008	0.50843	7808.833	224.4167	0.347879	0.282
ニギス	0.085073	0.198212	0.429202	3053.75	73.16667	0.442067	0.206
カナガシラ	0.069462	0.105881	0.656038	1602.917	1096.917	0.518972	0.61
ヒレグロ	0.048737	0.071073	0.68573	289.25	904.9167	0.572931	0.293
ヤリイカ	0.048253	0.078794	0.612398	520.4167	899.5833	0.626354	0.721
ホッケ	0.041723	0.070049	0.595633	1462.167	73.66667	0.672548	0.115
ウロコメガレイ	0.033168	0.054568	0.607824	217.8333	558.0833	0.70927	0.387
アブラツノザメ	0.032419	0.121316	0.267227	0	743.5833	0.745163	0.668
スルメイカ	0.02726	0.056671	0.481022	486.8333	20.66667	0.775343	0.073
スケトウダラ	0.024284	0.042048	0.577535	79.66667	367.5833	0.802229	0.036
アラ	0.017615	0.024763	0.711329	312.3333	439.5	0.821732	0.677
ハタハタ	0.015779	0.037011	0.426327	228.5833	98.58333	0.839201	0.479
ジンドウイカ	0.015361	0.032439	0.473528	69.83333	519.9167	0.856208	0.627
ムシガレイ	0.015109	0.020297	0.74442	284.6667	359.8333	0.872936	0.708
キュウリエン	0.011588	0.037304	0.310653	0	158.6667	0.885766	0.317
エチゼンクラゲ	0.008992	0.015735	0.571439	0	185.3333	0.895721	0.074
ニシン	0.008391	0.021391	0.392261	191.75	0	0.905011	0.144
コウイカ科	0.007613	0.015312	0.497206	0	325.4167	0.91344	0.277
ウルメイワシ	0.007439	0.026906	0.276493	0	191.8333	0.921677	0.658
アカガレイ	0.007203	0.010526	0.684314	105.3333	115.9167	0.929652	0.622
ソウハチ	0.005917	0.009536	0.620477	85.83333	21.25	0.936203	0.063
ダンゴイカ科	0.004149	0.005393	0.769279	0	73.58333	0.940796	0.004
タマガンゾウビラメ	0.003867	0.007713	0.501395	53.5	83.91667	0.945078	0.741
マダイ	0.003813	0.006453	0.590895	38.33333	85.91667	0.949299	0.531
ヤギウオ	0.003649	0.013019	0.280246	0	42.91667	0.953339	0.32
ノロゲンゲ	0.003529	0.013317	0.265008	48.5	0	0.957246	0.294
コンベイトウ	0.003421	0.006867	0.498176	0	57	0.961033	0.064
マサバ	0.002822	0.008242	0.342428	24.75	48.08333	0.964158	0.386
ガンギエイ	0.002806	0.003453	0.812847	0	66.91667	0.967265	0.004
マダラ	0.002699	0.004615	0.584708	92.58333	27.91667	0.970253	0.599
アカアマダイ	0.002476	0.004744	0.522028	54.58333	24.33333	0.972995	0.281
ドスイカ	0.00222	0.004283	0.518301	48.33333	28.58333	0.975452	0.26
ミシマオコゼ	0.002109	0.003789	0.556664	80.41667	20.66667	0.977788	0.552
アカムツ	0.001697	0.00335	0.506734	79.41667	6.916667	0.979667	0.384
ワニエン	0.001649	0.003266	0.504722	49.41667	21.91667	0.981493	0.692
シログチ	0.001344	0.004906	0.273855	0	38.16667	0.98298	0.688
キダイ	0.001202	0.002296	0.523727	4.583333	31.91667	0.984311	0.565
イズカサゴ	0.001146	0.001994	0.574635	19.33333	27.66667	0.98558	0.531
ガンコ	0.001145	0.002754	0.415634	29.41667	0	0.986847	0.101
サブリウ	0.000886	0.002745	0.322879	0	10.58333	0.987828	0.172
ネズツボ科	0.000871	0.003021	0.288206	0	22.16667	0.988792	0.619
ニジカジカ	0.000838	0.002433	0.344484	0	10.33333	0.98972	0.143
ウツカリカサゴ	0.000696	0.001877	0.370643	4.166667	13.83333	0.99049	0.741
スミレダコ	0.000684	0.002598	0.263159	0	13.91667	0.991247	0.614
ゲンゲ科	0.000683	0.002627	0.259966	8.25	0	0.992003	0.314
アゴゲンゲ	0.000625	0.002431	0.257026	0	10.75	0.992695	0.585
カンテンゲンゲ	0.000625	0.002431	0.257026	0	10.75	0.993387	0.585
チゴダラ	0.000493	0.001001	0.492365	0	10.41667	0.993933	0.132
トクビレ	0.000433	0.001212	0.357161	0	6.833333	0.994412	0.247
ケンサキイカ	0.000406	0.001038	0.3906	0	10.66667	0.994861	0.358
ウマヅラハギ	0.000353	0.000709	0.497668	1.5	10.33333	0.995252	0.554
クサウオ科	0.000344	0.001308	0.263134	0	7	0.995633	0.625
マフグ	0.000318	0.000782	0.406975	15	0	0.995986	0.199
アイナメ	0.000316	0.001312	0.241057	0	3.666667	0.996336	0.418
ウナギガジ	0.000316	0.001312	0.241057	0	3.666667	0.996686	0.418
マトウダイ	0.000302	0.001044	0.28927	0	17.16667	0.99702	0.726
キンカジカ	0.000298	0.001115	0.267227	0	6.833333	0.99735	0.668
ヤナギムシガレイ	0.000263	0.000661	0.397818	0	6.916667	0.997641	0.332
ホタルイカ	0.000251	0.001	0.250712	0	3.666667	0.997918	0.539
チダイ	0.000248	0.00064	0.38773	3.583333	0	0.998193	0.126
カガミダイ	0.000239	0.000876	0.272387	4.166667	0	0.998457	0.329
タナカゲンゲ	0.000208	0.00081	0.257026	0	3.583333	0.998688	0.584
メイタガレイ	0.000182	0.000628	0.28927	0	10.33333	0.998889	0.726
アサバガレイ	0.000172	0.000654	0.263134	0	3.5	0.99908	0.625
クラカケトラギス	0.000162	0.000606	0.267507	0	3.75	0.999259	0.638
ホシザメ	0.000162	0.000606	0.267507	0	3.75	0.999439	0.638
ヤミハゼ	0.000162	0.000606	0.267507	0	3.75	0.999618	0.638
カサゴ	0.000132	0.000454	0.290953	8.583333	0	0.999764	0.463
イシナギ	6.67E-05	0.000229	0.290953	4.333333	0	0.999838	0.463
マコガレイ	6.67E-05	0.000229	0.290953	4.333333	0	0.999912	0.463
マイワシ	6.01E-05	0.000208	0.28927	0	3.416667	0.999979	0.726
カイワリ	1.93E-05	6.45E-05	0.298805	0	3.583333	1	0.884

文 献

- 1) 北川大二・服部 努・斉藤憲治・今村 央・野澤清志 (1997) 1996 年の底魚資源量調査結果. 東北底魚研究, 17, 79 - 96.
- 2) 小向貴志 (2001) 沿岸魚類資源動向調査. 平成 12 年度青森県水産試験場事業報告, 1 - 14.
- 3) 金田禎之 (2005) 日本漁具・漁法図説 (増補二訂版). 成山堂書店. 91 - 95.
- 4) J. JUNG (2021) 曳網漁具各部の漁獲性能に関する研究. 学位論文 (博士). 長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科.
- 5) R Core Team (2023) R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. URL <https://www.R-project.org/>.
- 6) Hijmans R (2022) _geosphere: Spherical Trigonometry_. R package version 1.5-18, <<https://CRAN.R-project.org/package=geosphere>>.
- 7) Schindelin, J.; Arganda-Carreras, I. & Frise, E. et al. (2012) Fiji: an open-source platform for biological-image analysis, Nature methods 9(7): 676-682, PMID: 22743772
- 8) Oksanen J et al. (2022) _vegan: Community Ecology Package_. R package version 2.6-4, <<https://CRAN.R-project.org/package=vegan>>.
- 9) 土居秀幸・岡村寛 (2011) 生物群集解析のための類似度とその応用: R を使った類似度の算出、グラフ化、検定. 日本生態学会誌, 61, 3 - 20.
- 10) 門脇浩明 (2019) 生態学におけるビッグデータ解析の手法ー生物群集解析の基礎理論ー. 環境技術. 環境技術学会. 48, 126 - 130.
- 11) Clarke, K. R. (1993) Non-parametric multivariate analyses of changes in community structure. Australian Journal of Ecology. 1993, 18, 117-143.
- 12) 佐久間啓・八木佑太・吉川 茜・飯田真也・白川北斗 (2025) 令和 6 (2024) 年度マダラ本州日本海北部系群の資源評価. 我が国周辺水域の漁業資源評価. 水産庁・水産研究・教育機構, 東京, 62pp, https://abchan.fra.go.jp/wpt/wp-content/uploads/2025/03/details_2024_35.pdf
- 13) 千村昌之・境 磨・千葉 悟・濱邊昂平・佐藤隆太・濱津友紀 (2025) 令和 6 (2024) 年度スケトウダラ日本海北部系群の資源評価. 我が国周辺水域の漁業資源評価, 水産庁・水産研究・教育機構, 64pp, https://abchan.fra.go.jp/wpt/wp-content/uploads/2025/03/details_2024_09.pdf

付表 1-1. 底魚類モニタリング調査結果・日本海

調査年月日	2024/4/22	2024/4/22	2024/5/9	2024/5/9	2024/5/27	2024/5/28	2024/5/28	2024/6/13	2024/6/13	2024/6/14	2024/6/14	2024/6/19	2024/6/20	2024/6/20
調査海域・水深	出来島200	出来島300	出来島200	出来島300	出来島100	高山100	十三100	出来島100	出来島300	高山100	高山200	出来島200	高山300	十三100
網着底時緯度	40° 52.97' N	40° 53.73' N	40° 53.01' N	40° 53.67' N	40° 52.76' N	40° 55.70' N	41° 01.17' N	40° 53.21' N	40° 53.81' N	40° 55.77' N	40° 55.99' N	40° 53.19' N	40° 57.58' N	41° 01.36' N
網着底時経度	140° 01.55' E	140° 00.75' E	140° 01.80' E	140° 00.54' E	140° 09.09' E	140° 10.30' E	140° 11.12' E	140° 09.32' E	140° 01.02' E	140° 10.26' E	140° 03.68' E	140° 02.08' E	140° 03.05' E	140° 10.94' E
巻網開始時緯度	40° 52.49' N	40° 53.28' N	40° 52.51' N	40° 53.27' N	40° 53.89' N	40° 56.86' N	41° 02.22' N	40° 54.25' N	40° 53.37' N	40° 56.91' N	40° 54.92' N	40° 52.70' N	40° 56.45' N	41° 02.30' N
緯度	140° 00.08' E	139° 59.23' E	140° 00.16' E	139° 59.01' E	140° 09.82' E	140° 10.54' E	140° 11.86' E	140° 10.04' E	139° 59.54' E	140° 10.60' E	140° 03.39' E	140° 00.70' E	140° 03.08' E	140° 11.25' E
網着底時経度	40° 52.47' N	40° 53.21' N	40° 52.51' N	40° 53.26' N	40° 53.91' N	40° 56.88' N	41° 02.23' N	40° 54.27' N	40° 53.36' N	40° 56.92' N	40° 54.89' N	40° 52.69' N	40° 56.41' N	41° 02.32' N
経度	140° 01.55' E	140° 00.75' E	140° 01.80' E	140° 00.54' E	140° 09.09' E	140° 10.30' E	140° 11.12' E	140° 09.32' E	140° 01.02' E	140° 10.26' E	140° 03.68' E	140° 02.08' E	140° 03.05' E	140° 10.94' E
曳網開始時刻	10:29	12:15	10:43	12:27	9:53	10:20	11:46	9:55	11:52	12:22	10:40	10:27	12:33	10:31
曳網終了時刻	11:01	12:45	11:14	12:58	10:24	10:51	12:16	10:26	12:24	12:54	11:11	10:59	13:05	10:52
曳網速度(ノット)	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.3	2.5	2.4	2.2	2.8
ワープ長	530	720	530	780	260	240	230	250	800	260	570	500	750	280
網着底時ワープ長	480	690	500	750	220	220	200	209	772	227	524	430	670	240
網着底時水深 (m)	192	286	202	295	99	101	89	96	291	99	196	205	282	94
ネット袖先間隔(m)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
着底～巻上げ	2,903	2,989	2,446	2,911	2,924	2,411	2,644	2,112	2,088	2,418	2,176	1,382	2,254	1,680
巻上げ～着底	153	242	70	864	66	66	76	77	98	39	93	121	132	93
曳網距離 (m)	3,454	3,595	2,828	4,155	3,136	2,647	2,922	2,432	2,558	2,681	2,666	1,954	2,984	2,029
曳網面積 (㎡)	36,272	37,751	29,694	43,624	32,927	27,798	30,682	25,538	26,863	28,150	27,991	20,522	31,327	21,301
天候	bc	bc	bc	bc	f	bc	c	bc	bc	c	bc	bc	bc	bc
波浪	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0
風向・力	nne3	n3	nne2	w2	s4	nne2	nw2	nne1	wsnw4	nne2	nne3	w3	sw4	w1
気圧	1016.1	1015.0	1008.0	1008.1	995.0	998.9	999.5	1003.0	1002.4	1008.5	1008.4	1009.0	1008.5	1009.3
表面水温 (℃)	9.7	11.7	13.0	13.1	14.6	14.8	14.8	18.7	18.8	19.0	19.0	20.1	20.1	21.4
10m	11.3	11.3	12.9	12.9	14.5	14.6	14.4	18.1	18.5	18.7	18.7	19.7	20.0	20.0
25m	10.6	10.5	12.4	12.5	14.1	14.3	14.3	15.7	16.6	15.6	15.9	15.0	16.2	15.1
50m	10.1	10.2	10.9	10.8	12.7	13.3	13.7	13.7	13.5	14.0	13.1	13.1	13.2	12.5
75m	9.7	10.1	10.5	10.7	10.5	11.5	10.5	11.9	11.1	11.7	11.0	11.3	11.4	11.9
100m	9.8	9.9	10.4	10.2	10.1	10.5	10.4	10.5	10.5	10.7	10.9	10.9	11.0	11.7
150m	8.9	9.2	8.9	9.2					9.5		9.5		9.7	
200m		5.5		4.2					7.8		7.8		7.8	
250m		2.6		2.9					4.9				5.0	
300m														
400m														
漁獲物(個体数)														
ホシサメ						1								2
ホシサメ														
トラサメ														
アブラツサメ	6		3								10	34	1	
ガンギエイ	3						1		9	2	2	3		
アカエイ					1									
ウルメイワシ														
ニシン														
マイワシ					1									
カタクチイワシ					22		85	4		10		1		26
ニギス					2									
クロトビサメ														
キュウリイワシ	5,926		4			1	2							
ウニイワシ								2			2			
ヒメ								1					3	1
スケトウダラ		2	1	2									1	
マダラ	2	1	1	2									1	
チゴダラ			2		1			1			1		1	
キアンコウ							1							1
コンベイトウ				1							1		3	
アイナメ														
ホッケ	3			2					6		2	5	9	
カイワリ					89		21							2
マアジ														
アカアマダイ								1						
アマダイ科							1							
ガンコ										4				
アイカジャ											1			
オニカジカ														
キンカジカ	8		4								5	7		
ニシカジカ														
ニラミカジカ														
アバチヤン						1								
イサゴビクニン														
クサウオ														
クサウオ科	5													
ビクニン														
アゴゲンゲ														
アンナゲンゲ													1	
カンテンゲンゲ														
タナカゲンゲ									1				1	
ノロゲンゲ		7												
マサハ					6						2			
キダイ							1							
タイ科							29							
マダイ					1		1							
ウナギガジ														
ナガヅカ														
テンジクダイ					1			1						
オニシヤチウオ	1													
サブリウ											1			
テングトクビレ			4											
トクビレ	2													
ヤギウオ												3		
ヤセテングトクビレ						2								
ボンボ														
シログチ					3			3						
ネズミボ科														
ハゼ科														
ヤモハゼ										1				
アラ				6	4	3	2			13				7
ハタハタ	9			2				5					9	
ヒメジ							1							
アカガヤ														
イズカサゴ					1		1	1		4				
ウスメバル	10	1	3	1							1		9	
ハツメ									8					
ヤナギノマイ														
ユメカサゴ														
カナガシラ					6	6	9	15						1
アカムツ					26	5	2							
ミシマオコゼ														
ウツカリカサゴ							1							
カサゴ	9	1	6	1	1		1		25	1		5	13	
アカガレイ														
アサハガレイ														
ウロコメガレイ		58	63	26					154			5	36	
サメガレイ														
スナガレイ														
ソウハチ			1		1					1	2	4		
ヌマガレイ									1					1
ババガレイ														
ヒレグロ	2	1	5		1				20		30	12	34	
マガレイ														
マコガレイ						26	35	3						
ムシガレイ					51					19				12
メイトガレイ														
ヤナギムシガレイ					1	1	2	2						
タマガンソウビラメ					5					1				
ヒラメ						1	1	2		6				
ウマヅラハギ														
マフグ					4	1	6	3						8
カガミダイ														
マトウダイ														
コウイカ科					11	16	36	14		20				6
ダンゴイカ科	1	2	5	5					6	2	1		9	
スルメイカ					1					2	344	2		

観測年月日	2024/6/21	2024/6/21	2024/6/28	2024/6/28	2024/7/17	2024/7/17	2024/7/18	2024/7/18	2024/7/25	2024/7/25	2024/9/25	2024/9/25	2024/9/26	2024/9/26
観測者	十三200	十三300	高山250	出米島250	十三200	十三300	出米島100	出米島200	高山100	高山200	高山200	高山100	高山100	十三100
観測座時経度	41° 00.23' N 140° 04.17' E	41° 00.48' N 140° 02.57' E	40° 56.09' N 140° 03.20' E	40° 53.39' N 140° 01.19' E	41° 01.36' N 140° 11.00' E	40° 59.98' N 140° 04.33' E	40° 52.77' N 140° 09.00' E	40° 53.10' N 140° 01.91' E	40° 55.60' N 140° 10.14' E	40° 54.70' N 140° 03.23' E	40° 55.13' N 140° 03.46' E	40° 57.60' N 140° 03.03' E	40° 55.74' N 140° 10.30' E	41° 01.11' N 140° 11.00' E
巻網開始時経度	40° 59.10' N 140° 04.31' E	40° 59.37' N 140° 02.48' E	40° 54.98' N 140° 02.92' E	40° 53.05' N 140° 01.04' E	41° 02.65' N 140° 11.04' E	40° 58.74' N 140° 04.52' E	40° 53.88' N 140° 09.79' E	40° 52.54' N 140° 00.35' E	40° 56.82' N 140° 10.45' E	40° 55.91' N 140° 03.75' E	40° 58.30' N 140° 03.82' E	40° 56.46' N 140° 02.84' E	40° 56.82' N 140° 10.57' E	41° 02.29' N 140° 11.10' E
観測座時経度	40° 59.08' N 140° 04.17' E	40° 59.35' N 140° 02.57' E	40° 54.95' N 140° 03.20' E	40° 53.00' N 140° 01.19' E	41° 02.67' N 140° 11.00' E	40° 58.72' N 140° 04.33' E	40° 53.90' N 140° 09.00' E	40° 52.54' N 140° 01.91' E	40° 56.84' N 140° 10.14' E	40° 55.93' N 140° 03.23' E	40° 56.32' N 140° 03.46' E	40° 56.44' N 140° 03.03' E	40° 56.84' N 140° 10.30' E	41° 02.31' N 140° 11.00' E
曳網開始時刻	10:46	12:32	10:54	12:40	10:47	12:41	9:55	11:42	10:09	12:05	10:32	12:10	10:05	11:30
曳網終了時刻	11:17	13:03	11:25	13:11	11:18	13:12	10:26	12:14	10:40	12:36	11:03	12:41	10:35	12:01
曳網速度（ノット）	2.3	2.2	2.4	2.1	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3
フープ長	540	790	670	280	280	550	280	510	280	480	500	770	300	290
網壁底時フープ長	510	760	620	240	240	510	240	470	250	450	445	735	265	220
網壁底時水深（m）	202	329	245	96	199	98	199	99	199	204	313	88	98	98
ネット袖先間隔（m）	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
着底～巻上げ	2.277	2.206	997	1.590	2.748	2.630	2.863	2.751	2.639	2.779	2.520	2.336	2.191	2.419
巻上げ～着底	66	66	93	98	62	66	66	47	66	66	62	66	62	66
曳網距離（m）	2,657	2,654	1,484	2,139	3,066	3,061	3,185	3,149	2,928	3,141	2,986	2,809	2,502	2,820
曳網面積（㎡）	27,900	27,872	15,584	22,452	32,191	32,141	33,442	33,065	30,744	32,976	31,356	29,490	26,272	29,605
天候	c	c	bc	bc	bc	bc	bc	bc	c	c	bc	bc	bc	bc
波浪	0.5	0.5	2.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
風向・力	0.0	n2	sw4	ws4	n2	n2	ws2	sw2	ene1	ene2	e4	e3	e2	ene3
気圧	1005.0	1004.4	1010.0	1010.0	1011.5	1011.1	1009.7	1009.6	1006.0	1005.8	1019.2	1018.2	1014.2	1013.2
表面水温（℃）	20.3	20.4	20.6	20.7	24.9	24.8	25.0	25.1	24.7	24.7	24.7	24.7	24.3	24.7
10cm	20.0	19.4	20.6	20.6	23.9	22.7	23.4	23.4	24.7	24.6	24.7	24.7	24.3	24.6
25m	15.6	15.2	17.5	18.0	22.2	20.6	22.8	22.3	24.5	24.1	24.7	24.7	24.2	24.7

調査年月日	2024/10/7	2024/10/7	2024/10/9	2024/10/9	2024/10/15	2024/10/15	2024/10/17	2024/10/17	2024/10/18	2024/10/18	2024/10/21	2024/10/21	2024/10/22	2024/10/22
調査海域・水深	十三200	十三300	高山100	十三100	高山200	高山300	出来島200	出来島300	出来島100	出来島120	高山120	十三120	高山250	出来島250
網着底時緯度	40° 58.53' N	41° 02.00' N	40° 55.81' N	41° 01.14' N	40° 55.01' N	40° 57.46' N	40° 53.04' N	40° 53.90' N	40° 52.60' N	40° 53.08' N	40° 57.78' N	41° 00.41' N	40° 55.84' N	40° 53.29' N
網着底時経度	140° 04.27' E	140° 02.35' E	140° 10.24' E	140° 11.00' E	140° 03.46' E	140° 03.02' E	140° 01.75' E	140° 01.16' E	140° 08.89' E	140° 06.44' E	140° 07.24' E	140° 06.70' E	140° 03.26' E	140° 01.07' E
巻網開始時緯度	40° 59.78' N	41° 00.82' N	40° 56.88' N	41° 02.31' N	40° 56.27' N	40° 56.33' N	40° 52.88' N	40° 53.45' N	40° 53.63' N	40° 54.27' N	40° 58.07' N	41° 01.58' N	40° 54.70' N	40° 52.84' N
巻網開始時経度	140° 04.29' E	140° 02.65' E	140° 10.55' E	140° 11.05' E	140° 03.81' E	140° 02.76' E	140° 00.37' E	139° 59.79' E	140° 09.65' E	140° 06.79' E	140° 07.35' E	140° 06.78' E	140° 02.93' E	139° 59.67' E
網着底時緯度	40° 59.79' N	41° 00.81' N	40° 57.01' N	41° 02.33' N	40° 56.29' N	40° 56.32' N	40° 52.58' N	40° 53.44' N	40° 53.66' N	40° 54.30' N	40° 59.09' N	41° 01.62' N	40° 54.67' N	40° 52.82' N
網着底時経度	140° 04.27' E	140° 02.35' E	140° 10.24' E	140° 11.00' E	140° 03.46' E	140° 03.02' E	140° 01.75' E	140° 01.16' E	140° 08.89' E	140° 06.44' E	140° 07.24' E	140° 06.70' E	140° 03.26' E	140° 01.07' E
曳網開始	10:36	12:27	10:01	11:24	10:28	12:03	12:30	12:00	9:50	11:15	10:19	11:41	10:30	12:05
曳網終了時刻	11:07	12:58	10:32	11:55	10:59	12:34	13:01	11:24	10:21	11:46	10:51	12:11	11:01	12:37
曳網速度(ノット)	2.3	2.4	2.4	2.3	2.5	2.2	2.3	2.2	2.5	2.3	2.5	2.5	2.5	2.2
ネット袖先間隔	520	320	300	300	520	760	470	750	300	320	320	370	650	650
網着底時フープ長	465	770	770	270	480	730	430	660	260	260	290	610	610	570
網着底時水深(m)	199	307	99	96	206	319	199	293	98	119	132	137	232	232
ネット袖先間隔	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
着底・巻上げ	2,624	1,365	2,484	2,379	2,777	2,277	2,294	1,923	2,118	2,571	1,534	2,415	2,598	1,408
巻上げ・着底	31	39	1,142	62	66	39	47	121	95	93	62	93	95	93
曳網距離(m)	2,987	1,788	3,930	2,673	3,151	2,690	2,677	2,675	2,479	2,995	1,835	2,836	3,091	2,055
曳網面積(m ²)	31,365	18,778	41,269	28,065	33,091	28,245	28,111	28,088	26,028	31,443	19,272	29,782	32,457	21,582
曳網面積	c	c	bc	c	c	c	bc	bc	bc	bc	bc	bc	c	c
波浪	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
風向・力	rw4	rw3	e2	e3	e2	sw1	ws3	w3	e4	e4	ese3	e3	ese4	e2
気圧	1012.5	1012.0	1016.7	1015.4	1020.4	1019.8	1024.5	1024.5	1023.0	1022.4	1031.0	1030.0	1024.0	1023.4
表面水温(℃)	23.0	22.5	22.6	23.0	21.4	21.4	21.6	21.6	21.4	21.0	21.0	20.9	20.8	20.5
10m	23.0	22.6	22.9	23.0	21.3	21.4	21.5	21.5	21.3	#N/A	20.8	20.8	20	

付表 1-4. 底魚類モニタリング調査結果・日本海

調査年月日	2024/11/14	2024/11/14	2024/11/21	2024/11/21	2024/11/26	2024/12/2	2024/12/2	2025/1/20	2025/1/21	2025/1/21	2025/3/12	2025/3/12
調査海域・水深	十三200	十三300	出来島200	出来島300	高山100	出来島100	高山300	出来島300	高山300	出来島200	出来島300	出来島300
観測底時緯度	40° 58.45' N	41° 01.87' N	40° 52.95' N	40° 53.64' N	40° 55.55' N	40° 52.40' N	40° 52.83' N	40° 53.87' N	40° 57.07' N	40° 53.02' N	40° 53.56' N	40° 53.03' N
観測底時経度	140° 04.35' E	140° 02.60' E	140° 01.46' E	140° 00.64' E	140° 10.21' E	140° 08.69' E	140° 30.60' E	140° 01.14' E	140° 02.95' E	140° 01.85' E	140° 00.18' E	140° 01.91' E
巻網開始時緯度	40° 59.66' N	41° 00.90' N	40° 52.46' N	40° 53.21' N	40° 56.65' N	40° 53.43' N	40° 56.32' N	40° 53.48' N	40° 55.93' N	40° 52.50' N	40° 53.07' N	40° 52.54' N
巻網開始時経度	140° 04.43' E	140° 02.67' E	140° 00.10' E	139° 59.13' E	140° 10.44' E	140° 09.42' E	140° 02.85' E	139° 59.78' E	140° 02.78' E	140° 00.23' E	139° 58.58' E	140° 00.32' E
網羅底時緯度	40° 59.68' N	41° 00.88' N	40° 52.43' N	40° 53.20' N	40° 56.67' N	40° 53.45' N	40° 56.30' N	40° 53.48' N	40° 55.87' N	40° 52.50' N	40° 53.07' N	40° 52.53' N
網羅底時経度	140° 04.35' E	140° 02.60' E	140° 01.46' E	140° 00.64' E	140° 10.21' E	140° 08.69' E	140° 30.60' E	140° 01.14' E	140° 02.95' E	140° 01.85' E	140° 00.18' E	140° 01.91' E
曳網開始時刻	10:30	12:08	10:29	12:11	11:07	19:51	11:00	12:53	11:50	10:24	12:06	10:30
曳網終了時刻	11:01	12:39	11:02	12:42	11:38	10:22	11:31	13:24	5:31	10:55	12:40	11:01
曳網速度(ノット)	2.4	2	2.3	2.5	2.2	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5
ロープ長	480	720	540	750	260	240	680	630	750	500	720	560
網羅底時ワープ長	450	660	450	710	220	210	650	570	620	460	670	520
網羅底時水深(m)	198	307	198	283	100	100	307	297	299	200	290	201
ネット種先開端(m)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
網底～巻上げ	2,507	1,767	2,703	2,910	2,226	2,091	1,784	1,776	1,122	2,409	2,402	2,559
巻上げ～網底	66	66	168	77	66	62	77	117	191	70	93	39
曳網距離(m)	2,917	2,343	3,400	3,415	2,538	2,359	2,216	2,369	2,061	2,826	2,963	2,966
曳網面積(m ²)	30,624	24,599	35,697	35,855	26,645	24,770	23,264	24,871	21,637	29,675	31,111	31,140
天候	bc	bc	c	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc	bc
波浪	1	1	1.5	1	1	1	1.5	1	1.5	1	1	1.5
風向・力	ese3	w1	n3	nme3	wese4	e5	wsa3	zse4	nme4	ese4	e4	ese2
気温	1025.5	1024.5	1016.0	1015.0	1021.4	1016.5	1015.3	1012.4	1018.3	1017.5	1017.5	1017.1
表面水温(℃)	18.2	16.2	16.3	16.4	16.0	15.9	16.0	11.7	11.4	11.5	9.2	9.2
10m	18.0	16.2	16.2	16.3	15.9	15.8	15.9	16.0	11.6	11.3	11.4	8.9
25m	18.0	16.2	16.2	16.3	15.9	15.8	15.9	16.0	11.7	11.3	11.3	9.4
50m	17.1	16.5	16.1	16.0	15.3	15.3	16.0	11.7	11.4	11.7	11.7	10.0
75m	14.1	12.4	16.1	15.9	16.3	15.9	16.0	11.7	11.8	11.8	11.8	9.9
100m	10.8	8.4	12.4	12.6	14.6	14.6	15.0	11.6	11.8	11.7	11.7	9.8
150m	6.5	3.7	10.6	10.3			14.2	12.0	11.4	11.6	11.5	8.8
200m		2.5					8.5	9.2	10.1		7.2	5.3
250m				2.6			4.0	3.9		3.8	1.9	4.1
300m												
400m												
漁獲物(個体数)												
ネコザメ												
ホシザメ												
トラザメ												
アブラソコザメ												
ガンギエイ	1	1	8		7	2	3	3	3	247	81	1
アカエイ										7		2
ウルメイワシ												
ニシン									1			
マイワシ												
カタクチイワシ					1							
ニギス			92		90	10				10		
クロトカゲギス												
キュウリエソ										1		
ウニエソ					1							
ヒメ												
スケトウダラ	77	37	10	24		56	1	443	2	606	30	70
マダラ	2		1			2		2			4	1
チゴダラ										2		
キヤンコウ										1		
コンベイトウ		3						12		3		
アイナメ												
ホッケ	2	19	19			2		3	10	10		
カイワリ					44	165						
マアジ						1						
アカアマダイ												
アマダイ科												
ガンコ		1							1			1
アイカジカ										3		
オニカジカ										4	1	
キンシロ	3		2							3		
ニシカ												
ニラミカジカ												
アバチヤン					1							
イサゴビクニン												
クサウオ												
クサウオ科			1						1	2	2	1
ビクニン			1									
アゴガシ												
アシナガシ												
カンテンシ		2							1			
タナガシ												
ノロシ												
マサバ												
キダイ						2						
タイ科												
マダイ					4	3						
ウナギガシ			3									
ナガツカ											1	
キンシロ												
オニシロ												
サブリウ	1		6									
テングトクビレ												
トクビレ			2								3	
ヤギウオ	3		5									
ヤセテングトクビレ												
ギンボ						1						
シログチ						3	2					
ネズミ科					1							
ハゼ科					3							
ヤミハゼ												
アラ					22	22						
ハタハタ		16		14			3		1		1	1
ヒメジ					1							
アカガヤ												
イスカサゴ					1	3						
ウスメハル												
ハツメ		148		17			14	4	23		67	1
ヤナギノマイ												
ユメカサゴ			1						1			
カナガシラ					60	43			2		1	
アカムツ						4				1		
ミシマコサ												
ウツカリカサゴ						5						
カサゴ												
アカガレイ	2	22	2	12			6	18	2		6	22
アサハガレイ							1					
ウロコメガレイ		59		20			51		35		23	7
サメガレイ									1			
スナガレイ												
ソウハチ			10	8			2	2	4	215	3	9
ヌマガレイ												
ハバガレイ												
ヒレグロ	15	22	16	22		1	57	16	76	35	39	38
マダレイ								1		4		1
マコガレイ						2						
ムシガレイ					18	3						
メダガレイ						3						
ヤチキムシガレイ												
タマガンソウビラメ					7	16						
ヒラメ					1							
ウマヅラハギ					3							
マフグ												
カガミダイ					2							
マトウダイ						22	25			4		
コウイカ科												
ダンゴイカ科	2	2	1						20		12	1
スルメイカ	5		3		1							
ドスイカ					3							
ホタルイカ		5			1				3		7	1
ホタルイカモドキ						1						
ケンサキイカ					6	2			19		3	
ジンドウイカ					4	10						
ササガレイ					6	15				6		4
スミレダコ												
ミズダコ												
ヤナギダコ											2	
エチゼンクラゲ												

付表 2-1. かけまわし船比較操業試験結果

作業年月日	2024/6/12	2024/6/12	2024/6/12	2024/6/12	2024/9/11	2024/9/11	2024/9/11	2024/9/11	2024/10/3	2024/10/3	2024/10/3	2024/10/3
調査回次	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
調査海域・水深	出来島100	出来島200	出来島300	高山200	高山100	高山200	高山300	十三100	十三300	十三200	十三100	高山100
樽投下時刻	6:45	8:14	9:44	12:16	6:54	8:37	10:06	11:56	8:02	10:13	11:53	13:31
右舷側肩折時刻	6:49	8:18	9:48	12:20	6:59	8:41	10:10	12:00	8:06	10:17	11:57	13:35
投網時刻	6:51	8:20	9:51	12:22	7:01	8:43	10:12	12:03	8:09	10:19	12:00	13:38
左舷側肩折時刻	6:54	8:23	9:53	12:24	7:03	8:46	10:15	12:05	8:12	8:22	12:02	13:40
樽回収時刻	6:57	8:28	10:00	12:29	7:07	8:50	10:19	12:09	8:16	10:26	12:06	13:44
網回収時刻	7:04	8:37	10:10	12:40	7:18	9:06	10:33	12:20	8:38	10:40	12:18	13:56
右舷側肩折緯度	40° 53.44′ N	40° 53.25′ N	40° 54.02′ N	40° 54.81′ N	40° 55.79′ N	40° 55.00′ N	40° 56.43′ N	41° 02.14′ N	41° 01.24′ N	40° 59.38′ N	41° 01.78′ N	40° 56.36′ N
右舷側肩折経度	140° 09.82′ E	140° 02.80′ E	140° 02.21′ E	140° 03.29′ E	140° 10.34′ E	140° 03.74′ E	140° 03.18′ E	140° 10.38′ E	140° 02.62′ E	140° 04.30′ E	140° 10.74′ E	140° 10.01′ E
投網緯度	40° 53.19′ N	40° 53.58′ N	40° 54.36′ N	40° 55.12′ N	40° 56.06′ N	40° 55.29′ N	40° 56.69′ N	41° 02.26′ N	41° 01.55′ N	40° 59.63′ N	41° 02.13′ N	40° 56.29′ N
投網経度	140° 09.91′ E	140° 02.87′ E	140° 02.22′ E	140° 03.43′ E	140° 10.26′ E	140° 03.70′ E	140° 03.16′ E	140° 10.73′ E	140° 02.62′ E	140° 04.08′ E	140° 10.78′ E	140° 10.40′ E
左舷側肩折緯度	40° 52.88′ N	40° 53.83′ N	40° 54.62′ N	40° 55.33′ N	40° 56.36′ N	40° 55.56′ N	40° 56.95′ N	41° 02.17′ N	41° 01.83′ N	40° 59.97′ N	41° 02.40′ N	40° 56.00′ N
左舷側肩折経度	140° 09.81′ E	140° 03.23′ E	140° 02.57′ E	140° 03.87′ E	140° 10.47′ E	140° 04.02′ E	140° 03.46′ E	140° 11.13′ E	140° 02.89′ E	140° 04.26′ E	140° 11.13′ E	140° 10.63′ E
投網水深	99	204	307	226	104	205	314	103	315	202	100	101
曳網面積(km ²)	0.171	0.160	0.153	0.160	0.158	0.149	0.153	0.157	0.163	0.141	0.159	0.152
サンプル抽出率	-	-	-	-	0.083	0.064	0.094	0.122	0.029	0.143	0.341	0.265
漁獲物（個体数）												
アカアマダイ					3			4			9	
アカガレイ			54						4			
アカムツ	114			20				3				3
アラ	112				17			18			3	9
イシナギ												
イズカサゴ												1
ウツカリカサゴ												2
ウマヅラハギ											1	
ウロコメガレイ									5			
カガミダイ												2
カサゴ												
カナガシラ					152						41	107
ガンコ									1			
キダイ											3	
ゲンゲ科												
ケンサキイカ	10											
シログチ	45											
ジンドウイカ											4	10
スケトウダラ												
スルメイカ		108				8		7		34	1	3
ソウハチ		16		15						5		
タマガンゾウビラメ												3
チダイ											1	1
ドスイカ									2			
ニギス	167			193		101		503				
ニシン												
ノロゲンゲ												
ハタハタ			48						3			
ハツメ							409		281			
ヒレグロ		36	24	80					1	13	4	
ホッケ		57	24	39			52		29	8		
マアジ	172				102			154				10
マコガレイ												
マサバ										6		
マダイ											4	1
マダラ									5			
マフグ												1
ミシマオコゼ								1			2	2
ムシガレイ	43				5			30			21	21
ヤナギムシガレイ	24											
ヤリイカ											70	133
ワニエン												1

付表 2-2. かけまわし船比較操業試験結果

操業年月日	2024/10/25	2024/10/25	2024/10/25	2024/10/25
調査回次	4	4	4	4
調査海域・水深	出来島100	出来島200	出来島300	高山300
樽投下時刻	6:46	8:21	9:46	12:09
右舷側肩折時刻	6:51	8:25	9:50	12:13
投網時刻	6:53	8:27	9:52	12:05
左舷側肩折時刻	6:55	8:29	9:55	12:18
樽回収時刻	7:01	8:33	9:58	12:22
網回収時刻	7:15	8:49	10:22	12:42
右舷側肩折緯度	40° 53.31' N	40° 52.78' N	40° 53.18' N	40° 56.47' N
右舷側肩折経度	140° 09.15' E	140° 01.22' E	139° 59.26' E	140° 03.19' E
投網緯度	40° 53.05' N	40° 52.92' N	40° 53.35' N	40° 56.72' N
投網経度	140° 09.30' E	140° 01.57' E	139° 59.54' E	140° 03.29' E
左舷側肩折緯度	40° 52.73' N	40° 52.82' N	40° 53.37' N	40° 56.90' N
左舷側肩折経度	140° 09.07' E	140° 02.02' E	139° 59.98' E	140° 03.69' E
投網水深	101	217	31	298
曳網面積(km ²)	0.144	0.154	0.164	0.156
サンプル抽出率	0.134	0.087	0.147	0.130
漁獲物（個体数）				
アカアマダイ	1			
アカガレイ		2	4	2
アカムツ	14			
アラ	24			
イシナギ	1			
イズカサゴ	4			
ウツカリカサゴ				
ウマヅラハギ				
ウロコメガレイ			29	7
カガミダイ				
カサゴ	2			
カナガシラ	82			
ガンコ			1	2
キダイ				
ゲンゲ科				2
ケンサキイカ				
シログチ				
ジンドウイカ	10			
スケトウダラ	5	2	12	1
スルメイカ	1	37		1
ソウハチ		6	8	
タマガンゾウヒラメ	11			
チダイ				
ドスイカ	3			
ニギス				
ニシン	22	5		16
ノロゲンゲ			14	
ハタハタ		5	6	30
ハツメ	101		8	
ヒレグロ		20	18	6
ホッケ	36	67	12	
マアジ	588			
マコガレイ	1			
マサバ				
マダイ	7			
マダラ				1
マフグ	3			
ミシマオコゼ	16			
ムシガレイ	11			
ヤナギムシガレイ				
ヤリイカ	32			
ワニエソ	11			

付表 3-1. かけまわし船およびオッター船による単位面積当たりの採捕尾数

調査海域・水深	1		1		1		1		2		2	
	出来島100		出来島200		出来島300		高山200		高山100		高山200	
漁獲物 (採捕密度 尾/km ²)	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船
アカアマダイ	-	41.96	-	0.00	-	0.00	-	0.00	228.75	45.06	0.00	0.00
アカガレイ	-	0.00	-	208.01	-	1026.41	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アカムツ	-	83.93	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アゴゲング	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アサバガレイ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アブラツノザメ	-	0.00	-	1414.50	-	0.00	-	446.85	0.00	0.00	0.00	8923.23
アラ	-	83.93	-	0.00	-	0.00	-	0.00	1296.26	1577.08	0.00	0.00
イシナギ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
イズカサゴ	-	41.96	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウスメバル	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
ウツカリカサゴ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウナギガジ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウマヅラハギ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウルメイワシ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウロコメガレイ	-	0.00	-	208.01	-	6322.68	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
エチゼンクラゲ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	90.12	0.00	736.78
オニカジカ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カイワリ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カガミダイ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カサゴ	-	41.96	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カナガシラ	-	377.68	-	0.00	-	0.00	-	0.00	11590.09	2117.80	0.00	0.00
ガンギエイ	-	0.00	-	124.81	-	369.51	-	89.37	0.00	180.24	0.00	40.93
ガンコ	-	0.00	-	0.00	-	164.23	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カンテンゲング	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
キアコウ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
キダイ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	135.18	0.00	0.00
キュウリエツ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	327.46
キンカジカ	-	0.00	-	291.22	-	0.00	-	223.42	0.00	0.00	0.00	81.86
クサウオ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クサウオ科	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラカケトラギス	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	45.06	0.00	0.00
ゲンゲ科	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ケンサキイカ	-	83.93	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	45.06	0.00	0.00
コウイカ科	-	587.51	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	225.30	0.00	0.00
コンベイトウ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
サブロウ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
シログチ	-	125.89	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ジンドウイカ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	270.36	0.00	0.00
スケトウダラ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93
スミレダコ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
スルメイカ	-	0.00	-	1206.48	-	0.00	-	15371.55	0.00	0.00	833.44	122.80
ソウハチ	-	0.00	-	166.41	-	0.00	-	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
タナカゲング	-	0.00	-	0.00	-	41.06	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
タマガンゾウビラメ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	135.18	0.00	0.00
ダンゴイカ科	-	0.00	-	0.00	-	246.34	-	44.68	0.00	0.00	0.00	163.73
チゴダラ	-	0.00	-	0.00	-	41.06	-	44.68	0.00	0.00	0.00	40.93
チダイ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
テンジクダイ	-	41.96	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
トクビレ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ドスイカ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
トラザメ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ニギス	-	167.86	-	41.60	-	0.00	-	0.00	0.00	45.06	10522.14	0.00
ニジカジカ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ニシン	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヌマガレイ	-	0.00	-	0.00	-	41.06	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ネズッポ科	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	225.30	0.00	0.00
ノロゲング	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ハタハタ	-	0.00	-	0.00	-	205.28	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ハツメ	-	0.00	-	0.00	-	328.45	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ババガレイ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
ヒメジ	-	41.96	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヒラメ	-	83.93	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヒレグロ	-	0.00	-	499.23	-	821.13	-	1340.54	0.00	0.00	0.00	491.19
ホシザメ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	45.06	0.00	0.00
ホタルイカ	-	0.00	-	0.00	-	41.06	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ホッケ	-	0.00	-	208.01	-	246.34	-	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
マアジ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	7777.56	1667.20	0.00	0.00
マイワシ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マガレイ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マコガレイ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マサバ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
マダイ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	450.60	0.00	0.00
マダラ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マトウダイ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マフゲ	-	125.89	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ミシマオコゼ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ムシガレイ	-	125.89	-	0.00	-	0.00	-	0.00	381.25	1396.85	0.00	0.00
メイタガレイ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤギウオ	-	0.00	-	124.81	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤセテングトクビレ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤナギダコ	-	0.00	-	0.00	-	123.17	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤナギムシガレイ	-	83.93	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤミハゼ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	45.06	0.00	0.00
ヤリイカ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	2207.92	0.00	0.00
ワニエツ	-	83.93	-	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	180.24	0.00	0.00

付表 3-2. かけまわし船およびオッター船による単位面積当たりの採捕尾数

調査回次 調査海域・水深	2 高山300		2 十三100		3 十三300		3 十三200		3 十三100		3 高山100	
	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船
漁獲物（採捕密度 尾/㎢）												
アカアマダイ	0.00	0.00	207.74	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	166.23	0.00	0.00	41.01
アカガレイ	0.00	215.48	0.00	0.00	849.21	625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アカムツ	0.00	0.00	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.45	0.00
アゴゲンゲ	0.00	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アサバガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アブラツノザメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アラ	0.00	0.00	934.84	742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41	807.52	223.34	1107.16
イシナギ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
イズカサゴ	0.00	0.00	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	24.82	123.02
ウスメバル	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウツカリカサゴ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63	0.00
ウナギガジ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウマヅラハギ	0.00	0.00	0.00	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
ウルメイワシ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	2132.31
ウロコメガレイ	0.00	1292.87	0.00	0.00	1061.51	3000.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
エチゼンクラゲ	0.00	646.44	0.00	82.49	0.00	416.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
オニカジカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カイワリ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
カガミダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63	0.00
カサゴ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カナガシラ	0.00	0.00	0.00	2309.83	0.00	0.00	0.00	0.00	757.28	2890.08	2655.24	1517.22
ガンギエイ	0.00	0.00	0.00	164.99	0.00	166.72	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00	41.01
ガンコ	0.00	0.00	0.00	0.00	212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カンテンゲンゲ	0.00	129.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
キアンコウ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
キダイ	0.00	0.00	0.00	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
キュウリエソ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1402.92	0.00	0.00	0.00	0.00
キンカジカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クサウオ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クサウオ科	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラカケトラギス	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ゲンゲ科	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ケンサキイカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
コウイカ科	0.00	0.00	0.00	536.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1360.04	0.00	369.05
コンベイトウ	0.00	86.19	0.00	0.00	0.00	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
サブロウ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
シログチ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ジンドウイカ	0.00	0.00	0.00	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88	1615.05	248.15	820.12
スケトウダラ	0.00	517.15	0.00	0.00	0.00	1083.66	0.00	1162.42	0.00	0.00	0.00	0.00
スミレダコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
スルメイカ	0.00	0.00	363.55	0.00	0.00	83.36	1683.83	0.00	18.47	0.00	74.45	0.00
ソウハチ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.62	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
タナカゲンゲ	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
タマガンゾウビラメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.45	164.02
ダンゴイカ科	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00	208.40	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
チゴダラ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
チダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.47	0.00	24.82	0.00
テンジクダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
トクビレ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
ドスイカ	0.00	86.19	0.00	0.00	424.60	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
トラザメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ニギス	0.00	0.00	26123.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.50	0.00	164.02
ニジカジカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
ニシン	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヌマガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ネズツボ科	0.00	0.00	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ノロゲンゲ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ハタハタ	0.00	0.00	0.00	0.00	636.91	333.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ハツメ	28501.57	172.38	0.00	0.00	59656.97	625.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ババガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヒメジ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヒラメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.15	0.00
ヒレダロ	0.00	2542.65	0.00	0.00	212.30	1625.49	643.82	80.17	73.88	0.00	0.00	0.00
ホシザメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ホタルイカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ホッケ	3623.67	603.34	0.00	0.00	6156.77	0.00	396.19	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00
マアジ	0.00	0.00	7998.04	32829.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157863.28	248.15	287.04
マイワシ	0.00	0.00	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マコガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マサバ	0.00	0.00	0.00	577.46	0.00	0.00	297.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マダイ	0.00	0.00	0.00	82.49	0.00	0.00	0.00	0.00	73.88	42.50	24.82	164.02
マダラ	0.00	0.00	0.00	0.00	1061.51	208.40	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
マトウダイ	0.00	0.00	0.00	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マフダ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82	0.00
ミシマオコゼ	0.00	0.00	51.94	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36.94	0.00	49.63	41.01
ムシガレイ	0.00	0.00	1558.06	866.18	0.00	0.00	0.00	0.00	387.87	1062.53	521.12	451.06
メイタガレイ	0.00	0.00	0.00	123.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤギウオ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤセテングトクビレ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤナギダコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤナギムシガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.01
ヤミハゼ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤリイカ	0.00	0.00	0.00	1361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1292.91	637.52	3300.44	4756.68
ワニエソ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.82	0.00

付表 3-3. かけまわし船およびオッター船による単位面積当たりの採捕尾数

調査回数	4		4		4		4	
調査海域・水深	出来島100		出来島200		出来島300		高山300	
漁獲物（採捕密度 尾/km ² ）	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船	かけまわし船	オッター船
アカアマダイ	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アカガレイ	0.00	0.00	149.60	0.00	166.29	420.20	98.84	130.80
アカムツ	722.79	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アゴゲンゲ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アサバガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.02	0.00	0.00
アブラツノザメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
アラ	1239.06	1040.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
イシナギ	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
イズカサゴ	206.51	124.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウスメバル	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウツカリカサゴ	0.00	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウナギガジ	0.00	0.00	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
ウマヅラハギ	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウルメイワシ	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ウロコメガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.60	1008.49	345.93	1395.18
エチゼンクラゲ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.12	0.00	0.00
オニカジカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カイワリ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カガミダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カサゴ	103.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
カナガシラ	4233.46	4328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガンギエイ	0.00	124.86	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
ガンコ	0.00	0.00	0.00	0.00	41.57	0.00	98.84	0.00
カンテンゲンゲ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
キアンコウ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
キダイ	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
キュウリエソ	0.00	0.00	0.00	174.09	0.00	0.00	0.00	0.00
キンカジカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クサウオ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クサウオ科	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.04	0.00	0.00
クラカケトラギス	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ゲンゲ科	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.84	0.00
ケンサキイカ	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
コウイカ科	0.00	1415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
コンベイトウ	0.00	0.00	0.00	43.52	0.00	42.02	0.00	261.60
サブロウ	0.00	0.00	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
シログチ	0.00	457.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ジンドウイカ	516.28	3079.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
スケトウダラ	258.14	0.00	149.60	1131.57	498.87	126.06	49.42	348.79
スミレダコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
スルメイカ	51.63	41.62	2767.53	0.00	0.00	0.00	49.42	0.00
ソウハチ	0.00	0.00	448.79	87.04	332.58	84.04	0.00	43.60
タナカゲンゲ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
タマガンゾウビラメ	567.90	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ダンゴイカ科	0.00	0.00	0.00	87.04	0.00	210.10	0.00	130.80
チゴダラ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.02	0.00	0.00
チダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
テンジクダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
トクビレ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.02	0.00	0.00
ドスイカ	154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.40
トラザメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ニギス	0.00	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ニジカジカ	0.00	0.00	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
ニシン	1135.81	0.00	373.99	0.00	0.00	0.00	790.69	0.00
ヌマガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ネズボ科	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ノロゲンゲ	0.00	0.00	0.00	0.00	582.02	0.00	0.00	0.00
ハタハタ	0.00	0.00	373.99	0.00	249.44	588.28	1482.55	261.60
ハツメ	5214.39	0.00	0.00	0.00	332.58	1764.85	0.00	130.80
ババガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヒメジ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヒラメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヒレグロ	0.00	0.00	1495.96	304.65	748.31	4202.03	296.51	1613.18
ホシザメ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ホタルイカ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60
ホッケ	1858.59	0.00	5011.46	0.00	498.87	0.00	0.00	0.00
マアジ	30357.03	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイワシ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マコガレイ	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マサバ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マダイ	361.39	291.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マダラ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.42	87.20
マトウダイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マフグ	154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ミシマオコゼ	826.04	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ムシガレイ	567.90	541.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
メイタガレイ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤギウオ	0.00	0.00	0.00	435.22	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤセテングトクビレ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤナギダコ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤナギムシガレイ	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤミハゼ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ヤリイカ	1652.08	1831.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ワニエソ	567.90	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

付表 4. 採捕密度比

調査回次	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
調査海域・水深	高山100	高山200	高山300	十三100	十三300	十三200	十三100	高山100	出来島100	出来島200	出来島300	高山300
採捕密度比												
アカアマダイ	0.84	—	—	0.50	—	—	1.00	0.00	1.00	—	—	—
アカガレイ	—	—	0.00	—	0.58	—	—	—	—	1.00	0.28	0.43
アカムツ	—	—	—	1.00	—	—	—	1.00	0.90	—	—	—
アゴゲンゲ	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アサバガレイ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—
アブラツノサメ	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アラ	0.45	—	—	0.56	—	—	0.06	0.17	0.54	—	—	—
イシナギ	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
イズカサゴ	—	—	—	0.00	—	—	0.00	0.17	0.62	—	—	—
ウスメバル	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ウツカリカサゴ	—	—	—	—	—	—	—	1.00	0.00	—	—	—
ウナギガジ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—
ウマヅラハギ	—	—	—	0.00	—	—	1.00	—	0.00	—	—	—
ウルメイワシ	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	—	—
ウロコメガレイ	—	—	0.00	—	0.26	—	—	—	—	—	0.54	0.20
エチゼンクラゲ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	0.00	—
オニカジカ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カイワリ	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—
カガミダイ	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—
カサゴ	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
カナガシラ	0.85	—	—	0.00	—	—	0.21	0.64	0.49	—	—	—
ガンギエイ	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	—	—
ガンコ	—	—	—	—	1.00	—	—	—	—	—	1.00	1.00
カンテンゲンゲ	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キアンコウ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
キダイ	0.00	—	—	0.00	—	—	1.00	—	0.00	—	—	—
キュウリエソ	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—
キンカジカ	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クサウオ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
クサウオ科	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—
クラカケトラギス	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ゲンゲ科	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00
ケンサキイカ	0.00	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—
コウイカ科	0.00	—	—	0.00	—	—	0.00	0.00	0.00	—	—	—
コンベイトウ	—	—	0.00	—	0.00	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
サブロウ	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—
シログチ	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—
ジンドウイカ	0.00	—	—	0.00	—	—	0.04	0.23	0.14	—	—	—
スケトウダラ	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—	1.00	0.12	0.80	0.12
スミレダコ	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—
スルメイカ	—	0.87	—	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.55	1.00	—	1.00
ソウハチ	—	—	—	—	—	0.86	—	—	—	0.84	0.80	0.00
タナカゲンゲ	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タマガンゾウビラメ	0.00	—	—	—	—	—	—	0.31	0.45	—	—	—
ダンゴイカ科	—	0.00	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00
チゴダラ	—	0.00	—	—	0.00	—	—	—	—	—	0.00	—
チダイ	—	—	—	—	—	—	1.00	1.00	—	—	—	—
テンジクダイ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トクビレ	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	—	0.00	—
ドスイカ	—	—	0.00	—	0.84	—	—	—	1.00	—	—	0.00
トラサメ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ニギス	0.00	1.00	—	1.00	—	—	0.00	0.00	0.00	—	—	—
ニジカジカ	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—
ニシン	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.00	—	1.00
ヌマガレイ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ネズツボ科	0.00	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
ノロゲンゲ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—
ハタハタ	—	—	—	—	0.66	—	—	—	—	1.00	0.30	0.85
ハツメ	—	—	0.99	—	0.99	—	—	—	1.00	—	0.16	0.00
ババガレイ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒメジ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒラメ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒレグロ	—	0.00	0.00	—	0.12	0.89	1.00	—	—	0.83	0.15	0.16
ホシザメ	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホタルイカ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00
ホッケ	—	—	0.86	—	1.00	0.59	—	—	1.00	1.00	1.00	—
マアジ	0.82	—	—	0.20	—	—	0.00	0.46	0.99	—	—	—
マイワシ	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
マガレイ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マコガレイ	—	—	—	—	—	—	—	—	1.00	—	—	—
マサバ	—	—	—	0.00	—	1.00	—	—	—	—	—	—
マダイ	0.00	—	—	0.00	—	—	0.63	0.13	0.55	—	—	—
マダラ	—	—	—	—	0.84	0.00	—	—	—	—	—	0.36
マトウダイ	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
マフグ	—	—	—	—	—	—	—	1.00	1.00	—	—	—
ミシマオコゼ	—	—	—	0.56	—	—	1.00	0.55	0.83	—	—	—
ムシガレイ	0.21	—	—	0.64	—	—	0.27	0.54	0.51	—	—	—
メイタガレイ	—	—	—	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—
ヤギウオ	—	—	—	—	—	0.00	—	—	—	0.00	—	—
ヤセテングトクビレ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヤナギダコ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヤナギムシガレイ	—	—	—	—	—	—	—	0.00	0.00	—	—	—
ヤミハゼ	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヤリイカ	0.00	—	—	0.00	—	—	0.67	0.41	0.47	—	—	—
ワニエソ	0.00	—	—	—	—	—	—	1.00	0.87	—	—	—