

寒ギク(スプレーギク)の開花調節

県育成の寒咲きスプレーギク「あけぼのの舞」「あかねの舞」の開花期は11月末～12月初頭ですが、植物生長調整剤を散布することにより、年末需要に適した12月中旬開花になります。

1 年末需要に適した栽培法

- 7月上旬に挿し芽、下旬に定植。
- 8月上旬に摘心(定植約1週間後)。
- エテホン剤(商品名:エスレル10)の500倍液を摘心時とその後2週間おきに合計3回散布。

摘心・エテホン剤散布期と開花期

「あけぼのの舞」

年度	摘心日	エテホン剤散布		収穫時期					切花長 (cm)	頭花数 (個)
		回数	最終散布日	11月		12月				
				中	下	上	中	下		
H26	7/22	0	-	←★→					102.3	12.9
		3	8/18	←★→					98.7	9.7
H27	7/29	0	-	←★→					88.9	7.7
	8/1	3	8/28			←★→	←★→		89.1	8.6
	8/5	3	9/2			←★→	←★→		92.0	9.2
H28	8/1	0	-			←★→	←★→		81.7	9.6
		3	8/29			←★→	←★→		74.5	7.2
	8/8	0	-			←★→	←★→		75.5	8.6
		3	9/5			←★→	←★→		73.6	5.8
8/18	0	-			←★→	←★→		68.0	8.6	
		3	9/15							

「あかねの舞」

年度	摘心日	エテホン剤散布		収穫時期					切花長 (cm)	頭花数 (個)
		回数	最終散布日	11月		12月				
				中	下	上	中	下		
H26	7/22	0	-	←★→					87.7	12.8
		3	8/18	←★→					77.7	11.2
H27	7/29	0	-			←★→			83.4	8.7
	8/1	3	8/28			←★→	←★→		75.9	8.8
	8/5	3	9/2			←★→	←★→		77.3	9.9
H28	8/1	0	-			←★→	←★→		60.8	8.6
		3	8/29			←★→	←★→		55.8	8.4
	8/8	0	-			←★→	←★→		59.1	8.4
		3	9/5			←★→	←★→		55.4	7.4
8/18	0	-			←★→	←★→		56.1	8.9	
		3	9/15							

2 注意点

エテホン剤の最終散布が8月中旬以前、9月中旬以降では12月中旬に収穫できない。



平成28年12月9日撮影
「あけぼのの舞」8月1日摘心
無散布区の収穫率:75%
散布区の収穫率:0%(未収穫)

関連情報

「あけぼのの舞」(写真左)、「あかねの舞」(右)は無加温ハウスで栽培可能な寒咲きスプレーギクです。増殖用種苗の配布については、花き部までお問い合わせください。

