

新規青森県基幹種雄牛

第1久桜

だいちひさざくら

黒15568 (82.9)

生年月日：平成30年10月13日

産地：上北郡 横浜町

繁殖者：古川 亮



| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 安福久 (栃木・那須) 黒原4416 | 安福165の9 (岐阜・高山) 黒原1683 直検1.32 間検0.98 2.6 | 安福(岐阜) (兵庫・美方) しげふじ13の7 (岐阜・高山) 紋次郎 (兵庫・美方) もとひかり (島根・出雲) |
| もとくに (栃木・那須) 黒原1443702 | 第1花園 (青森・つが) 黒12510 直検1.36 間検1.03 2.7 | 北国7の8 (島根・大田) あおはな (島根・安来) 美津福 (兵庫・美方) もとじろう (栃木・那須) |
| | もとみつ (栃木・那須) 黒原1280419 | |

父は名牛「安福久」、母「もとくに」は名牛「美国桜」の全きょうだい妹で、父方・母方とも「もとじろう」系の種雄牛です。

現場後代検定では、BMS No.・上物率・5等級率において、青森県歴代1位を記録し、特にめす産子において、BMSNo.10.5・5等級率100%と非常に優れた成績でした。もとじろう系の特徴である、高い脂肪交雑と小ザシ、つくりの良さを兼ね備えた枝肉生産が期待できます。

| 直接検定成績(kg) | |
|------------|-------|
| 直接検定DG | 1.00 |
| 365日補正体重 | 391.0 |
| 直検終了時得点 | 82.9 |

現場後代検定成績《最終成績》

(枝肉詳細は裏面へ)

| 全体成績 | 頭数 | 月齢 | 枝肉重量 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪 | BMS | 上物率 | 5等級率 |
|------|----|------|-------|------|-----|------|------|--------|--------|
| 去勢平均 | 6 | 28.5 | 447.1 | 55.3 | 7.6 | 2.2 | 9.0 | 100.0% | 66.7% |
| めす平均 | 8 | 29.6 | 447.5 | 70.3 | 8.3 | 2.7 | 10.5 | 100.0% | 100.0% |
| 平均 | 14 | 29.1 | 447.3 | 62.8 | 7.9 | 2.4 | 9.9 | 100.0% | 85.7% |

※ 平均については、BMSは総平均、その他形質は(去勢平均+めす平均)÷2



| 体尺測定値 (登録時) | |
|----------------|---------------------|
| 体高 | 126.0cm (-0.03σ) |
| 胸囲 | 179.0cm (+1.16σ) |
| 胸深 | 63.0cm (+0.16σ) |
| 尻長 | 48.0cm (-0.68σ) |
| かん幅 | 43.0cm (-0.29σ) |
| 体重 | 418kg (-0.40σ) |

現場後代検定調査牛(令和6年9月20日)
【あおり和牛合同共励会 優良賞】
めす(第1久桜×芳之國×安福久)
402.0kg ロース72cm² BMS11

現場後代検定調査牛(令和7年2月20日)
めす(第1久桜×平安平×第2勝王)
537.0kg ロース79cm² BMS12

現場後代検定の枝肉成績詳細

| 性別 | 母の父 | 祖母の父 | 月齢 | 枝肉重量 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪 | BMS | 等級 |
|----------|------|-------|------|-------|------|-----|------|-----|-----|
| 去勢 | 美津照重 | 忠富士 | 27.0 | 467.0 | 50.0 | 7.4 | 1.8 | 6 | A-4 |
| 去勢 | 光茂 | 雪国 | 26.9 | 379.0 | 54.0 | 6.5 | 2.2 | 10 | A-5 |
| 去勢 | 平白鵬 | 茂重安福 | 27.8 | 463.5 | 52.0 | 8.1 | 2.0 | 7 | A-4 |
| 去勢 | 安平福3 | 優福栄 | 30.2 | 477.5 | 53.0 | 7.7 | 2.5 | 10 | A-5 |
| 去勢 | 第2花国 | 21世紀 | 28.9 | 442.0 | 62.0 | 7.9 | 2.1 | 10 | A-5 |
| 去勢 | 安平福3 | 第1勝平茂 | 30.1 | 453.5 | 61.0 | 7.8 | 2.4 | 11 | A-5 |
| 去勢平均(6頭) | | | 28.5 | 447.1 | 55.3 | 7.6 | 2.2 | 9.0 | |

| 性別 | 母の父 | 祖母の父 | 月齢 | 枝肉重量 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪 | BMS | 等級 |
|----------|--------|------|------|-------|------|-----|------|------|-----|
| めす | 平白鵬 | 茂重安福 | 31.0 | 410.5 | 54.0 | 7.8 | 2.7 | 8 | A-5 |
| めす | 幸紀雄 | 安糸福 | 31.6 | 420.0 | 76.0 | 7.9 | 1.7 | 12 | A-5 |
| めす | 幸紀雄 | 光平照 | 26.0 | 415.0 | 67.0 | 8.5 | 1.9 | 8 | A-5 |
| めす | 奥勝忠4 | 勝21 | 30.1 | 502.0 | 73.0 | 9.4 | 3.2 | 10 | A-5 |
| めす | 百合茂 | 勝忠平 | 28.3 | 458.0 | 77.0 | 7.9 | 3.2 | 12 | A-5 |
| めす | 芳之国 | 安福久 | 26.8 | 402.0 | 72.0 | 7.4 | 1.6 | 11 | A-5 |
| めす | 平安平 | 第2勝王 | 31.7 | 537.0 | 79.0 | 9.3 | 3.9 | 12 | A-5 |
| めす | 安福(岐阜) | 平茂勝 | 31.1 | 435.5 | 64.0 | 8.0 | 3.2 | 11 | A-5 |
| めす平均(8頭) | | | 29.6 | 447.5 | 70.3 | 8.3 | 2.7 | 10.5 | |

《参考》これまでの基幹種雄牛との現場後代検定成績比較

| 種雄牛名 | 頭数 | 枝肉重量 | ロース芯 | バラ厚 | 皮下脂肪 | BMS | 上物率 | 5等級率 |
|-------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 優福栄 | 23 | 447.3 | 58.2 | 7.7 | 2.0 | 7.1 | 91.0% | 34.8% |
| 光茂 | 17 | 469.0 | 58.2 | 8.2 | 2.3 | 5.3 | 58.8% | 29.4% |
| 平安平 | 16 | 449.8 | 61.9 | 8.1 | 2.5 | 7.8 | 81.3% | 56.3% |
| 春待白清 | 19 | 456.1 | 61.4 | 7.9 | 2.3 | 7.4 | 78.9% | 47.4% |
| 広清 | 15 | 468.5 | 61.7 | 7.6 | 2.6 | 7.7 | 93.3% | 46.7% |
| 忠光安 | 19 | 482.0 | 64.6 | 7.9 | 2.7 | 7.3 | 94.7% | 42.1% |
| 幸紀花 | 16 | 476.6 | 72.5 | 8.5 | 2.3 | 8.3 | 93.8% | 62.5% |
| 寿優福 | 18 | 479.2 | 76.1 | 8.1 | 2.4 | 9.6 | 100% | 72.2% |
| 亀花邦 | 16 | 457.7 | 62.2 | 7.8 | 2.3 | 7.2 | 87.5% | 50.0% |
| 第1久桜 | 14 | 447.3 | 62.8 | 7.9 | 2.4 | 9.9 | 100.0% | 85.7% |